# Flora de la República de Cuba Serie A, plantas vasculares Fascículo 14(3) Rutaceae

Edición impresa publicada en 2008 Print edition published in 2008 ISBN 978-3-906166-66-7

Edición en línea publicada el 13 de octubre de 2025 Online edition published on 13 October 2025

Autora / Author: Christa BEURTON

Fuente / Source: Flora de la República de Cuba. Serie A, plantas vasculares. Fascículo 14(3)

**Publicado por / Published by:** A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft (edición impresa / print edition); Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin (edición en línea / online edition)

**DOI:** https://doi.org/10.3372/frc.14.3

© 2008 A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft

Esta edición en línea de libre acceso se distribuye bajo licencia CC BY 4.0 This open-access online edition is distributed under the CC BY 4.0 licence

#### Citación recomendada / Recommended citation:

Beurton C. 2008: *Rutaceae*. – En: Greuter W. & Rankin Rodríguez R. (ed.), Flora de la República de Cuba. Serie A, plantas vasculares. Fascículo 14(3). – Ruggell: A. R. Gantner Verlag Kommanditgesellschaft. https://doi.org/10.3372/frc.14.3



# FLORA DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Fascículo 14(3)

Rutaceae

Christa Beurton

2008 A. R. Gantner Verlag KG FL-9491 Ruggell, Liechtenstein

# Símbolos y abreviaturas

! (espécimen) visto por el autor

† (espécimen) destruido o perdido

idéntico (en la sinonimia indica sinónimos homotípicos)

= igual (en la sinonimia indica sinónimos heterotípicos)

pleca (en la sinonimia precede nombres inválidos o mal empleados)

 $\pm$ ; <; >;  $\leq$ ;  $\geq$  más o menos; menos de; más de; hasta; por lo menos

× por; se pone p. ej. entre los nombres de los progenitores de híbridos

#, ## número, números

& al. et alii (y otros; se pone cuando hay más de dos autores o colecto-

res y solo se cita el primero de ellos)

auct. auctorum (de los autores; se subentiende: no en el sentido original)

auct. fl. cub. auctorum florae cubensis (de los autores en la flora de Cuba)

ca. cerca de, aproximadamente

cf. confer (compárese – se pone cuando una indicación no es acertada)

com. pers. comunicación personal

etc. etcetera

f. figura (en citas); forma (en nombres)

HFC Herbarium Florae Cubensis (Herbario de la Flora de Cuba)

l. c. *loco citato* (en la publicación citada anteriormente)

msm metros (de altitud) sobre el mar n.v. (espécimen) no visto por el autor

nom. cons. nomen conservandum (nombre conservado, que se puede utilizar)

nom. illeg. nomen illegitimum (nombre ilegítimo)

nom. nud. nomen nudum (nombre sin descripción, no válidamente publicado) nom. rej. nomen rejiciendum (nombre rechazado, que no se debe utilizar)

orth. cons. orthografia conservanda (grafía conservada)

p. ej. por ejemplo

p.p. por partes, parcialmente

prov. provincia

q.v. quod vide (que se vea)

s. str. / l. sensu stricto / lato (en sentido estrecho / amplio)

sect. sectio (sección)

subg. subgenus (subgénero) subsp. subspecies (subespecie)

t. tabula (lámina) var. varietas (variedad)

# RUTACEAE

## por Christa Beurton \* \*\*

**Rutaceae** Juss., Gen. Pl.: 296. 1789, nom. cons. Tipo: *Ruta* L.

Árboles, arbustos, trepadoras o hierbas, siempreverdes o deciduos, inermes o espinosos, dioicos, monoicos o polígamos. Hojas compuestas o unifolioladas, rara vez en apariencia simples o filódicas, alternas u opuestas; estípulas ausentes, a veces sustituidas por acúleos o escamas; pecíolo con frecuencia alado; lámina usualmente con glándulas pelúcidas u opacas. Inflorescencias terminales, o axilares, en panícula, racimo o fascículo, raramente unifloras. Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas o zigomorfas. Cáliz 3-5(-6)-mero, los sépalos libres o basalmente concrescentes, de prefloración imbricada o valvar. Corola (2-)3-5(-8)-mera, los pétalos alternisépalos, libres o rara vez ± concrescentes, de prefloración imbricada o valvar. Estambres tantos como los pétalos a muy numerosos, uni- o biseriados, todos fértiles o algunos estaminodiales; filamentos libres o concrescentes, ± dilatados basalmente; anteras introrsas, con dehiscencia longitudinal. Disco nectarífero presente, intrastaminal, a veces alargado (ginóforo). Ovario generalmente súpero, (1-)4-5(-∞)-mero; carpelos libres (aunque muchas veces con estilo o estigma común) hasta completamente concrescentes; primordios seminales 1-2(-∞) por lóculo; estilos subbasales a terminales, libres o concrescentes; estigma entero o lobado. Frutos en folículo, cápsula, esquizocarpo, sámara, drupa, baya o hesperidio; lóculos a menudo rellenos de vesículas jugosas o pulpa; placenta a veces formando un arilodio membranáceo. Semillas con embrión recto o curvo; endospermo presente o ausente.

Distribución: Familia cosmopolita, mayormente tropical y subtropical, con 145-160 géneros y unas 925-1800 especies, el mayor número en África del Sur y Australia. En Cuba crecen 8 géneros indígenas (45

Jardín Botánico y Museo Botánico Berlín-Dahlem, Universidad Libre de Berlín, Königin-Luise-Str. 6-8, D-14195 Berlín, Alemania.

<sup>\*\*</sup> Testo (excepto lo de *Amyris*) traducido del alemán por Lutgarda González Géigel.

especies) y 4 géneros (8 especies y híbridos) de amplio cultivo, tres de ellos también subspontáneos naturalizados.

Taxonomía: El monógrafo Engler (1896, 1931) distingue 7 subfamilias y 12 tribus, pero los datos moleculares no apoyan su clasificación. Los nuevos datos indican que los metabolitos secundarios son un criterio taxonómico más confiable que la tipología de los frutos, pero faltan todavía datos químicos suficientes y nuevos datos morfológicos sobre la mayor parte de la familia (Fish & Waterman 1973, Waterman 1975, 1983, 1990, Silva & al. 1988). Según Chase & al. (1999) para que la familia Rutaceae sea monofilética se tiene que inlcuir en ella las Cneoraceae Vest y varios géneros que se habían atribuido a las Simaroubaceae DC. y Sapindaceae Juss. Scott & al. (2000) plantean que las subfamilias Dictyolomoideae Engl. y Spathelioideae Engl. constituyen un clado distinto del conjunto de las otras subfamilias de Rutáceas. Sin embargo, los datos moleculares (Chase & al. 1999, Samuel & al. 2001, Scott & al. 2000, Morton & al. 2003) demuestran que la subfamilia Aurantioideae Eaton, que incluye los géneros más cultivados en Cuba: Glycosmis, Murraya, Triphasia y Citrus, es natural.

P a l i n o l o g í a : No existe información sintética al nivel de la familia, sino datos para varias subfamilias en el sentido de Engler y estudios geográficamente limitados (Selling 1947, Erdtman 1952, Bamzai & Randhawa 1965, Heusser 1971, Ybert 1979, Barth 1982, 1983, 1985, Morton & Kallunki 1993, Grant & al. 2000 y datos inéditos de la autora). Los granos de polen son usualmente prolados a suboblados, de tamaño variable (15-100 μm de diámetro), (2-)3(-6)-colporados o rara vez 3-poroporados, con exina generalmente reticulada, raras veces baculada (*Cusparia*).

C i t o l o g í a : Se conocen números cromosómicos de ca. 73 géneros y unas 250 especies, desde n=7 hasta n=68. Se postula un número cromosómico básico de x=9 con abundante poliploidia (se conocen los niveles tetra-, hexa y octoploide) y disploidia (Stace & al. 1993). Los patrones de bandas de heterocromatina en la subfamilia *Aurantioideae* fueron estudiados por Guerra & al. (2000).

Biología de la reproducción: Los géneros cubanos son probablemente entomófilos. Las flores de *Zanthoxylum*, *Plethadenia*, *Amyris*, *Helietta* y *Spathelia* son diminutas y sugieren que los insectos visitantes son muy pequeños. El color poco vistoso, en estos géneros (excepto *Spathelia*), se supone esté compensado por un gran número de

flores y por la presencia de glándulas oleíferas brillantes en los órganos florales. En las flores hermafroditas de los géneros *Amyris, Pilocarpus, Cusparia, Ravenia* y *Spathelia* se observa proterandria. Las flores de *Ravenia* y *Cusparia* son relativamente grandes, con tendencia a la zigomorfia de la corola y del androceo. *Citrus, Glycosmis* y *Clausena,* géneros cultivados en Cuba, también son entomófilos, polinizados por abejas, avispas y mariposas atraídas por el néctar y la fragancia de las flores (Lim 2001). Urban (1883: 401-404) niega autopolinización en *Ravenia, Ruta* y *Triphasia* en la mayoría de los casos; en *Murraya* y *Citrus* admite posible autogamia, siendo más efectiva la polinización cruzada. La dispersión anemocora de las diásporas es probable en *Helietta* y quizás *Spathelia*.

Los frutos de *Amyris* y *Spathelia* y las semillas de *Ravenia* y *Zantho-xylum* parecen adaptados a la diseminación ornitocora. La presencia de elaiosomas en las semillas de *Cusparia, Pilocarpus, Plethadenia, Ravenia* y *Zanthoxylum* (Armstrong 2002) indica mirmecoria. En *Cusparia, Pilocarpus, Plethadenia* y *Ravenia* se observa dispersión autocora de las semillas, proyectadas a corta distancia por el endocarpo elástico del folículo.

F i t o q u í m i c a : Se indica la presencia de varios tipos de alcaloides, cumarinas, aceites aromáticos esteroidales (en cavidades lisígenas en el parénquima y pericarpo), limonoides, flavonoides, resinas (mesocarpo de *Spathelia*) así como la ausencia de conductos resinosos en la corteza, los rayos medulares y nervios de las hojas (Adams & al. 1973, Waterman 1975, 1990, Grieve & Score 1980, Silva & al. 1988, Zakaria 2001).

I m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a : Taxones de varios géneros tienen una enorme importancia económica. Los cítricos (*Citrus* s.l.), en particular, no solo producen frutos comestibles y jugo, sino aceites esenciales para la perfumería (también *Murraya*). En la medicina tradicional se utilizan *Amyris, Murraya* y *Ruta*, mientras que *Pilocarpus* contiene alcaloides que se usan, entre otros, en el tratamiento del glaucoma. Especies de *Citrus, Glycosmis, Murraya* y *Triphasia* se cultivan como ornamentales o en setos vivos, debido a su follaje atractivo y a las flores fragantes. De *Amyris* y *Zanthoxylum* se utiliza la madera. *Citrus, Cusparia, Ruta* y *Zanthoxylum* sirven como condimento.

Géneros cultivados [nombres entre corchetes en la clave]:

 Aegle Corrêa, género monotípico, con Aegle marmelos (L.) Corrêa (Crateva marmelos L.), bael fruit de la India, membrillo, membrillo de Australia, membrillo de Bengala, oriundo de Asia tropical, se cultiva en jardines como frutal.

- Casimiroa La Llave & Lex. (Martínez 1951, Chiang 2001): se cultivan como frutales hortícolas Casimiroa edulis La Llave & Lex. (= Zantho-xylum bombacifolium A. Rich., Fagara bombacifolia (A. Rich.) Krug & Urb.), anón canadiense de Güell, ayuda sin espinas, mango tarango, melocotón, sapote blanco, sapote blanco de Mejico, oriunda de México y América Central; y Casimiroa tetrameria Millsp., descrita de Yucatán.
- Clausena Burm. f., con Clausena lansium (Lour.) Skeels (Quinaria lansium Lour.), árbol de lanza, lansio, wampi, del sur de China e Indonesia, se cultiva en jardines por sus frutos.
- Ruta L. (Urban 1896, Wilson 1911, Gómez & Roig 1914): De este género en apariencia solo se cultiva Ruta chalepensis L. (= Ruta angustifolia Pers., Ruta bracteosa DC., "Ruta graveolens" auct. fl. cub.), ruda, de Europa meridional; esta especie fuertemente olorosa, que sirve como condimento y contiene una sustancia fototóxica, la furocumarina, se caracteriza por tener pétalos profundamente laciniado-ciliados, mientras que son enteros o denticulados en Ruta graveolens L. con la cual fue confundida por algunos autores (Roig 1963, Esquivel & al. 1990).

Géneros a excluir: Otros géneros mencionados en la literatura (ver Esquivel & al. 1992) solo se hallan en colecciones o ya no se cultivan:

- Aeglopsis Swingle (con Aeglopsis chevalieri Swingle);
- Afraegle Engl. (con Afraegle paniculata (Schumach.) Engl.);
- Atalantia Corrêa (con Atalantia ceylanica (Arn.) Oliver y Atalantia citroides Pierre ex Guillaumin);
- Feroniella Swingle (con Feroniella oblata Swingle);
- Limonia L. (Feronia Corrêa; con Limonia acidissima L. ≡ Feronia limonia (L.) Swingle);
- Pamburus Swingle (con Pamburus missionis (Wight) Swingle);
- Severinia Ten. (con Severinia buxifolia (Poir.) Ten.);
- Swinglea Merr. (con Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.).

# Clave para los géneros

2* 3	Árboles o arbustos ramosos; inflorescencias terminales o axilares, mucho menores
3*	Fruto carnoso, en hesperidio, drupa o baya
4	Árboles o arbustos frecuentemente espinosos, a veces trepadores; ramas jóvenes frecuentemente zigzagueantes; flores unisexuales
4*	$\it Arboles$ o arbustos inermes, no trepadores, con ramas jóvenes $\it \pm$ rectas; flores hermafroditas $\it \pm$ 5
5 5*	Pétalos concrescentes entre si y con los filamentos estaminales; estambres 5(-7), solo 2 fértiles
6	Corola blanquecina, densamente pelosa por fuera; sépalos uniseria- dos
6*	Corola roja, glabra por fuera; sépalos biseriados, los exteriores más grandes
7	Sépalos, pétalos y estambres 4-5
7*	Sépalos y pétalos 4, estambres 8
8 8*	Inflorescencia en panícula de 2,5-6(-12) cm de largo; fruto un esquizocarpo con mericarpos indehiscentes, alados
9 9*	Hojas palmaticompuestas
	Estambres $2 \times$ el número de los sépalos o pétalos
11 11*	Fruto en drupa usualmente $1(-2)$ -sperma de $\leq 1,1(-1,4)$ cm de largo, negruzco o atropurpúreo, no comestible
	Plantas espinosas; cáliz 3(-4)-mero; estambres 6 11. Triphasia Plantas inermes; cáliz 4-5-mero; estambres 8, 10 o numerosos 13
	Estilo muy corto; baya de 0,7-1,3 cm de largo
14	Flores de ca. 10 mm de largo; estilo delgado, más largo que el ovarios baya de ca. 1 cm de largo, roja, no comestible

14	* Flores de 3-6 mm de largo; estilo grueso, tan largo como el ovario baya de 2-3 cm de largo, blanca o amarilla, comestible [Clausena]			
15 15	Hojas siempreverdes, unifolioladas; fruto en hesperidio 12. Citrus * Hojas deciduas, usualmente trifolioladas; fruto en baya [Aegle]			
Cla	Clave genérica parcial: plantas indígenas con flores			
1 1*	Pétalos concrescentes; 2 estambres fértiles y 3-5 estaminodios 2 Pétalos libres; estambres 3-60, todos fértiles (excepto en flores ♀) 3			
2 2*	Corola roja, glabra por fuera; sépalos biseriados, los exteriores más largos que los interiores			
3 3*	Inflorescencias rojas, de > 2 m de largo			
4 4*	Estambres 2× el número de los pétalos			
5 5*	Flores 4-meras; carpelos 4, rodeados por un disco 2. Plethadenia Flores 4-5-meras; carpelo 1; disco ausente o presente 3. Amyris			
6 6*	Flores unisexuales; plantas frecuentemente espinosas 1. Zanthoxylum Flores hermafroditas; plantas inermes			
7 7*	Flores de 3-4 mm de largo, amarillentas, en panícula de 2,5-6(-12) cm de largo			
Cla	ve genérica parcial: plantas indígenas con frutos			
1 1*	Frutos en drupa negruzca o atropurpúrea			
2 2*	Frutos con carpelos alados indehiscentes 3 Frutos con folículos dehiscentes 4			
3	Infructescencias pequeñas, verdosas; frutos un esquizocarpo con 4(-5) mericarpos alados			

- 4\* Semillas adheridas a las valvas o colgando del folículo dehiscente .....

  1. Zanthoxylum

### 1. Zanthoxylum L., Sp. Pl.: 270. 1753.

Tipo (Hitchcock & Green 1929: 142): Zanthoxylum clava-herculis L.

- = *Pterota* P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica: 146. 1756, nom. rej. ≡ Fagara L., Syst. Nat., ed. 10: 885, 897, 1362. 1759, nom. cons. ≡ Fagaras Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(2): 34. 1898, nom. illeg. Tipo: Fagara pterota L.
- = *Tobinia* Desv. ex Ham., Prodr. Pl. Ind. Occid.: XVI, 56. 1825. Tipo no designado.

Plantas leñosas, mayormente dioicas, aculeadas o inermes; aromáticas, glabras o con pelos simples, bífidos o estrellados. Tronco a veces con acúleos, frecuentemente insertados en protuberancias suberosas (cojin e t e s ). Hojas alternas, paripinnadas, imparipinnadas, 1-folioladas o filódicas, inermes o aculeadas, frecuentemente con un par de acúleos cerca de la base; pecíolo y raquis comúnmente adaxialmente surcados, a veces alados (Fig. 2); folíolos opuestos o alternos, glanduloso-punteados, a veces con 1-2 domacios subbasales, de margen entero o crenado. Flores pequeñas, 3-5(-6)-meras, ± actinomorfas, generalmente unisexuales. Sépalos persistentes (en Cuba), libres o basalmente concrescentes. Pétalos generalmente libres, de prefloración imbricada o valvar, frecuentemente glandulosos. Estambres episépalos, más largos que los pétalos; filamentos libres, filiformes o subulados; anteras dorsifijas, versátiles, con conectivo frecuentemente glandular. Ovario 1-5-mero; carpelos ± libres, subsésiles o estipitados, a veces con un ginóforo común; estilo apical, ventral-lateral o subbasal (Fig. 1A); estigmas a veces concrescentes en la antesis; primordios seminales 2, colaterales, epítropos. Fruto de 1-5 folículos (los abortivos, en Cuba, persistentes) monospermos, a veces rostrados por la base persistente del estilo, abriéndose completamente (bivalvados) o solo del lado ventral (se mival vados) (Fig. 1B); pericarpo persistente por entero o separándose en exocarpo y endocarpo; exocarpo leñoso, rugoso, estriado o (no en Cuba) espinuloso, glanduloso; endocarpo cartilaginoso a apergaminado, elástico. Semillas de varias formas (Fig. 1C), adheridas directamente al pericarpo o endocarpo o colgando en un haz vascular placentario (Fig. 1B); *hilo* orbicular, ± triangular o alargadolinear (Fig. 1C), usualmente cubierto por un a rilo dio placentario membranáceo; *testa* lisa o rugosa, lustrosa, oscura.

Distribución: Género de ca. 200 especies tropicales (ca. 70 de ellas neotropicales), más unas 15 en las zonas templadas de América del Norte y este de Asia. En Cuba crecen 25 especies, 13 de ellas endémicas.

Taxonomía: Zanthoxylum, que Engler (1896, 1931) incluye en la subfamilia Rutoideae Arn., ocupa posiblemente una posición basal dentro de la familia (Fish & Waterman 1973, Waterman 1975, 1977, Silva & al.1988). Engler acepta la separación de los dos géneros linneanos Zanthoxylum s. str. (las ca. 15 especies extratropicales, norteamericanas y de Asia oriental, caracterizadas por un perianto simple) y Fagara (las ca. 200 especies tropicales, cuyo perianto se diferencia en cáliz y corola). Sin embargo, datos químicos, morfológicos y anatómicos (Saunders 1934, Moore 1936, Hartley 1966, Fish & Waterman 1973, Waterman 1975, 1977, Yamazaki 1988, Beurton 1994) indican que esta separación es artificial. No existe revisión global de Zanthoxylum posterior a la de Engler (1931), sino varios estudios de carácter regional o de taxones particulares (p. ej. Hartley 1966 para Malasia, Beurton 1986a-b, 1987, 2001 para Cuba y La Española, Pirani 1993 para Brasil, Kallunki 2005 para la Guayana Venezolana). La revisión de las especies neotropicales por Reynel (disertación desafortunadamente inédita, escrita en San Luís, Missouri, en 1995, disponible en microfichas) es un primer intento hacia una sinopsis moderna.

Los caracteres de mayor valor taxonómico (ver Urban 1896, Beurton 1994, 1996) se refieren al indumento (tricomas simples, estrellados o ausentes), perianto (3-, 4- ó 5-mero), gineceo (1- a 5-mero), a los carpelos (con estilo, terminal, lateral o basal), folículos (dehiscencia) y semillas (modo de fijación). En Antillas, la ausencia de filodios y presencia de domacios se correlacionan con estilos terminales (especies 1 a 12) y presentan valor práctico para la identificación, al igual que los pelos bífidos o estrellados, limitados a especies con estilos laterales (especies 13 a 25; Beurton 1994: f. 9). Por otro lado, la morfología y posición de las inflorescencias así como el número de folículos pueden variar dentro de las especies. Las semillas pequeñas, globosas o semiglobosas se consideran como más originarias que las semillas comprimidas lateralmente o cuneiforme-aplanadas, usualmente mayores (Gregor 1977).

Palinología: Granos de polen de tipo similar a los de *Pilocarpus* (Barth 1985: 147): pequeños a medianos, 3(-4)-colporados, isopolares,

prolado-esferoidales, subprolados o prolados, con aperturas longicolpadas y ora lalongada, y exina esculturada, usualmente reticulada (Heusser 1971, Lobreau-Callen & al. 1975, Barth 1981). En las especies cubanas el tamaño del polen varía desde  $15.5 \times 11.8~\mu m$  en Zanthoxylum~cubense hasta  $35 \times 24~\mu m$  en Zanthoxylum~flavum (datos inéditos de la autora).

C i t o l o g í a : Números cromosómicos: *n* = 12, 16, 18, 33-36, ca. 66, 68 (Stace & al. 1993).

Biología de la reproducción: La pequeñez de las flores indica polinización por insectos diminutos, incapaces de superar obstáculos importantes y largas distancias, lo que junto a la variabilidad de los suelos quizás haya favorecido la diferenciación de las especies en Cuba. La coloración de las semillas (lustrosas, negras teñidas de azul o rojo) contrasta con su fondo amarillento (endocarpo), rojizo o verde (exocarpo), lo que sugiere la dispersión por aves. La presencia de eleosomas, aun pequeños, indica una posible mirmecocoria.

F i t o q u í m i c a : *Zanthoxylum* pertenece a un pequeño grupo de géneros de *Rutaceae* caracterizado mayormente por la presencia de alcaloides del tipo de la 1-benziltetrahidroisoquinolina. Esas sustancias se consideran como indicadoras de grupos primitivos, p. ej. *Annonales* Lindl. o *Papaverales* Dumort., por lo que *Zanthoxylum* fue considerado como el posible género "proto-rutáceo" (Fish & Waterman 1973).

## Clave para las especies cubanas

1	Peciolo alado o filódico; ramas jóvenes zigzagueantes
1*	Pecíolo ± surcado en la haz, pero no alado; ramas jóvenes rectas o
	poco flexuosas
2	Folíolos 3-17, pecíolo y raquis alados
2*	Folíolos 1-2, o pecíolo filódico
3	Flores 3(-4)-meras; carpelo 1; estilo lateral, arqueado
3*	Flores 4(-5)-meras; carpelos 1-2; estilo terminal 4
4	Folíolos 3-5(-13), de 0,1-0,7(-1) cm de ancho, obovado-lanceolados o estrechamente ovales, raramente ovados; flores solitarias o en glomérulos axilares paucifloros




Figura 1. *Zanthoxylum*, esquemas comparativos de ovarios (A), folículos dehiscentes con semilla (B) y semillas (C) en vista lateral y ventral (dibujos de Michael Rodewald). Carpelo con estilo terminal (A1), con estilo lateral arqueado hacia el dorso (A2), lateral (A3) y subbasal (A4). Folículo bivalvado con semilla adherida a una valva (B1), bivalvado con semilla adherida al endocarpo (B2), semivalvado con semilla adherida al pericarpo (B3) y semi- a bivalvado con semillas colgantes (B4-5). Semilla subglobosa, con hilo triangular a orbicular (C1), comprimido-elipsoidea a reniforme, con base truncada cuneiforme e hilo  $\pm$  triangular (C2) y comprimidas, subreniformes, con hilo linear (C3). -do = cresta dorsal, en = endocarpo, ex = exocarpo, gf = ginóforo, h = hilo, m = micrópilo, r = rafe.

A1-B1-C1: especies 1 a 10; A1-B2-C1: especies 11 y 12; A2-B2-C1: especies 13 a 16; A3-B3-C2: especies 20 a 25; A4-B4-C2: especies 18 y 19; A4-B5-C3: especie 17.

4*	Folíolos 5-17, de 0,5-2,2 cm de ancho, usualmente obovados u ovales; flores en espigas o racimos espiciformes axilares, o en fascículo de espigas
5	Folíolos mayormente obovados, de $(0,5-)2,5(-3)$ cm de largo; pecíolos y raquis conspicuamente alados; acúleos presentes, recurvados. inflorescencias densas, de 1-2 cm de largo; carpelos 2; folículos de $\leq 4$ mm de diámetro, su estípite de $\geq 2$ mm de largo 1.1. Z. fagara
5*	Folíolos ovales o elíptico-obovados, de (1,5-)3,5(-6) cm de largo; pecíolo y raquis estrechamente alados; acúleos, cuando presentes, comúnmente rectos; inflorescencias laxas, de ca. 10 cm de largo; carpelo 1; folículos de > 4 mm de diámetro, su estípite de 1 mm de largo
6	Folíolos ausentes
6*	Folíolos por lo general 1 ó 2
7 7*	Folíolos por lo general 1
8	Folíolos con 1-2 domacios membranosos pardos en el envés, cerca de la base; pecíolo de $\leq$ 2,5 mm de ancho, linear o estrechamente oval 1.4. Z. bissei
8*	Domacios ausentes; pecíolo de 7-22 mm de ancho, obovado-elíptico, anchamente obovado u obovado-triangular 1.5. Z. phyllopterum
9 9*	Folíolos lineares, de 0,8-2(-4) mm de ancho, obtusos 1.8. Z. dumosum Folíolos ovales, oblongo-obovados u obovados, de 1,5-10 mm de ancho, redondeado-emarginados
	Folíolos más anchos que el pecíolo
11	Folíolos de 3-5(-10) mm del ancho; pecíolo de 8-12(-20) mm de largo ambos normalmente con un acúleo subapical recto y largo (3-5 mm) en el envés (Fig. 2.2.)
11*	Folíolos de 1,5-3(-7) mm de ancho; pecíolo de 3,5-8(-15) mm de largo, normalmente con un acúleo subapical recurvado y corto (2-3 mm) en el envés
12	Plantas glabras o escasamente pubérulas cuando jóvenes; glándulas pelúcidas frecuentes solo cerca del margen de los folíolos
12*	Ramas, hojas (especialmente por el envés) e inflorescencia pubescentes cuando jóvenes; glándulas ± pelúcidas numerosas por toda la lámina foliolar

13	Hojas de $\leq 1$ cm de largo, con folíolos orbiculares a espatulados de $1,2-4(-6)\times 1,2-2(-4)$ mm
13*	Hojas mayores
	Eje de la inflorescencia con un engrosamiento suberoso; flores 5-meras; folículos 5; endocarpo adherido al exocarpo 1.18. Z. caribaeum
	Eje de la inflorescencia sin engrosamiento suberoso; flores 3-4-meras. folículos 1-3; endocarpo separándose del exocarpo
15 15*	Flores 4-meras
16	Glándulas foliolares conspicuas y formando una cadena regular cerca del margen; folíolos 3(-5); arbolitos inermes, no o poco ramosos, de ca. 1,4 m de alto
16*	Glándulas submarginales de los folíolos ausentes o inconspicuas; folíolos 3-∞; árboles o arbustos más altos o muy ramosos, inermes o aculeados
17	Inflorescencias usualmente axilares, en panícula pauciflora; raquis foliar (cuando presente) con frecuencia alado 1.15. Z. taediosum
17*	Inflorescencias usualmente terminales, en corimbo multifloro; raquis foliar surcado pero no alado
18	Folíolos de $\leq$ 2(-3) cm de largo, ovados u orbiculares
18*	Folíolos de $\geq 2$ cm de largo, ovales, obovados o subovados 19
	Hojas mayormente imparipinnadas; nervios secundarios frecuentemente densos y paralelos; carpelo 1
9*	Hojas mayorente paripinnadas; nervios secundarios usualmente más espaciados, irregularmente dispuestos; carpelos 1 ó 3
20	Folíolos coriáceos, redondeados (algunos a veces emarginados u obtusamente acuminados); carpelos 3; estilo apical, recto
*00	Folíolos cartáceos a subcoriáceos, acuminados; carpelo 1; estilo lateral, recurvado
21	Folíolos por el envés con diminutos pelos simples
1*	Folíolos por el envés con diminutos pelos bífidos o estrellados 22
	Hojas de 60-90 cm de largo; folíolos 16-26, alternos, de 10-20 cm de largo
	Hojas de $\leq$ 55 cm de largo; folíolos 5-11(-15), opuestos o subopuestos, de 2-10(-15) cm de largo

23	Folíolos velutinos por todo el envés, de 0,7-1,2(-2) cm de ancho
23*	Folíolos, en el envés, glabros o con pelos esparcidos excepto en los nervios, de 0,9-6 cm de ancho
24	Folíolos frecuentemente $\pm$ doblados hacia abajo, retusos a emarginados, de margen subentero $\pm$ revoluto, el terminal más grande que los laterales
24*	Folíolos planos, acuminados, obtusos o, si retusos o emarginados, de margen plano y crenado, el terminal no marcadamente más grandes que los laterales
25	Hojas de ca. 15 cm de largo; folíolos retusos o emarginados, de margen crenado, los laterales sésiles
25*	Hojas de 20-55 cm de largo; folíolos acuminados, obtusos o redondeados, raramente retusos, de margen normalmente crenulado, los laterales $\pm$ peciolulados
26	Folíolos verde pálido en ambas caras, por lo general redondeados, obtusos u obtusamente acuminados; glándulas pelúcidas de tamaño y número variables
26*	Folíolos verde oscuro en la haz, más claro en el envés, usualmente largamente acuminados; glándulas pelúcidas grandes y numerosas  1.24. Z. dictyophyllum
	1.24. Z. alciyophyitani

- **1.1. Zanthoxylum fagara** (L.) Sarg. in Gard. & Forest 3: 186. 1890 ≡ *Schinus fagara* L., Sp. Pl.: 389. 1753 ≡ *Pterota fagara* (L.) Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 417. 1766 ≡ *Fagaras fagara* (L.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 3(2): 34. 1898. Lectotipo (Porter 1977: 445): [ícono] "*Lauro affinis Jasmini folio alato, costa media membranulis utrinque extantibus alata, ligni duritie ferro vix cedens*" en Sloane, Voy. Jamaica 2: t. 162, f. 1. 1725.
- Fagara pterota L., Syst. Nat., ed. 10: 897. 1759 ≡ Zanthoxylum pterota
  (L.) Kunth in Humboldt & al., Nov. Gen. Sp. 6, ed. 4°: 3; ed. f°: 3.
  1823. Lectotipo (Adams in Jarvis & al. 1993: 47): [espécimen] "Fagara Pterota A, Br[owne]", Herb. Linn. #152.2 (LINN!).

Arbusto o arbolito de 2-6(-10) m de alto. *Tronco* aculeado; ramas jóvenes zigzagueantes o geniculadas, pubérulas, usualmente con acúleos de 3-6 mm de largo, ligeramente recurvados, aislados o pareados. *Hojas* imparipinnadas, de 2,5-8(-11) cm de largo;  $peciolo - de \le 2$  cm de largo - y raquis alados; foliolos 5-13, subsésiles, obovados, ovales o suborbiculares, de 0,5-3 × 0,5-2 cm, cartáceos a coriáceos, pelúcido-glandulosos, redon-

deados a emarginados, de base cuneiforme o redondeada y margen  $\pm$  crenado distalmente, usualmente con domacios. *Inflorescencias* axilares, en espiga, racimo espiciforme o fascículo de espigas o racimos, de 1-2 cm de largo. *Pedicelos* de 0,3-1 mm de largo. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\hookrightarrow$ ) 4-meras. Sépalos libres, romboidal-triangulares, de 1,2-1,5 mm de largo y ancho, glandulosos, de margen eroso. *Pétalos* ovales u obovados, de 2-3 mm de largo, amarillo verdoso, de margen ciliado. *Ovario* 2-mero; *carpelos* libres, con estípite delgado de (1-)2-4,5 mm de largo; *estilo* terminal. *Folículos* (1-)2, bivalvados, estipitados, de 2,5-3,5(-4) mm de diámetro. *Semillas* globosas, de 2-2,9 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; *hilo* triangular o circular, de 0,8-1,2 mm de largo, a veces hundido. – Fl. y Fr: I-XII.

D i s t r i b u c i ó n : Estados Unidos de América (Texas y Florida), México, América Central y del Sur, Bahamas y Antillas Mayores. Presente en Cuba occidental: PR, Hab, C Hab, Mat, IJ, Cuba central: VC (Manacas), Ci, SS, CA (Cayo Coco), Cam, LT (Playa Herradura) y Cuba oriental: Gr (entre Yara y Manzanillo), Ho, SC, Gu. Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, bosque semideciduo microfilo, con frecuencia en vegetación secundaria, ocasionalmente en matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina. – Mapa 1.



Mapa 1. Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.

F i t o q u í m i c a : Se ha identificado, mediante tamizaje fitoquímico, la presencia de alcaloides en hojas y tallos (Kuck & al. 1967, Fish & Waterman 1973, Dominicis & al. 1995, Fernández & al. 1995) y saponinas en tallos (Fernández & al. 1995). El aceite esencial que contienen las hojas contiene alfa-bisabolol (Pino & al. 2005).

U s o s : Ha sido considerada como planta indeseable (Roig 1933, Acuña 1974). La madera, "bastante dura, puede servir para leña, carbón y postes de cerca" (Fors 1968: 44).

N o m b r e s c o m u n e s : Amoroso, aruña gato, chivo, limoncillo, tarro de chivo, uña, uña de gato, zarza de tomeguín (León & Alain 1951, Roig 1963, Sauvalle 1873).

- **1.2. Zanthoxylum insulare** Rose in N. Amer. Fauna 14: 79. 1899. Holotipo: [espécimen] México, Islas de las Tres Marías, "María Madre Isl.", 3 a 25-V-1897, *Nelson 4278* (US #390641!).
- = Fagara culantrillo var. insularis Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 574. 1896. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Jamaica, near Tweed-side south St. Andrew, 8-VIII-1894, Harris 5294 (K #381180 [foto!]).
- = Fagara nigrescens Urb. & Ekm. in Ark. Bot. 22A(8): 53. 1929 [non Fagara nigrescens R. E. Fr. 1909] ≡ Zanthoxylum nigrescens J. Jiménez Alm. in Rhodora 62: 237. 1960 ≡ Zanthoxylum atratum Alain in Mem. New York Bot. Gard. 21: 120. 1971, nom. illeg. Holotipo: [espécimen] Haití, "Massif du Nord, Ennery, top of Mt. Perroy", 1075 msm, 13-VI-1927, Ekman H.8431 (S! [anotado "typus" por Urban]; isotipo: S!).

Árbol de 3-8(-12) m de alto. Tronco aculeado o inerme. Ramas subrectas, las jóvenes a veces zigzagueantes, glabras o pubérulas, inermes o con acúleos usualmente rectos. Hojas imparipinnadas, de 

15 cm de largo, glabras o pelosas, aculeadas o inermes;  $peciolo - de \le 3$  cm de largo - yraquis canaliculados, con o sin ala estrecha; folíolos (7-)9-15(-17), opuestos o subopuestos, ± peciolulados, obovado-lanceolados a obovados u ovales, de (1.5-)3-4(-6) × 1.2-2.2 cm, cartáceos, pelúcido-glandulosos sobre todo hacia el margen, frecuentemente nigrescentes, redondeados, retusos o emarginados, de base cuneiforme y margen crenado; usualmente con domacios. Inflorescencias axilares, en espiga laxa, racimo espiciforme o fascículo de espigas o racimos, de hasta 10 cm de largo. Pedicelos de 0-0,8 mm de largo. Flores (♂ y ♀) 4(-5)-meras. Sépalos gruesos, triangulares o semiorbiculares, libres, glandulosos por fuera. Pétalos oblongoelípticos a ovales, redondeados, en parte cuculados. Ovario 2-mero; carpelos libres, ± sésiles; estilo terminal. Folículo usualmente único, bivalvado, de 4-6(-7) mm de diámetro, con estípite de ca. 1 mm de largo. Semillas globosas, de 3,5-4 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; hilo variable, orbicular a triangular, de 1,5-1,8 mm de largo. (Descripción en parte basada en material no cubano; de Cuba solo se conoce estéril). - Fl.: I-IV, VI; Fr.: II-V.

Distribución: Islas Pacíficas de México (Tres Marías y Socorro), América Central (Nicaragua, Panamá), ¿quizás en América del Sur?, Jamaica, La Española. Presente en Cuba oriental: SC (Sierra Maestra, Loma Josefina). Conocido en Cuba de una sola recolección hace más de 85 años. – Mapa 2.

T a x o n o m í a : Reynel (disertación inédita) considera Zanthoxylum insulare Rose como sinónimo de su "Zanthoxylum fagara subsp. lentiscifolium" (combinación inédita), pero en Antillas, Zanthoxylum fagara y Zanthoxylum insulare son morfológicamente distintos y no forman transición.



Mapa 2. Zanthoxylum insulare Rose

- **1.3. Zanthoxylum tragodes** (L.) DC., Prodr. 1: 725. 1824 ≡ *Schinus tragodes* L., Sp. Pl.: 389. 1753 ≡ *Fagara tragodes* (L.) Jacq., Enum. Syst. Pl.: 12. 1760 ≡ *Pterota tragodes* (L.) Crantz, Inst. Rei. Herb. 2: 417. 1766. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] "*Fagara tragodes*", Herb. Clifford: 489, Oidea #11 (BM!).
- = Fagara spinifex Jacq., Fragm. Bot.: 10. 1800 ≡ Zanthoxylum spinifex (Jacq.) DC., Prodr. 1: 728. 1824. Lectotipo (designado aquí): [ícono] en Jacquin, Fragm. Bot.: t. 6, f. 2. 1800, de un material de Venezuela: Caracas.
- ?=Zanthoxylum leonis Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 23. 1950 ≡ Fagara leonis (Alain) Kereszty in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 25: 12. 1979. Holotipo: [espécimen] Cuba, "Cuabal de Figueras, NE of Canasí", 31-V-1928, León 13376 (HAC!; isotipos: HAC!, NY #67229!, US #2815171!).

Arbusto de 1-3(-5) m de alto. *Ramas* jóvenes usualmente zigzagueantes o geniculadas; con acúleos pardos de 1,5-3(-8) mm de largo, rectos o rara vez recurvados, usualmente pareadas. *Hojas* impari- o paripinnadas, de 1-6 cm de largo, subglabras; *pecíolos* y segmentos del raquis alados, estre-

chamente ovales, oblongo-obovados u obovado-lanceolados, de (3-)6- $13(-20) \times (0.5-)8-3(-8)$  mm, segmentos a menudo con acúleos apicales aislados o pareados; folíolos (1-)3-5(-13), sésiles o subsésiles, obovadolanceolados, ovales u ovados, rara vez suborbiculares, de 3-15(-20) × 1-7(-10) mm, cartáceos a coriáceos, redondeados, truncados o emarginados y con glándula terminal, de base cuneiforme o redondeada y margen entero o crenulado, pelúcido-glanduloso; usualmente con 2 domacios pardo brillante. Inflorescencias axilares, unifloras o en fascículo paucifloro. Flores (& v 2) subsésiles, 4(-5)-meras. Sépalos libres, triangulares, de margen ciliado; Pétalos ovales, de base truncada, algunos a veces cuculados, a menudo (al igual que los sépalos) con una glándula subapical. Ovario 2-mero; carpelos libres, subsésiles; estilo terminal. Folículos (1-)2, bivalvados, cortamente estipitados, ± globosos, de (2,2-)2,5-3(-3,5) mm de diámetro, frecuentemente glanduloso-verrugosos, a menudo cortamente rostrados. Semillas globosas, de 2-3,5 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; hilo triangular-deltoideo, de 1-1.2 mm de largo. – Fl. y Fr.: I-VIII.

Distribución: América del Sur (Surinam: *Wullschlägel 93,* W!), Antillas Mayores y Menores. Presente en Cuba occidental: Hab (Canasí, Cuabal de Figueras) y Cuba oriental: Ho (Bahía de Naranjo), SC (alrededores de La Plata), Gu. Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, bosque siempreverde microfilo, y excepcionalmente matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, entre 0 y 600 msm. – Mapa 3.



Mapa 3. Zanthoxylum tragodes (L.) DC.

V a r i a b i l i d a d : Muy variable en el desarrollo de los acúleos, número y ancho de los folíolos y segmentos del raquis. Plantas con folíolos anchos han sido confundidas con *Zanthoxylum fagara*. En Cuba predominan plantas con folíolos (mayormente solo 3) y raquis estrechos y acúleos frecuentemente rectos, llamados *Zanthoxylum spinifex* por los autores. El

número de folíolos parece aumentar hacia el este: en Antillas Menores se hallan con frecuencia plantas con 7 o más folíolos de ancho variable. De La Española se conocen plantas con segmentos del raquis más anchos y venosos y acúleos recurvados de hasta 5 mm de largo en el extremo del pecíolo y de los segmentos del raquis, el *Zanthoxylum tragodes* de varios autores (el lectotipo de ese nombre posee hojas con pecíolo y raquis inermes y 9 a 13 folíolos anchos).

Zanthoxylum leonis, solo conocido de la recolección tipo, se incluye provisionalmente en la sinonimia de Zanthoxylum tragodes. Muestra folíolos relativamente anchos y acúleos recurvados en la base de las hojas y del raquis, pareciéndose bastante al lectotipo de Zanthoxylum tragodes. Sin embargo fue colectado al oeste de Matanzas, en localidad muy lejana de las otras cubanas de Zanthoxylum tragodes (ver Mapa 3), y además atípicamente en sustrato de serpentina. La planta tiene polen normalmente desarrollado (datos inéditos de la autora). Berazaín & al. (2005) consideran Zanthoxylum leonis como especie independiente, extinta.

**1.4. Zanthoxylum bissei** Beurton in Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 6(2): 3. 1986. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Baitiquirí en el camino a la Mina del Yeso, monte seco", 11-IV-1972, *Bisse & Berazaín 21779* (HAJB!; isotipos: B!, HAJB!, JE!). — Fig. 2.7.

Planta trepadora por acúleos recurvados de 2-3 mm de largo, aislados o pareados. Ramas glabras, las jóvenes zigzagueantes o geniculadas. Hojas 1(-3)-folioladas, de 1,5-4 cm de largo, ± coriáceas, glabras o con tricomas simples, con o sin acúleos recurvados cortos en la haz en el nervio medio; peciolo filodiiforme, inequilátero, linear a estrechamente oval, de  $(5-)12(-20) \times 1.8-2.5$  mm, truncado, de base  $\pm$  redondeada o truncada; folíolos insertados en un pulvínulo, estrechamente lanceolados u ovales, de (5-)8-11(-20) × (1,5-)2-2,5 mm, redondeado-emarginados y con glándula apical, de base ± truncada y margen recurvado, crenulado y pelúcidoglanduloso; normalmente con 2 domacios. Inflorescencias axilares, uni- o paucifloras, subsésiles. Pedicelos de 0,5-1,5 mm de largo. Flores (solo 3) 4(-5)-meras, de prefloración imbricada. Sépalos libres, coriáceos, de 0,8-1,2 mm de ancho, oblicuamente triangulares o rómbicos, de margen eroso. Pétalos de 2-2,5 mm de largo, con una glándula subapical (al igual que los sépalos), los exteriores y el más interno naviculares, cuculados, de base oblicuamente truncada. Rudimento ovarial 2-mero. Frutos desconocidos. - Fl.: IV-V; Fr.: ?

Distribución: Endémico en Cuba oriental: Gu (San Antonio del Sur: Baitiquirí, camino a Mina de Yeso y Lomas al este del Abra de Mariana). Crece en bosque siempreverde microfilo, sobre caliza, entre 100 y 300 msm. Categorizado como Amenazado (Oviedo 2007). — Mapa 4.

T a x o n o m í a : Probablemente relacionado con *Zanthoxylum tragodes*, al cual se parece en la morfología foliar, de la inflorescencia y de las flores masculinas.



Mapa 4. Zanthoxylum bissei Beurton

- **1.5. Zanthoxylum phyllopterum** (Griseb.) C. Wright in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 5: 287. 1868 ≡ *Fagara phylloptera* Griseb., Cat. Pl. Cub.: 48. 1866. Holotipo (ver Beurton 1986a: 31-32): [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Monte Toro", 15-IX, *Wright 2185* (GOET!).
- = Fagara dumosa var. platyphylla Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 581. 1896. Holotipo: Cuba, Wright 2185 p.p. (B†). Fig. 2.1.

Planta trepadora mayormente por acúleos rojo pardusco de 5-8 mm de largo, rectos o recurvados, aislados o pareados. *Ramas* jóvenes zigzagueantes o geniculadas. *Hojas* (0-)1(-3)-folioladas,  $\pm$  coriáceas, de margen  $\pm$  recurvado, crenulado, pelúcido-glanduloso; *peciolo* con un estípite basal de 2-3(-4) mm de largo y una porción filodiiforme oval a  $\pm$  anchamente obovada u obtriangular, de (7-)10-18(-22)  $\times$  (4-)8-13(-17) mm, frecuentemente con una acúleo subapical en el envés y otros menores en el margen, de base cuneiforme; *foliolos*  $\pm$  anchamente obovados, de (4-)8-13(-23)  $\times$  (4-)6-10(-12) mm, aculeados en el envés en el nervio medio, emarginados, de base cuneiforme. *Inflorescencias* axilares, unifloras o en glomérulo paucifloro. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\updownarrow$ ) subsésiles, 4-meras, de 4-5 mm de largo. *Sépalos* libres, romboidales, de 1-1,2 mm de largo. *Pétalos* ovales, a veces cuculados, de margen eroso y ciliado (al igual que los sépalos) y

base a veces truncada. *Anteras* con un conectivo glandular grande. *Ovario* 2-mero; *carpelos* libres, sésiles; *estilo* terminal. *Folículos* 2(-1), bivalvados, redondeado-elipsoideos, de 3-3,5 × 2-2,5 mm, gruesos, rugosos, con rostro corto a menudo persistente. *Semillas* subglobosas, de 2,2-3 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; *hilo* de 0,8-1,5 mm de largo, triangular-deltoideo u orbicular, a veces hundido. – Fl.: IX, XII; Fr.: IX.





Figura 2. Zanthoxylum: hojas de especies con pecíolos ensanchados (reproducido, con permiso del editor, de Beurton 1987: 66).

1. Zanthoxylum phyllopterum (Griseb.) C. Wright (derecha: hoja filódica); 2. Zanthoxylum rolandii Beurton; 3. Zanthoxylum dumosum A. Rich.; 4. Zanthoxylum pseudodumosum Beurton; 5. Zanthoxylum arnoldii Beurton (filodio); 6. Zanthoxylum ignoratum Beurton; 7. Zanthoxylum bissei Beurton.

D i s t r i b u c i ó n : Endémico en Cuba occidental: PR (Finca Toscano; El Pendejeral) y Cuba oriental: Gu (Monte Cristo; Monte Toro; Monte Líbano). Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, bosque siempreverde mesófilo y bosque pluvial montano, entre 0 y 800 msm. – Mapa 5.

F i t o q u í m i c a : Mediante técnica de tamizaje se ha detectado la presencia de saponinas en las hojas (Alemán & al. 1972).



Mapa 5. Zanthoxylum phyllopterum (Griseb.) C. Wright

**1.6. Zanthoxylum rolandii** Beurton in Feddes Repert. 97: 35. 1986. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Mun. La Palma: al pie oeste de Loma Peluda (Preluda) de Cajálbana, cuabales, serpentina", 21-I-1981, *Berazaín & al. HFC 43476* (HAJB!; isotipos: B!, HAJB!, JE!).

− Fig. 2.2.

Arbusto muy ramoso, erecto o trepando por acúleos. *Ramas* jóvenes zigzagueantes o geniculadas; subglabras, con numerosos acúleos rojo pardusco volviéndose gris claro, de (6-)8-10(-14) mm de largo, rectos, aislados o pareados. *Hojas* con agradable aroma a cítrico, (0-)1(-3)-folioladas, de 1-2 cm de largo, coriáceas, con acúleos rectos aislados o pareados en el envés en el nervio medio, de margen recurvado, crenulado, pelúcido-glanduloso, distalmente a menudo aculeado; *pecíolo* filodiiforme casi hasta la base, oval a oblongo-obovado, de 8-12(-20)  $\times$  3-6(-12) mm, distalmente redondeado, de base cuneiforme; *foliolo* oval a oblongo-obovado, de (4-)6-10(-15)  $\times$  3-5(-10) mm, emarginado, de base cuneiforme. *Inflorescencias* axilares, unifloras o en glomérulo paucifloro. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\hookrightarrow$ ) sésiles, 4-meras. *Sépalos* libres, ovales, de 1,2-2 mm de largo, de margen eroso. *Pétalos* obovados o cuculados, de 2,3-3  $\times$  1,5-1,8 mm, de margen eroso, con una glándula subapical (al igual que los sépalos). *Anteras* con

un conectivo glandular grande. *Ovario* 1-2(-3)-mero; *carpelos* libres, subsésiles; *estilo* terminal. *Folículos* 1-2, bivalvados, redondeado-elipsoideos, de (5-)5,5-6 mm de largo, con rostro de 0,5-1 mm de largo. *Semillas* (inmaduras) adheridas al pericarpo. – Fl.: IX-III; Fr.: IX.

Distribución: La Española (Beurton 2000b). Presente en Cuba occidental: PR (Loma Preluda de Cajálbana; valle del río Las Vueltas). Crece en matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, entre 50 y 300 msm. – Mapa 6.



Mapa 6. Zanthoxylum rolandii Beurton

**1.7. Zanthoxylum arnoldii** Beurton in Feddes Repert. 98: 65. 1987. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Santiago de Cuba, "Sierra de Nipe, in carrascales ad Rio Barigua", 30-IX-1922, *Ekman 15306* (S!; isotipo: NY #67218!).

Arbusto erecto muy ramoso, de 3-4 m de alto. *Ramas* jóvenes zigzagueantes o geniculadas, pubérulas luego glabrescentes, con numerosos acúleos rojo pardusco volviéndose gris claro, de (4-)5-7(-10) mm de largo, rectos o ligeramente recurvados, aislados o pareados. *Hojas* filódicas; *folíolos* ausentes o rudimentarios; *filodio* con estípite basal de ca. 4 mm de largo y porción laminar oval, oblongo-obovada u oblongo-obtriangular, de 7-9(-12) × (2-)3-4(-5) mm, ± coriácea, cerca del ápice con un acúleo medial-abaxial grueso y 1-2 marginales más finos, de margen revoluto, crenulado, pelúcido-glanduloso. *Inflorescencias* (3) axilares, unifloras o en glomérulo paucifloro. *Flores* (solo 3) sésiles, 4(-5)-meras. *Sépalos* libres, triangular-romboideos, de 1,4 × 1,1 mm, coriáceos en el centro, con una glándula subapical, de base truncada y margen eroso. *Pétalos* obovados o cuculados, de 2 × 1,4 mm, subcoriáceos en el centro, de base truncada y margen eroso en parte ciliado. *Anteras* con un gran conectivo

glandular. *Folículo* de 4 mm de diámetro, bivalvado. *Semillas* desconocidas. – Fl.: IX-X; Fr.: X.

Distribución: Endémico en Cuba oriental: Ho (Sierra de Nipe: Loma del Winche; Loma Mensura), SC (río Bariguá). Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, hasta 1000 msm. – Mapa 7.



Mapa 7. Zanthoxylum arnoldii Beurton

- **1.8. Zanthoxylum dumosum** A. Rich. in Sagra, Hist. Phys. Cuba, Pl. Vasc.:  $327.\ 1841 \equiv Fagara\ dumosa$  (A. Rich.) Griseb. in Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 8: 170. 1860. Lectotipo (Beurton 1987: 55): [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Vuelta de Abajo", [X-XI-1833?], Valenzuela ex herb. Richard (P!; isolectotipo: P!).
- = Fagara dumosa var. stenophylla Griseb., Cat. Pl. Cub.: 48. 1866. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Cajálbana-San Marcos", 28-VIII [1862 ó 1863], Wright 2186 (GOET!).
- Zanthoxylum acunae Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio
   "De La Salle" 9: 22. 1950. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "In cuabales, Cajálbana", 3-XII-1949, Alain & Acuña A-1235
   (HAC!; isotipos: HAC!, NY #67217!).

Arbusto erecto muy ramoso, de ca. 1,5 m de alto. *Ramas* jóvenes zigzagueantes o geniculadas, subglabras, con numerosos acúleos rojo pardusco volviéndose gris claro, de 5-6(-10) mm de largo, rectos o rara vez recurvados, aislados o pareados. *Hojas* 2-folioladas o con un tercer folíolo rudimentario, coriáceas, de margen revoluto, entero o crenulado, pelúcido-glanduloso; *pecíolo* filodiiforme excepto en la base, estrechamente oval a estrechamente elíptico-obovado, de 3-9(-11) × 0,8-2,3(-4) mm, frecuentemente con acúleos recurvados medial-abaxiales cerca del ápice, de base cuneiforme; *folíolos* de 4-9(-12) × 0,8-2(-4) mm, estrechamente

ovales o lineares, de ápice obtuso a veces recurvado y base cuneiforme. *Inflorescencias* axilares, unifloras o en glomérulo paucifloro. *Flores* (solo  $\circlearrowleft$ ) sésiles o subsésiles, 4-meras. *Sépalos* libres, triangulares, de 0,8-1 mm de largo y ancho, de margen eroso. *Pétalos* obovados o cuculados, de 2-2,3 mm de largo, subcoriáceos, de margen eroso. *Anteras* con un conectivo glandular grande. *Folículos* 2, bivalvados,  $\pm$  sésiles, globosos, de 2-3,2 mm de diámetro. *Semillas* globosas, de 1,7-2,5 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; *hilo*  $\pm$  triangular, de ca. 1 mm de largo. – Fl.: VII, X-XII: Fr.: X-I.

D i s t r i b u c i ó n : Endémico en Cuba occidental: PR (Loma Preluda de Cajálbana; Las Pozas; Bahía Honda; San Marcos). Crece en matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, entre 100 y 300 msm.— Mapa 8.



Mapa 8. Zanthoxylum dumosum A. Rich.

- **1.9. Zanthoxylum pseudodumosum** Beurton in Feddes Repert. 98: 57. 1987. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Santiago de Cuba, "municipio Segundo Frente (Mayarí Arriba): Sierra del Cristal, en el camino de la loma Saca la Lengua al arroyo Mícara, charrascos con elementos de caliza sobre serpentina", 25-IV-1985, *Álvarez & al. HFC 56656* (HAJB!; isotipos: B!, JE!).
- "Fagara dumosa" et "Zanthoxylum dumosum" auct. fl. cub. plur. (non Zanthoxylum dumosum A. Rich. 1841). Fig. 2.4.

Arbusto erecto muy ramoso, de 1-4 m de alto. *Ramas* jóvenes zigzagueantes o geniculadas, con acúleos rojo pardusco volviéndose gris claro, de 4-8 mm de largo, rectos o raramente recurvados, aislados o pareados. *Hojas* (1-)2-folioladas o con un tercer folíolo rudimentario, coriáceas, ± negro-punteadas, de margen recurvado a revoluto, subcrenulado, pelúcidoglanduloso; *pecíolo* filodiiforme excepto en la base, oval o elípticoobovado, de  $(3,5-)4-8(-15) \times 1,5-3(-6)$  mm, frecuentemente con un acúleo recurvado medial-abaxial y 1-2 marginales  $\pm$  rectos y finos cerca del ápice; *folíolos* ovales, oblongo-obovados u obovados, de  $(3-)4-6(-14) \times (1,5-)2-3(-7)$  mm, emarginados o retusos, a veces con acúleos medial-abaxiales recurvados. *Inflorescencias* axilares, unifloras o en glomérulo paucifloro. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\hookrightarrow$ ) sésiles o subsésiles, 4(-5)-meras. *Sépalos* libres, elíptico-triangulares, de 1-1,3 mm de largo, coriáceos, suculentos hacia la base, con una glándula subapical, de base truncada y margen eroso. *Pétalos* heteromorfos, subplanos o naviculares y cuculados, de 1,8-2,8  $\times$  1-2 mm, glandulosos. *Estambres* de 3-3,5 mm de largo; *anteras* con conectivo glandular. *Ovario* 2-mero; *carpelos* libres, subsésiles; *estilo* terminal. *Folículos* 2, bivalvados, subsésiles, globosos, de (3-)3,5-4 mm de diámetro, apiculados. *Semillas* globosas, de 2,5-3 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; *hilo* triangular, de ca. 1,5 mm de largo. – Fl.: IV, VIII-I; Fr.: IV-VII, X-I.

D i s t r i b u c i ó n : Endémico en Cuba occidental: Hab (Canasí), Mat, Cuba central: VC, Ci (Aguada de Pasajeros), SS (Arroyo Blanco, San Felipe), CA (suroeste de Guadalupe), Cam y Cuba oriental: Ho, SC (Loma Saca la Lengua; cerca de Seboruco), Gu. Crece en matorral xeromorfo espinoso y subespinoso sobre serpentina, raras veces en sabana de suelo arenoso-arcilloso, entre 100 y 900 msm. – Mapa 9.

F i t o q u í m i c a : Tamizajes fitoquímicos han detectado la presencia, en "Zanthoxylum dumosum", de aminas, taninos, coumarinas, flavonoides y trazas de alcaloides y fenoles en tallos y hojas (Payo & al. 1996).

Nombre común: Ayúa dumosa (Roig 1963: 128, como "Zantho-xylum dumosum").



Mapa 9. Zanthoxylum pseudodumosum Beurton

- **1.10. Zanthoxylum ignoratum** Beurton in Feddes Repert. 98: 61. 1987. Holotipo: [espécimen] Cuba oriental, IX-1859 a I-1860, *Wright 1605* (GOET!; ¿isotipos?: GH!, K!, NY #67224!, P!).
- "Fagara dumosa" sensu Grisebach (1860: 170) (non Zanthoxylum dumosum A. Rich. 1841). Fig. 2.6.

Arbusto erecto muy ramoso, de ca. 2 m de altura. Corteza gris claro. Ramas jóvenes zigzagueantes o geniculadas, a veces pelosas, con acúleos rojo pardusco volviéndose gris claro, de 2-8 mm de largo, rectos o rara vez recurvados, aislados o pareados. *Hojas* (1-)2-folioladas o con un tercer folíolo mayormente rudimentario, cartáceas a subcoriáceas, con acúleos medial-abaxiales recurvados y marginales rectos cerca de los ápices segmentales, de margen ± recurvado, ligeramente crenulado, pelúcidoglanduloso; pecíolo filodiiforme excepto en la base, oval o elípticoobovado, de 5-12(-20) × (2-)3-4(-5) mm, de base cuneiforme a veces asimétrica; foliolos oboyados u oblongo-oboyados, de 5-10 × 3-8 mm. asimétricos, emarginados. Inflorescencias axilares, unifloras o en glomérulo paucifloro. Flores ( y ) sésiles o subsésiles, 4-meras. Sépalos libres, triangular-romboidales, de 1 × 0,8 mm, de margen eroso y ciliado. Pétalos oblicuamente ovados o naviculares y cuculados, de 2,3-2,4 × 1,3 mm, muy glandulosos, de margen eroso y ciliado. Anteras con conectivo glandular. Ovario 2-mero; carpelos libres, subsésiles; estilo terminal. Folículos 2, bivalvados, subsésiles, globosos, de 4-5 mm de diámetro. Semillas globosas, de ca. 3 mm de diámetro, adheridas al pericarpo; hilo triangular, de 1 mm de largo, algo hundido. – Fl.: XI-III; Fr.: III.



Mapa 10. Zanthoxylum ignoratum Beurton


Distribución: Endémico en Cuba central: SS (Pico Potrerillo; Loma del Burro) y Cuba oriental: SC (alrededores de Santiago de Cuba; cerca de Firmeza). Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, complejo de vegetación de mogotes y bosque pluvial montano, entre 0 y 1000 msm. Posiblemente extinto en SC, donde no se volvió a colectar desde 1945. – Mapa 10.

- **1.11.** Zanthoxylum coriaceum A. Rich. in Sagra, Hist. Phys. Cuba, Pl. Vasc.: 326. 1841 ≡ *Fagara coriacea* (A. Rich.) [Krug & Urb. ex] Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 117, 118. 1896 (Mar) [et (A. Rich.) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 591. 1896 (Mai)]. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. La Habana, "circa Guanimar, in Vuelta de Abajo", *Valenzuela* ex herb. Richard (P [con frutos]!; isolectotipo: P [estéril]!).
- = Zanthoxylum curbeloi Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 23. 1950 ≡ Fagara curbeloi (Alain) Kereszty in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 25: 11. 1979. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Las Tunas, "P[uerto] Padre", 10-IX-1931, Curbelo 96 (HAC!; isotipo: NY!).
- "Tobinia emarginata" sensu Grisebach (1860: 170; 1866: 48) et "Zanthoxylum emarginatum" sensu Sauvalle (1873: 19) (non Zanthoxylum emarginatum (Sw.) Sw. 1797).

Árbol o arbusto de 2-4(-7) m de alto. Tronco y ramas inermes o con acúleos de ca. 6 mm de largo, rectos o curvos. Hojas usualmente paripinnadas, glabras, con o sin acúleos en la haz; pecíolo de 1,5 cm de largo; folíolos 4-12(-13), con peciólulos de 2-4 mm de largo, opuestos o subopuestos, obovados, oblongo-obovados u ovales, de 2-7,1 × 1,3-3,9 cm, coriáceos, a veces opaco-glandulosos, redondeados, obtusos o cortamente acuminado-retusos, de base cuneiforme y margen subentero, revoluto, glanduloso. Inflorescencias terminales, glabras o pubescentes, en corimbo de  $\leq$  10 cm de largo. *Pedicelos* de 1,5-2 mm de largo. *Flores* ( $\partial y = 0$ ) 3(-4)-meras, de 2,5-3,5 mm de largo. Sépalos algo concrescentes, cóncavos, triangulares o semiorbiculares, de 0,3-0,8 mm de largo. Pétalos heteromorfos, planos o naviculares y  $\pm$  cuculados, de 2,8-3,1(-4) mm de largo, con una glándula subapical, de base unguiculada o truncada. Ovario 3(-4)mero; carpelos libres, subsésiles, de ca. 2,4 mm de largo; estilo terminal, de 0,75-0,8 mm de largo; estigma capitado. Folículos (1-)2(-3-4), bivalvados, globosos, de 4-4,3 mm de diámetro; exocarpo caedizo, glanduloso. Semillas globosas, de 2,8-3,2 mm de diámetro, adheridas al endocarpo persistente; hilo orbicular, de ≤ 1 mm de diámetro. – Fl.: III-VIII; Fr.: I-IX.

D i s t r i b u c i ó n : Estados Unidos de América (Florida), Bahamas, Islas Caimán, La Española. Presente en Cuba occidental: PR, Hab, C Hab

(Cojímar), Mat (Pan de Matanzas; Playa Larga), IJ, Cuba central: Ci (Los Tornos; San Blás), Cam (Playa Santa Lucía), LT (Puerto Padre) y Cuba oriental: Ho (Pinares de Mayarí: río Piloto), Gu (Monte Verde; Los Calderos). Crece en complejo de vegetación de mogotes, matorral xeromorfo costero y subcostero, bosque de pinos, bosque semideciduo mesófilo y microfilo, bosque siempreverde microfilo, generalmente sobre calizas, entre 0 y 800 msm. Registrado como "En Peligro Crítico" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 11.



Mapa 11. Zanthoxylum coriaceum A. Rich.

V a r i a b i l i d a d : Muy variable. Plantas de la costa norte de Cuba y de Bahamas frecuentemente muestran hojas más pequeñas.

T a x o n o m í a : Zanthoxylum coriaceum fue a menudo confundido con Zanthoxylum spinosum (L.) Sw., endémico en Jamaica, o con Zanthoxylum pimpinelloides, del cual difiere entre otros por su ecología: en Viñales (PR) Zanthoxylum coriaceum habita al pie de los mogotes y Zanthoxylum pimpinelloides en las alturas. Reynel (disertación inédita) incluye Zanthoxylum coriaceum en Zanthoxylum spinosum subsp. spinosum, ilustrando ese último con dibujos de Zanthoxylum coriaceum de Gran Caimán. Posiblemente sus afinidades reales hay que buscarlas con especies de La Española y Jamaica, de hojas usualmente imparipinnadas pero con folíolos semejantes, p. ej. Zanthoxylum venosum Leonard, Zanthoxylum domingense (Krug & Urb.) J. Jiménez Alm. Sin embargo, de estas todavía se desconocen las flores femeninas.

F i t o q u í m i c a : La corteza contiene alcaloides del tipo de la benzofenantridina (Ng & al. 1987).

U s o s : "La hermosa madera, de color amarillo, es empleada en carpintería urbana y rural" (Gómez & Roig 1914: 72).

N o m b r e s c o m u n e s : Ayuda brava, bayúa, bayúa de costa, bayúa lisa, bayuda (Sauvalle 1873, Gómez & Roig 1914, León & Alain 1951, Roig 1963).

- **1.12. Zanthoxylum pimpinelloides** (Lam.) DC., Prodr. 1. 726. 1824 ≡ *Fagara pimpinelloides* Lam., Tabl. Encycl. 1: 334. 1792. Holotipo: [espécimen] La Española, "e Domingo", [*Anónimo*] 278 (P-LA!).
- "Tobinia spinosa" sensu Grisebach (1866: 48) et "Zanthoxylum spinosum" sensu Sauvalle (1873: 19) (non Zanthoxylum spinosum (L.) Sw. 1797).

Arbusto siempreverde, de 2-3(-6) m de alto. Ramas frecuentemente aculeadas. Hoias mayormente paripinnadas, de 4-20 cm de largo; pecíolo – de 1-1,2(-1,5) cm de largo – y raquis sulcados, no alados, frecuentemente con acúleos rectos aislados o pareados en la base de los folíolos; folíolos (5-)6-8(-31), opuestos o subopuestos, ovados a orbiculares, de  $0.6-3(-4) \times 0.6-$ 1.8(-3) cm, coriáceos, a menudo con acúleos rectos en el envés, obtuso- a emarginado-acuminados, de base redondeada a cuneiforme y margen subrevoluto, entero o crenulado, glanduloso. Inflorescencias usualmente terminales, en corimbo de 0.8-5 cm de largo, ± aculeadas. Pedicelos de 0,6-1.5 mm de largo, frecuentemente pubescentes. Flores (♂ y ♀) 3-meras. Sépalos basalmente concrescentes, heteromorfos, de ca. 0,8 mm de largo, ± pubescentes, a veces con una glándula subapical. Pétalos heteromorfos, de 2-3 mm de largo, redondeados. Ovario 3-mero; carpelos libres, subsésiles, de 2,2-2,3 mm de largo; estilo terminal, de 0,7-0,8 mm de largo; estigma capitado. Folículos (1-)2(-3), bivalvados, globoso-elpsoideos, de 4-5 mm de largo, con estípite de ca. 0,5 mm de largo y rostro conspicuo; exocarpo caedizo. Semillas elpsoideo-globosas, de 3-4 mm de diámetro, adheridas al endocarpo persistente; hilo triangular u oblongo, de 0,8-1 mm de largo. – Fl.: I, III-V, VIII, XI; Fr.: IV, VIII, XI-XII.

Distribución: La Española. Presente en Cuba occidental: PR, Cuba central: SS (Loma de Banao; Topes de Collantes) y Cuba oriental: SC (Pico Turquino; entre Lagunitas y Aguada de Joaquín). Crece en complejo de vegetación de mogotes, bosque siempreverde mesófilo y microfilo, sobre caliza, entre 500 y 1600 msm.— Mapa 12.

T a x o n o m í a : A causa de las hojas semejantes Reynel (disertación inédita) trató *Zanthoxylum haitiense*, endémico de Haití, como sinónimo de *Zanthoxylum pimpinelloides*. Sin embargo, no hay relaciones estrechas

entre esas dos especies (Beurton 2000b). También ha sido confundido con *Zanthoxylum coriaceum* (q.v.).

Nombre común: Graciosa (Roig 1963: 436.).



Mapa 12. Zanthoxylum pimpinelloides (Lam.) DC.

**1.13. Zanthoxylum acuminatum** (Sw.) Sw., Fl. Ind. Occid.: 575. 1797 ≡ *Fagara acuminata* Sw., Prodr.: 33. 1788 ≡ *Tobinia acuminata* (Sw.) Desv. ex Ham., Prodr. Pl. Ind. Occid.: 57. 1825. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Jamaica, *Wright* (BM!).

Árbol glabro de 3,5-8 m de alto. *Tronco* con acúleos rectos o recurvados insertados en cojinetes comprimido-cónicos. *Hojas* siempreverdes, usualmente paripinnadas, de 7-25 cm de largo; generalmente inermes; *pecíolo* de 2-5 cm de largo; folíolos 4-8, con peciólulos de 3-10 mm de largo, opuestos, ovales u ovados, de 3,5-13 × 1,5-6 cm, cartáceos a subcoriáceos, acuminados, de base cuneiforme y margen subrevoluto o plano, entero o crenulado. *Inflorescencias* terminales, en panícula multiflora de  $\leq$  10 cm de largo. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\rightleftharpoons$ ) 3-meras. *Sépalos* libres o basalmente concrescentes, anchamente triangulares. *Pétalos* planos o los interiores cuculados, ovales, de 2,5 × 1,3 mm. *Ovario* monómero, de inserción diagonal; *estilo* lateral, arqueado. *Folículo* bivalvado, globoso a globoso-elipsoideo, de (4-)5 mm de largo; *exocarpo* caedizo. *Semillas* globoso-elipsoideas, de (3-)4 mm de largo, adheridas al endocarpo persistente; *hilo* oblongo-triangular, de 1,2-2,3 mm de largo. (Descripción en parte basada en material no cubano; de Cuba solo se conoce estéril). – Fl.: XII-V; Fr.: VI-VIII.

D i s t r i b u c i ó n : México, América Central y del Sur, Jamaica. Presente en Cuba oriental: Gr (Cabo Cruz; Alegría del Pío). Crece en bosque

siempreverde microfilo, entre 0 y 100 msm. Conocida en Cuba de tres recolecciones. – Mapa 13.

T a x o n o m í a : Reynel (disertación inédita) subdivide esa especie en varias subespecies que todavía esperan su publicación. El material de Antillas (Cuba y Jamaica), según él, pertenece a *Zanthoxylum acuminatum* subsp. *acuminatum*.

Nombre común: Ayúa baría (León & Alain 1951).



Mapa 13. Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw.

- **1.14. Zanthoxylum cubense** P. Wilson in Torreya 9: 32. 1909 ≡ *Fagara juglandifolia* Krug & Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 118. 1896 (Mar) [et Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 587. 1896 (Mai)] (non *Zanthoxylum juglandifolium* Willd. 1806) ≡ *Fagara cubensis* (P. Wilson) Urb. Symb. Antill. 9: 178. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Vuelta de Abajo, en la cumbre de montaña", XII, *Valenzuela* ex herb. La Sagra (P!; isolectotipo: P!).
- Fagara lomincola Urb., Symb. Antill. 9: 178. 1924 ≡ Zanthoxylum lomincola (Urb.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 23. 1950. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Lomas de Cuaba prope Baracoa, in pinetis", 23-XI-1914, Ekman 3595 (S!).
- "Zanthoxylum juglandifolium" sensu Richard (1841: 332), Grisebach (1866: 49) et Sauvalle (1873: 19) (non Zanthoxylum juglandifolium Willd. 1806).

Árbol glabro de hasta 15 m de alto, dioico o rara vez monoico. *Tronco* cuando viejo con acúleos rectos o recurvados insertados en cojinetes cónicos a veces comprimidos o no. *Hojas* generalmente imparipinnadas,

glabrescentes, usualmente inermes; *pecíolo* de 1-5 cm de largo; *folíolos* 3-9, con peciólulos de 1-5(-7) mm de largo, ovales, obovados u oblongoobovados, de 3-9 × 1,4-3,5 cm, ± gruesamente coriáceos, cortamente acuminados, obtusos, redondeados o emarginados, de base asimétrica
cuneiforme-estrechada y margen revoluto, entero. *Inflorescencias* terminales o axilares, en panícula frecuentemente multiflora de 1,5-17 cm de
largo. *Flores* ( y y ) 3-meras. *Sépalos* basalmente concrescentes, triangulares, de ca. 0,3 mm de largo. *Pétalos* ovales, de 1,5 mm de largo, redondeados. *Ovario* monómero, de inserción diagonal; *estilo* lateral, arqueado. *Folículo* bivalvado, cortamente estipitado, globoso a globoso-elipsoideo,
de 3-4,5(-5,5) mm de largo; *exocarpo* caedizo, frecuentemente glanduloso. *Semillas* globosas, de 2-3 mm de diámetro, adheridas al endocarpo
persistente; *hilo* orbicular o triangular, de 1,2-2 mm de largo. – Fl.: IIVIII, XI-XII (IV-V?); Fr.: IV-IX.

D i s t r i b u c i ó n : Bahamas (Andros), La Española (República Dominicana). Presente en Cuba occidental: PR, IJ (Ensenada de Siguanea; entre Cayo Piedras y Carapachibey), Cuba central: Ci (Buenos Aires), SS (Loma de Banao) y Cuba oriental: Ho, SC, Gu. Crece en bosque de pinos, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, bosque pluvial montano sobre serpentina, bosque siempreverde microfilo y bosque semideciduo, entre 0 y 1100 msm. Categorizado como Casi Amenazado (Oviedo 2007). – Mapa 14.

T a x o n o m í a : *Zanthoxylum cubense* no es sinónimo de *Zanthoxylum rhodoxylon* (Urb.) P. Wilson, endémico de Jamaica, como pretende Reynel (disertación inédita). Los dos difieren claramente en el indumento, las flores masculinas, los frutos y semillas, etc. El dibujo con el cual Reynel ilustra su "*Zanthoxylum rhodoxylon*" es en realidad *Zanthoxylum cubense*.



Mapa 14. Zanthoxylum cubense P. Wilson




Figura 3. Zanthoxylum taediosum A. Rich. (especímenes: HFC 29951, B [1-3], León 15018, HAJB [4], y León & Hioram 5616, US [5-6]; dibujos de Michael Rodewald). 1. Rama con frutos; 2. Folículo abierto, con exocarpo parcialmente desprendido y una semilla; 3. Semilla en vista lateral y ventral, con el hilo cubierto por tejido placentario; 4. Flor  $\Im$ ; 5. Flor  $\Im$ , con un pétalo removido; 6. Pétalo de 5 en vista adaxial; 7-8. Diagramas florales  $\Im$  y  $\Im$ .

Fitoquímico se ha detectado la presencia de saponinas en las hojas (Alemán & al. 1972).

N o m b r e s c o m u n e s : Ayúa blanca, ayúa brava, ayúa hembra, ayúa sierra, ayuda blanca, ayuda hembra (Sauvalle 1873, Gómez & Roig 1914, León & Alain 1951, Roig 1963).

- **1.15.** Zanthoxylum taediosum A. Rich. in Sagra, Hist. Phys. Cuba, Pl. Vasc.: 330. 1841 ≡ *Fagara taediosa* (A. Rich.) Krug & Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 118. 1896 (Mar) [et (A. Rich.) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 582. 1896 (Mai)] ≡ *Tobinia ternata* var. *taediosa* (A. Rich.) Griseb., Cat. Pl. Cub.: 48. 1866. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. La Habana, "circa Cabaña non procul ab Habana", *Sagra* ex herb. Richard (P!).
- Fagara stenoptera Griseb., Cat. Pl. Cub.: 48. 1866 ≡ Zanthoxylum stenopterum (Griseb.) C. Wright in Anales Acad. Ci. Méd. Habana 5: 287. 1868. Holotipo: [espécimen] Cuba oriental, 1860, Wright 2184 (GOET!).
- = Fagara leonardii Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 5. 1927 ≡ Zanthoxylum leonardii (Urb.) J. Jiménez Alm. in Rhodora 62: 237. 1960. Holotipo: [espécimen] Haití, "Etang Saumâtre, vicinity of Fond Parisien", 3-III-1926, Leonard 10136 (B†; isotipos: GH [n.v.], NY #55833!, US #1301145 [foto!]).
- "Zanthoxylum ternatum" sensu Richard (1841: 330) (non Zanthoxylum ternatum Sw. 1797).
   Fig. 3.

Arbusto o arbolito glabro, de 1-3(-5) m de alto. Ramas rectas o flexuosas, inermes o aculeadas. Hojas generalmente imparipinnadas; peciolo — de 4-15 mm de largo — y raquis canaliculados, sin alas o estrechamente alados, con acúleos de  $\leq$  15 mm de largo; foliolos (2-)3-7, subsésiles,  $\pm$  anchamente obovados u orbiculares, de 0,6.2(-3) × 0,4-1,2(-1,9) cm, cartáceos, esparcidamente opaco-glandulosos, a veces aculeados en la haz, obtusos, redondeados o truncado-emarginados, de base cuneiforme o redondeada y margen entero o crenulado,  $\pm$  recurvado, pelúcido-glanduloso. Inflores-cencias axilares,  $\pm$  glandulosas, en panícula pauciflora de 1-2 cm de largo. Pedicelos de ca. 1 mm de largo. Flores ( $\circlearrowleft$  y  $\hookrightarrow$ ) 3(-4)-meras, de ca. 3 mm de largo. Sépalos basalmente  $\pm$  concrescentes, triangular- a semiorbicular-romboidales, de 0,6-1 mm de largo, de margen parcialmente eroso. Pétalos heteromorfos, ovales o cuculados, de 1-2,5 mm de largo, obtusos a redondeados. Ovario monómero, subsésil, de inserción diagonal, de  $\pm$  1 mm de largo; estilo lateral, arqueado. Folículo bivalvado, sésil, de 3-3,5 mm de

diámetro; *exocarpo* caedizo, con o sin glándulas. *Semillas* de 2-2,5 mm de diámetro, adheridas al endocarpo persistente; *hilo* de 0,7-1 mm de largo, triangular, a veces hundido. – Fl: V-IX; Fr.: I-XII.

D i s t r i b u c i ó n : La Española. Presente en Cuba occidental: PR (Sumidero), Hab, C Hab, Cuba central: Ci (Castillo de Jagua; Milpa), SS (Pico Potrerillo; Arroyo Blanco), CA (charrascos entre San Felipe y Guadalupe), Cam y Cuba oriental: Ho, SC, Gu. Crece en bosque pluvial montano, bosque semideciduo mesófilo, bosque siempreverde microfilo, bosque de pinos, matorral xeromorfo costero y subcostero y complejo de vegetación de mogotes, entre 0 y 1000 msm. Categorizado como Amenazado (Oviedo 2007).— Mapa 15.



Mapa 15. Zanthoxylum taediosum A. Rich.

V a r i a b i l i d a d : Muy variable. Plantas aculeadas e inermes (más frecuentes) se encuentran en toda Cuba, sin patrón claro en la distribución de los dos tipos. Plantas con hojas parecidas a las del tipo de *Fagara stenoptera*, que Wright probablemente recolectó en los alrededores de Monte Verde, se volvieron a herborizar en el 1983, también en la provincia de Guantánamo (*HFC 49452*, B!, HAJB, JE!).

U s o s : La madera, según Gómez & Roig (1914: 72), es "Dura y correosa, color amarillo veteado; empleada en carpintería urbana."

N o m b r e s c o m u n e s : Ayuda macho, chivo, limón café, limoncillo, manca montero, mate árbol, tomeguín (Sauvalle 1873, León & Alain 1951, Roig 1963).

**1.16. Zanthoxylum shaferi** P. Wilson in N. Amer. Fl. 25: 182. 1911 ≡ *Fagara shaferi* (P. Wilson) Kereszty in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 25: 11.

1979. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Camp La Gloria, South of Sierra Moa", 24 a 30-XII-1910, *Shafer 8184* (NY #67234!; isotipo: GH!).

Arbol enano poco ramoso, de 1-1,4 m de alto, glabro, inerme. Tronco de ca. 1 cm de diámetro; corteza a veces suberosa. Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas, imparipinnadas; pecíolo y raquis (cuando presente) canaliculados; usualmente inermes; foliolos 3(-5), opuestos, subsésiles o cortamente peciolulados, ± estrechamente obovados, de 1,3-3,8 × 0,5-1,2 cm, gruesamente coriáceos, negruzco-punteados, emarginados, de base cuneiforme y margen revoluto regularmente crenulado, pelúcido-glanduloso. Inflorescencias axilares, usualmente en panícula pauciflora de 1-1,5 cm de largo. Flores ( $\Im$  y  $\Im$ ) 3(-4)-meras. Sépalos basalmente concrescentes, triangular- o semiorbicular-romboidales, de 0,6-0,8 mm de largo, frecuentemente con una glándula subapical. Pétalos oblongo-elípticos, de ca. 3 mm de largo, blancos, glandulosos. Anteras con un conectivo glandular grande. Ovario monómero, de inserción diagonal; ginóforo de 0,2-0,4 mm de largo; carpelo de ca. 2 mm de largo, glanduloso; estilo lateral, arqueado. Folículo bivalvado, sésil, globoso-elipsoideo, de 4,5-5,5(-6) mm de largo; exocarpo caedizo. Semillas globosas a globoso-elipsoideas, de 3,5-4,5 mm de diámetro, adheridas al endocarpo persistente; hilo de 1,8-2 mm de largo, oblongo-triangular. – Fl.: II, IV; Fr.: V, VIII, XII.

Distribución: Endémico en Cuba oriental: Ho (Sierra de Moa: Alto de la Calinga, La Gloria; alrededores de Pico el Toldo). Crece en bosque pluvial montano y matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, entre 800 y 900 msm. Categorizado como Casi Amenazado (Oviedo 2007). — Mapa 16.



Mapa 16. Zanthoxylum shaferi P. Wilson

T a x o n o m í a : Zanthoxylum shaferi es una especie rara y local, con un hábito característico y una morfología muy especial. Su inclusión en Zan-

thoxylum taediosum, propuesta por Reynel (disertación inédita), no se justifica.

Biología de la reproducción: Según las notas de campo de la autora, la distancia entre plantas femeninas y masculinas no sobrepasa pocos metros.

- **1.17. Zanthoxylum martinicense** (Lam.) DC., Prodr. 1: 726. 1824 ≡ *Fagara martinicensis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 334. 1792. Holotipo: [espécimen] "e Martinica", [*Anónimo*] 361 (P-LA!).
- = *Zanthoxylum juglandifolium* Willd., Sp. Pl. 4: 756. 1806. Holotipo: [espécimen] La Española, "St. Domingo" (B-W #18338/1!).
- = Zanthoxylum album Vahl, Eclog. Amer. 3: 47. 1807. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Antillas Menores, "Montserrat", Ryan (C!; isolectotipos: BM [n.v], C [n.v.]).
- = Zanthoxylum lanceolatum Poir. in Lamarck, Encycl., Suppl. 2: 293. 1811. Holotipo: "Puerto Rico", Ledru (P [n.v.]).
- = Zanthoxylum juglandifolium var. berteroanum DC., Prodr. 1: 727. 1824. Holotipo: [espécimen] "Puerto Rico", Bertero (G-DC!).
- "Zanthoxylum clava-herculis" sensu Grisebach (1860: 170; 1866: 49) (non Zanthoxylum clava-herculis L. 1753).

Árbol de < 25 m de alto. Tronco con acúleos insertados en cojinetes cónicos; corteza con olor a melocotón. Ramas jóvenes y pérulas pubescentes por pelos simples. Hojas aromáticas, frecuentemente agrupadas hacia el ápice de las ramas, usualmente imparipinnadas, de 10-40 cm de largo, frecuentemente aculeadas y estrigulosas por el envés; pecíolo de 1-5 cm de largo; foliolos (2-3-)5-9(-19), opuestos o alternos, sésiles o subsésiles, obovados, ovales u ovados, de (3-)6-9(-15) × (1,5-)2,2-3(-5) cm, cartáceos, pelúcido- u opaco-glandulosos, emarginados o acuminados, de base redondeada o cuneiforme y margen subrevoluto, entero o crenulado, pelúcidoglanduloso. Inflorescencias ± terminales, ± ferrugíneo-pubescentes, en panícula multiflora de (2-)5-15 cm de largo. Pedicelos de 0,4-1,4 cm de largo. Flores (? y ?) 5-meras. Sépalos libres o basalmente concrescentes, de 0,3-0,5 mm de largo y ancho, pubescentes o glabros, agudos a redondeados. Pétalos heteromorfos, planos y elíptico-aovados o estrechamente naviculares y cuculados, de 2-3 mm de largo. Ovario 5-mero; carpelos basalmente concrescentes, sésiles; estilo lateral o subbasal. Folículos 5(-4). algo concrescentes, semivalvados, angular-semiglobosos, lateralmente comprimidos, de 4-4,5 mm de largo, con rostro inconspicuo. Semillas subreniforme-elipsoideas, lateralmente comprimidas, de  $3-3.5 \times 2.6 \times 2.3-2.5$  mm, colgando en un haz placentario geniculado; *hilo* linear, de ca. 3 mm de largo. – Fl.: II-X; Fr.: II-XII.

Distribución: Norte de América del Sur, Antillas Mayores, Islas Vírgenes y Trinidad. Presente en Cuba occidental: PR, Hab, Mat (Playa Buey Vaca), IJ (río Júcaro), Cuba central: Ci, SS (Loma del Obispo), CA (Morón), Cam (Monte Californio; Cayo Palomo), LT (Aguarás) y Cuba oriental: Gr, Ho, SC, Gu. Crece en bosque pluvial montano y pluvial nublado, bosques siempreverde mesófilo, bosque semideciduo mesófilo, con frecuencia en vegetación ruderal, entre 0 y 900 msm. – Mapa 17.



Mapa 17. Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC.

T a x o n o m í a : Reynel (disertación inédita) subdivide esa especie en varias subespecies que todavía esperan su publicación. El material de Antillas pertenece a su *Zanthoxylum martinicense* subsp. *martinicense*.

Fitoquímico se ha identificado la presencia de alcaloides en la corteza (Tomko & al. 1967, Fish & Waterman 1973) y saponinas en las hojas (Sánchez & al. 1985).

U s o s : Planta medicinal (Fuentes & Expósito 1997). Las hojas son vulnerarias y astringentes (Roig 1963: 126). A los bebés en dentición se le da muñecos confeccionados con los cojinetes suberosos, amargos al masticar y que alivian la pena (A. Urquiola, com. pers.; por ese mismo uso, en los Estados Unidos de América, le llaman "toothache-tree" a *Zanthoxylum americanum* Mill.). La madera, según Gómez & Roig (1914: 72), es densa y elástica, "hermosa, de color amarillo pálido, con vetas y ondulaciones más oscuras, empleada en construcciones rurales".

Nombres comunes: Ayúa, ayúa amarilla, ayúa macho, ayuda, ayuda amarilla, ayuda macho, bayúa (Sauvalle 1873, Gómez & Roig 1914, León & Alain 1951, Roig 1963).

- **1.18. Zanthoxylum caribaeum** Lam., Encycl. 2: 39. 1786 ≡ *Fagara caribaea* (Lam.) Krug & Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 117. 1896 (Mar) [et (Lam.) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 562. 1896 (Mai)]. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Antillas [probablemente Martinica], *Surian 500.2* (P-JU [foto! microficha IDC #958-B1]; isolectotipo: P-JU [foto! microficha IDC #958-B2]).
- = Zanthoxylum elephantiasis Macfad., Fl. Jamaica 1: 193. 1837 ≡ Fagara elephantiasis (Macfad.) Krug & Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 117. 1896 (Mar) [et (Macfad.) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 564. 1896 (Mai)]. Descrito de Jamaica, "near Mount Lebanon, and Moccha Wood, Port Royal Mountains"; tipo no designado.
- = Zanthoxylum nelsonii Rose in N. Amer. Fauna 14: 79. 1899. Holotipo: [espécimen] México, Islas de las Tres Marías, "María Madre Island", 3 a 25-V-1897, Nelson 4279 (US #346023 [foto!]; isotipo: NY #67203!).
- = Zanthoxylum gentlei Lundell in Lloydia 2: 92. 1939. Holotipo: [espécimen] Belice, Península de Yucatán, "Stann Creek", 10-IX-1938, Gentle 2652 (MICH [n.v.]; isotipo: B!).
- "Zanthoxylum aromaticum" sensu Candolle (1824: 727, p.p.) et Grisebach (1860: 170; 1866: 49) (non Zanthoxylum aromaticum Willd. 1806).
- "Zanthoxylum clava-herculis" sensu Candolle (1824: 727) (non Zanthoxylum clava-herculis L. 1753).

Árbol glabro, de 5-15(-20) m de alto. *Troncos* y ramas jóvenes aculeados, los adultos inermes. *Hojas* imparipinnadas, de  $\leq$  60 cm de largo, glabras, generalmente inermes; *pecíolo* de 2-10 cm de largo; *folíolos* 5-17, con peciólulo de 3-7 mm de largo,  $\pm$  estrechamente ovados, ovales u obovados, de 3,5-11 × 1,5-4,5 cm,  $\pm$  cartáceos, con glándulas pelúcidas u opacas, agudos a largamente acuminados, de base asimétrica redondeada a aguda y margen crenado a crenulado. *Inflorescencias* terminales o subterminales, en panícula multiflora de 10 cm de largo, con ejes suberosorugosos y verrugosos. *Pedicelos* de 0-3 mm de largo, suberosorugosos. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\circlearrowleft$ ) 5-meras. *Sépalos* libres o basalmente concrescentes, de ca. 1 × 1-2 mm, suberoso-rugosos, redondeados, de margen ciliado. *Pétalos* libres o basalmente concrescentes, ovales o elíptico-oblongos, de 4-5 × 2-

2,5 mm. *Ovario* 5-mero; *carpelos* libres, subsésiles; *estilo* lateral o subbasal. *Folículos* 5-2(-1), subbivalvados, obovoideo-elipsoidales, lateralmente comprimidos, de 5,5-7(-9) mm de largo, con estípite de 3-7 mm de largo y rostro inconspicuo; *exocarpo* estriado, ± glanduloso-verrugoso. *Semillas* globoso- a reniforme-elipsoideas, lateralmente comprimidas, de 4,5-7(-8) mm de largo, de base truncada cuneiforme, colgando en un haz placentario largo; *hilo* de 2 mm de largo, ± triangular. – Fl.: II-X, XII; Fr.: I, IV-XI.

D i s t r i b u c i ó n : México, América Central y del Sur, Antillas, Islas Caimán. Presente en Cuba occidental: PR, Hab, C Hab (Cojímar; cerca de Marianao), Mat (cerca de Matanzas; Playa Larga), IJ (Caleta Cocodrilos; entre Cayo las Piedras y Playa Larga), Cuba central: VC (entre Viamores y Espinal), Ci, SS (Loma de Banao), Cam (cerca de Nuevitas; Cayo Romano) y Cuba oriental: Gr (Horno de Guisa, orillas del río Cupeinicú), Ho (Banes: Puerto Rico), SC, Gu. Crece en bosque semideciduo mesófilo, bosque siempreverde mesófilo submontano, complejo de vegetación de mogotes, ocasionalmente en matorral xeromorfo espinoso y subespinoso sobre serpentina, también en vegetación secundaria, entre 0 y 800 msm. – Mapa 18.



Mapa 18. Zanthoxylum caribaeum Lam.

T a x o n o m í a : Reynel (disertación inédita) subdivide esa especie en varias subespecies que todavía esperan su publicación. El material de Antillas pertenece a su *Zanthoxylum caribaeum* subsp. *caribaeum*.

F i t o q u í m i c a : La corteza contiene varios tipos de alcaloides (Willaman & Li 1970, Fish & Waterman 1973).

U s o s : Según Roig (1974) es planta diaforética y antiasmática. Las hojas contienen una esencia de olor desagradable ("chivo con pimienta"). La


madera, muy durable, se comercializa con nombre "West Indian satinwood" o "concha satinwood" (Fors 1968).

N o m b r e s c o m u n e s : Ayúa, ayúa amarilla, ayúa baría, ayúa blanca, ayúa de corazón, ayúa varía, bayúa (León & Alain 1951, Roig 1963).

**1.19. Zanthoxylum nannophyllum** (Urb.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 24. 1950 ≡ *Fagara nannophylla* Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 303. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "in charrascales ad El Paraiso", 26-VIII-1916, *Ekman 7603* (S!).

Arbusto glabro, verrucoso-glanduloso, de ca. 0,7 m de alto, con acúleos rectos de ca. 1,4 cm de largo. *Hojas* mayormente fasciculadas en braquiblastos; *pecíolo* sulcado, de 1-3,5 × 0,2-0,3 mm; *folíolos* 3(-5), con peciólulo de 0,8-1 mm de largo, suborbiculares a espatulados, de 1,2-4(-6) × 1,2-2(-4) mm, cartáceos, glandulosos, de margen entero o crenulado y provisto de glándulas muy grandes. *Inflorescencias* axilares, unifloras o en racimo corto. *Flores* desconocidas. *Sépalos* 5, libres. *Estilo* sublateral. *Folículos* 2, semivalvados, libres, obovoides, de 3,5 × 4-4,5 mm, con estípite de ca. 2,5 × 3 mm atenuado hacia la base. *Semillas* 3,8 × 3 mm, reniforme-elipsoideas, de base oblicuamente truncada cuneiforme, inicialmente adheridas al pericarpo persistente, luego colgando en un haz placentario corto; *hilo* triangular, de 1,5 mm de largo. – Fl.: ?; Fr.: II, VII.

Distribución: Endémico en Cuba central: VC (Loma de Palma Sola; cerca de Santa Clara), SS (Arroyo Blanco; cerca de San Felipe) y Cuba oriental: Ho. Crece en matorral xeromorfo espinoso y subespinoso sobre serpentina, entre 100 y 200 msm. – Mapa 19.



Mapa 19. Zanthoxylum nannophyllum (Urb.) Alain

T a x o n o m í a : Reynel (disertación inédita) trata una especie endémica de La Española, *Zanthoxylum nashii* P. Wilson, como sinónimo de *Zanthoxylum nannophyllum*. A pesar de tener hojas y frutos similares, *Zanthoxylum nashii* difiere en su ecología (cresce sobre caliza), tiene folículos grandes y subsésiles, y hojas anfistomáticas (datos inéditos de la autora).

**1.20. Zanthoxylum duplicipunctatum** C. Wright ex Griseb., Cat. Pl. Cub.: 49. 1866 ≡ *Fagara duplicipunctata* (Griseb.) Krug & Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 117. 1896 (Mar) [et (Griseb.) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 573. 1896 (Mai)]. Holotipo: [espécimen] Cuba occidental, "Bahía Honda, Cajálbana", 25-VI-[1862 ó 1864], *Wright 2183* (GOET!; ¿isotipo?: GH!).


Arbusto inerme de  $\leq 3$  m de alto, con diminutos pelos bífidos o estrellados en las partes jóvenes; ramas jóvenes glanduloso-verrucosas. Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas, impari- y paripinnadas, de 3-11 cm de largo, aromáticas; pecíolo de 1,5-3 cm de largo; folíolos (5-)7-11, opuestos, inequiláteros, subsésiles o cortamente peciólulados, ovales a ovados u obovados, de 2-5,7 × 0,9-2,1 cm, cartáceos, frecuentemente conduplicados por lo menos en su parte proximal, densamente e irregularmente pelúcidoglandulosos, retusos a emarginados, de base redondeada y margen subentero ± revoluto. *Inflorescencias* terminales y axilares, en panícula de ca. 2 cm de largo. Pedicelos de ca. 1 mm de largo (3 mm en el fruto). Flores (solo  $\bigcirc$ ) 5(-6)-meras. Sépalos basalmente  $\pm$  concrescentes, estrechamente oblongo-triangulares, de 0,8 × 0,4 mm. Pétalos heteromorfos, planos, ovales y obtusos o carinados y con ápice uncinado, de 2,5-3 × 0,8-1 mm, glandulosos y con una glándula subapical. Estaminodios 5, estrechamente linguiformes, de ca. 0,1 mm de largo. Ovario 2-mero, glanduloso; carpelos libres, subsésiles; estilo lateral. Folículos (1-)2, los inmaduros (solos conocidos) obovoideo-elipsoideos, comprimidos lateralmente, de 4 × 3-3,5 × 2-2,5 mm, con un estípite de 0,8-1 mm de largo. Semillas desconocidas. - Fl.: V; Fr.: VI-VII.

D i s t r i b u c i ó n : Endémico en Cuba occidental: PR (Sierra de Cajálbana). Crece en matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, entre 100 y 300 msm. Registrado como "En Peligro Crítico" (Berazaín & al. 2005). Se daba por extinto antes de ser redescubierto en Marzo del 2000, 136 años después de la primera y única recolecta de Wright (Berazaín & al. 2000: 15). – Mapa 20.

T a x o n o m í a : Ver bajo Zanthoxylum flavum.

U s o s : Según Gómez & Roig (1914: 72), la madera es "de color amarillo dorado, de grano fino, usada en carpintería".

Nombre común: Ayuda varía (Sauvalle 1873, Gómez & Roig 1914: 72).



Mapa 20. Zanthoxylum duplicipunctatum C. Wright ex Griseb.

**1.21. Zanthoxylum ekmanii** (Urb.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 24. 1950 ≡ *Fagara ekmanii* Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 302. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Sierra de los Órganos, Grupo del Rosario, Peña Blanca (north of Santa Cruz de los Pinos)", ca. 600 msm, 16-V-1922, *Ekman 13861* (S!; isolectotipo: NY #55831!).

Árbol de ca. 22 m de alto. *Ramas* jóvenes estrellado-pubescentes. *Hojas* paripinnadas, de 60-90 cm de largo, inermes o con acúleos rectos o ligeramente recurvados de 3-4 mm de largo; *pecíolo* de 14 cm de largo y 1 cm de ancho en la base; *raquis* hacia el ápice con pelos estrellados cortos, blanquecinos; *folíolos* 8-13, alternos, subsésiles, ovales, de 10-20 × 3,5-6 cm, cartáceos, pelúcido- y opaco-glandulosos, acuminados, de base cuneiforme, redondeada o subtruncada y margen subentero a aserrado, plano o a veces revoluto; en los nervios; nervio medio impreso en la haz, nervios prominentes por el envés y, sobre todo en la haz, con pelos estrellados largos o cortos, ferrugíneos. *Flores, frutos y semillas* desconocidos. – Fl. y Fr.: ?

Distribución: Endémico en Cuba occidental: PR (Sierra de los Órganos: Pico Chico y Sierra del Rosario: Peña Blanca y La Guásima).

Crece en bosque siempreverde mesófilo, ca. 600 msm. Categorizado como Amenazado (Oviedo 2007).— Mapa 21.

T a x o n o m í a : Las hojas se parecen a las de *Zanthoxylum sobrevielae* D. R. Simpson de Guayana Francesa, Brazil y Perú y de *Zanthoxylum belizense* Lundell de América Central. Brako & Zarucchi (1993: 1057), Kallunki (2002) y Reynel (disertación inédita) incluyen ambas especies continentales en la sinonimia de *Zanthoxylum ekmanii*. Mientras no se conozcan las flores femeninas, frutos y semillas de las plantas cubanas, tal sinonimización parece prematura.




Mapa 21. Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain

- **1.22.** Zanthoxylum flavum Vahl, Eclog. Amer. 3: 48. 1807 ≡ *Fagara flava* (Vahl) Krug & Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 118. 1896 (Mar) [et (Vahl) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 571. 1896 (Mai)]. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Antillas Menores, "Montserrat", 1778, *Ryan* (C!).
- = Zanthoxylum floridanum Nutt., N. Amer. Sylva 3: 14. 1849 ≡ Zantho-xylum caribaeum var. floridanum (Nutt.) A. Gray in Proc. Amer. Acad. Arts 23: 225. 1888. Lectotipo (designado aquí): [ícono] "Zanthoxylum floridanum" en Nuttall, N. Amer. Sylva 3: t. 85. 1849.

Árbol inerme de 3-8(-20) m de alto, estrellado-pubescente en las partes jóvenes. *Hojas* frecuentemente agrupadas hacia el ápice de las ramas, usualmente imparipinnadas, de 10-55 cm de largo; *pecíolo* de 2-8(-11) cm de largo; *folíolos* (5-)7-9(-13), ± opuestos, con peciólulos de ca. 7 mm de largo, inequiláteros, oblongo-aovados, ovales u oblongo-lanceolados, de 3-10(-15) × 1,2-6 cm, cartáceos a subcoriáceos, pelúcido-glandulosos, subemarginados a acuminados, de base truncada a cuneiforme y margen subrevoluto, entero o crenulado. *Inflorescencias* terminales, estrellado-

pubescentes, en panícula de 5-15 cm de largo. *Pedicelos* de 0,6-2 mm de largo. *Flores* ( $\circlearrowleft$  y  $\hookrightarrow$ ) 5-meras. *Sépalos* basalmente concrescentes, ovados, de ca. 1 mm de largo, estrellado-pubescentes, acuminados. *Pétalos* libres o concrescentes por pares, heteromorfos, planos y ovales o naviculiformes y cuculados, de ca. 3 mm de largo. *Estambres* 5, todos libres ó 3 basalmente concrescentes. *Ovario* 2-mero; carpelos libres, sésiles, de ca. 2,5 mm de largo; *estilo* lateral. *Folículos* (1-)2, semivalvados, globoso- u obovoideo-elipsoideos, de 4-5 mm de largo, con estípite de 1-2 mm de largo. *Semillas* globoso-elipsoideas, lateralmente comprimidas, de 3-4(-4,5) × 2,8-3,2 mm, de base oblicuamente truncada cuneiforme, inicialmente adheridas al pericarpo persistente, luego colgando en un haz placentario corto; *hilo* de  $\leq$  1,8 mm de largo, oblongo-triangular. – Fl.: IV-XI; Fr.: XII-V, VII-IX.

Distribución: Estados Unidos de América (Cayos de Florida), Bahamas, Islas Turcos y Caicos, Islas Caimán, Antillas. Presente en Cuba occidental: IJ (Caleta Cocodrilos), Cuba central: VC (Cayo Francés), Ci (Castillo de Jagua), Cam, LT (El Cupey). Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, bosques siempreverde y semideciduo microfilo. Registrado como "En Peligro Crítico" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 22.



Mapa 22. Zanthoxylum flavum Vahl

T a x o n o m í a : Zanthoxylum flavum, Zanthoxylum pistaciifolium, Zanthoxylum duplicipunctatum, Zanthoxylum dictyophyllum y Zanthoxylum organosium, las 5 especies cubanas con indumento de pelos estrellados, son taxones bien distintos por su morfología y ecología. Zanthoxylum flavum es un árbol de los bosques siempreverdes microfilos, Zanthoxylum pistaciifolium habita las zonas costeras extremadamente áridas, Zanthoxylum duplicipunctatum crece en vegetación de cuabal sobre serpentina, Zanthoxylum organosium es un elemento de los bosques siempreverdes de

montaña, probablemente sobre caliza, y Zanthoxylum dictyophyllum se encuentra en las cimas de mogotes. Reynel (disertación inédita) une estas 5 especies en una sola, Zanthoxylum flavum s. l., tratamiento que no se puede justificar.

U s o s : "La madera es dura y pesada, con un olor distintivo de aceite de coco; se puede emplear en la fabricación de muebles finos, traviesas, decorado interior". Se comercializa bajo las designaciones "West Indian satinwood" y "Yellowheart" (Fors 1968: 9).

Nombres comunes: Aceitillo, ayúa varía (Roig 1963).

**1.23. Zanthoxylum pistaciifolium** Griseb., Cat. Pl. Cub.: 49.  $1866 \equiv Fa$ gara pistaciifolia (Griseb.) Urb. ex Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 117. 1896 (Mar) [et (Griseb.) Krug & Urb. in Bot. Jahrb. Syst. 21: 573. 1896 (Mai)]. Holotipo: [espécimen] Cuba, [prov. Guantánamo, "Road Baracoa-Saltadero", 10-VII, fide GH y NY], 1860-1864, Wright 2182 (GOET!; ¿isotipos?: GH!, NY #67233!).

Arbusto o arbolito poco ramoso de 1,5-7 m de alto. Ramas inermes, densamente estrellado-pelosas hacia el ápice. Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramas, imparipinnadas, de 10-20 cm de largo; pecíolo de 2-5 cm de largo; foliolos 7-11(-15), opuestos a subopuestos, con peciólulos de 0-1 mm de largo, ovales, oblongo-lanceolados u ovados, de 2-7,2 × 0,7-1,2(-2) cm, coriáceos, nigrescentes, pelúcido-glandulosos, estrelladovelutinos por ambas caras, luego ± glabrescentes, obtusos, de base cuneiforme a redondeada y margen subrevoluto subentero. Inflorescencias terminales, en panícula de 6-12 cm de largo, glanduloso-verrugosas y densamente estrellado-pelosas. Flores (? y ?) subsésiles, 5(-4)-meras. Sépalos libres o basalmente ± concrescentes, ovados a rómbicos, de 0,4 mm de largo, estrellado-pelosos, agudos. Pétalos libres, ovales, uncinados, de 0.8-2.3 × 1-2 mm, glanduloso-verrugosos y con una glándula subapical. Ovario 2-mero; carpelos libres, sésiles, de 1-1,2 mm de largo, glandulosos; estilo lateral. Folículos 1-2, semivalvados, globoso- a obovoide-elipsoideos, lateralmente comprimidos, de 3-3,5 mm de largo, con estípite de ca. 1 mm de largo. Semillas globoso-elipsoideas a semigloboso-obovoideas, de 3-3,2 × 2,3-2,6 mm, de base oblicuamente truncada cuneiforme, adheridas al pericarpo persistente o colgando en un haz placentario corto; hilo oval o estrechamente triangular, de 1,2-1,8 mm de largo. – Fl.: V-VII; Fr.: I-XI.

Distribución: Endémico en Cuba occidental: C Hab (entre El Morro y Cojímar), Cuba central: Ci, Cam (Península Pastelillo) y Cuba oriental: Gr (Alegría del Pío), Ho (Loma de Cantón), SC, Gu. Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero y bosque siempreverde microfilo, entre 0 y 600 msm. Categorizado como Amenazado (Oviedo 2007). – Mapa 23.

T a x o n o m í a : Estrechamente relacionado con Zanthoxylum trichilioides Standl. de México y Zanthoxylum stelligerum Turcz. de Bahía (Brasil). Zanthoxylum trichilioides difiere mayormente por tener un solo carpelo, usualmente también por un indumento ovarial muy denso – pero hay muestras de Zanthoxylum pistaciifolium (Webster & al. 70, GH!) con ovarios densamente blanquecino-afelpados. Por lo tanto consideramos la definición de las especies de ese complejo como provisoria. (Ver también la discusión bajo Zanthoxylum flavum.)

U s o s: Planta medicinal (Fuentes & Expósito 1997).

Nombres comunes: Bálsamo, palo vencedor (León & Alain 1951, Roig 1963).



Mapa 23. Zanthoxylum pistaciifolium Griseb.

**1.24. Zanthoxylum dictyophyllum** (Urb.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 24. 1950 ≡ *Fagara dictyophylla* Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 303. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Sierra de los Órganos, in nearly vertical limestone cliffs on top of one of the highest peaks of Sierra Santo Tomas", ca. 600 msm, 12-VI-1923, *Ekman 16682* (S!; isolectotipos: GH!, NY #55829!).

Árbol de  $\leq$  6 m de alto. *Hojas* imparipinnadas, de  $\leq$  25 cm de largo; pecíolo de 3,5-6 cm de largo, glanduloso y ± densamente pubescente por pequeños pelos estrellados y a veces algunos simples; folíolos 7-9, opuestos, con peciólulos de ca. 4 mm de largo, ovados o elíptico-aovados, de 4,5-10 × 2,2-4 cm, cartáceos, con numerosas y grandes glándulas pelúcidas, ± largamente acuminados, de base cuneiforme o redondeada y margen regularmente crenulado; sobre todo los nervios en ambas caras pubescentes por pelos simples y estrellados, luego glabrescentes. Inflorescencias terminales, en panícula densa multiflora de 4-5 cm de largo, alcanzando 10 cm en la madurez. Pedicelos de 1-2 mm de largo. Flores (solo 3) 5-meras. Sépalos libres, lanceolados, de 1-1,2 × 0,4-0,6 mm, glandulosos y con pelos estrellados, acuminados. Pétalos ovales, uncinados, de 3-3,3 × 0,5-1 mm, con glándulas pelúcidas. Estilo (en el fruto) lateral. Foliculos 2, semivalvados, obovoideo-elipsoideos, lateralmente comprimidos, de 3,5-4,5 mm de largo, muy glandulosos, con estípite de ≤2 mm de largo. Semillas globoso- o reniforme-elipsoideas, de ca. 3 mm de largo, de base oblicuamente truncada cuneiforme, adheridas al pericarpo persistente; hilo linear o estrechamente triangular, de ca. 1 mm de largo. – Fl.: III; Fr.: VI.

Distribución: Endémico en Cuba occidental: PR (Viñales: Sierra del Infierno; sitio Santo Tomás; San Vicente). Crece en complejo de vegetación de mogotes, en la cumbre de algunos de estos, ca. 600 msm. Conocida hasta la fecha de tres recolecciones. — Mapa 24.

T a x o n o m í a : Ver bajo  $Zanthoxylum\ flavum.$ 



Mapa 24. Zanthoxylum dictyophyllum (Urb.) Alain

**1.25. Zanthoxylum organosium** (Urb.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 24.  $1950 \equiv Fagara\ organosia\ Urb.$  in

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 302. 1924. Lectotipo (designado aquí): Cuba, prov. Pinar del Río, "Sierra de los Órganos, grupo del Rosario, Sierra del Pendejeral, on the steep south-eastern slope of the ridge", 14-IX-1923, *Ekman 17541* (S!; isolectotipo NY #55834!).

Arbusto inerme. *Ramas* jóvenes estrellado-pubescentes. *Hojas* imparipinnadas, de 15 cm de largo; *peciolo* de 2-4 cm de largo; *foliolos* 7-9, subsésiles, los laterales opuestos, ovales, de 3-5,5 × 1,5-3 cm, apergaminados a cartáceos, con pelos estrellados y numerosas glándulas, obtusos a redondeado-emarginados, de base redondeada a cuneiforme y margen fuertemente crenado. *Inflorescencias* terminales, raramente axilares. *Flores* desconocidas. *Sépalos* 5, libres, anchamente triangulares, de 0,7 mm de largo. *Folículos* (1-)2, semivalvados, globoso- u obovoideo-elipsoideos, de 6,7-7,5 × 5,9 mm, con un estípite de 1 mm de largo. *Semillas* globoso-elipsoideas, lateralmente algo comprimidas, de 6 × 5 mm, de base oblicuamente truncada cuneiforme, adheridas al pericarpo persistente; *hilo* de 1,1 mm de largo, estrechamente oblongo-triangular. – Fl. ?; Fr.: IX.

Distribución: Endémico en Cuba occidental: PR: (Sierra del Rosario: Sierra del Pendejeral). Crece en bosque siempreverde mesófilo, probablemente en calizas. Se conoce solamente del material tipo. Categorizado como Amenazado (Oviedo 2007).— Mapa 25.

T a x o n o m í a : Ver bajo Zanthoxylum flavum.



Mapa 25. Zanthoxylum organosium (Urb.) Alain

## 2. Plethadenia Urb., Symb. Antill. 7: 237. 1912.

Tipo: *Plethadenia granulata* (Krug & Urb.) Urb. (*Fagara granulata* Krug & Urb.).




Figura 4. *Plethadenia cubensis* Urb. (espécimen *López Figueiras 896*, HAJB; dibujos de Michael Rodewald).

1. Ramas con hojas y botones florales; 2-3. Haz y envés de una hoja; 4. Inflorescencia con tres botones; 5. Capullo abierto con disco, dos estambres y 4 carpelos (2 pétalos y 6 estambres removidos); 6-7. Estambre en vista dorsal y ventral; 8. Diagrama floral.

Arbustos inermes, glanduloso-verrugosos en todas partes, fuerte y agradablemente olorosos. *Hojas* alternas a opuestas, comúnmente paripinnadas; *pecíolo* y *raquis* estrechamente alados; *folíolos* pequeños, sésiles, coriáceos. *Inflorescencias* axilares, en cima pauciflora. *Flores* pequeñas, 4-meras, actinomorfas, hermafroditas, subsésiles. *Sépalos* libres, persistentes. *Pétalos* libres, de prefloración valvar. *Estambres* 2× el número de los pétalos, los episépalos más largos y más anchos que los epipétalos; *filamentos* libres, aplanados, fimbriados; *anteras* subbasifijas. *Disco* entero, undulado, aplanado o cortamente cupuliforme. *Ovario* 4-mero, fuertemente glanduloso-verrugoso; *carpelos* sésiles, algo concrescentes; *primordio seminal* 1 por lóculo; *estilos* cortos, libres; *estigmas* concrescentes en la antesis. *Folículos* 1-4, algo concrescentes cerca de la base, subsésiles, ovoides, algo comprimidos lateralmente, cortamente apiculados, monospermos. *Semilla* (en *Plethadenia granulata*) pequeña, reniforme.

D i s t r i b u c i ó n : Género de 2 especies, una en La Española y la otra en Cuba (Urban 1924: 178, Alain 1969: 84, 1985: 347, Beurton 2000a).

Taxonomía: La revisión del género fue realizada por Beurton (2000a). Por sus flores inconspicuas y frutos foliculares secos, Engler (1896, 1931) agrupa *Plethadenia* con otros 19 géneros, dentro de ellos *Zanthoxylum*, en las *Rutoideae*, subtribu *Euodiinae* Engl., mientras que pone otros géneros antillanos relacionados *(Amyris, Helietta)*, pero con frutos drupáceos o samaroides, en una subfamilia diferente, *Toddalioideae* K. Koch.

Biología de la reproducción: Las semillas son proyectadas fuera del folículo maduro por un endocarpo elástico (ver Beurton 2000a). La presencia de eleosomas indica una dispersión mirmecócora, subsiguiente a la autócora.

**2.1. Plethadenia cubensis** Urb., Symb. Antill. 9: 177. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Santiago de Cuba, "prope Aguadores (vicin. Santiago) in coll. calcar. siccis", 4-XI-1917, *Ekman* 8697 (S!; isolectotipo: NY #2160!).

Arbusto de  $\leq$  2 m de alto, muy ramoso. *Ramas* jóvenes con pubescencia diminuta  $\pm$  densa. *Hojas* de 0,6-3(-4) cm de largo, glabras o poco pubescentes; *pecíolo* de 0,3-1,2(-2) cm de largo; *foliolos* (2-)6-10(-11), opuestos o subopuestos ovales,, de 0,5-1  $\times$  0,1-0,4 cm, redondeados o subtrun-

cados, de base oblicua cuneiforme y margen  $\pm$  revoluto. *Inflorescencias* diminutamente pubescentes; *pedúnculo* de 0,5-1,6 cm de largo. *Flores* de 2-3 mm de largo, verdosas. *Sépalos* homomorfos, triangular-lanceolados, de 0,8 mm de largo. *Pétalos* de ca. 2,5 mm de largo, conspicuamente glanduloso-verrugosos. *Disco* cortamente cupuliforme, de margen sinuado. *Folículos* de 4-4,2  $\times$  2,5  $\times$  2 mm. *Semilla* desconocida. – Fl.: I-III, VI, XI; Fr.: XI-?

Distribución: Endémica en Cuba central: Cam (Bahía de Nuevas Grandes; Loma de la Cueva) y Cuba oriental: Ho (Bahía de Naranjo), SC (Playa de Aguadores), Gu (Novaliches). Crece en bosque siempreverde microfilo y matorral xeromorfo costero y subcostero. — Mapa 26.

Nombre común: Ruda (Roig 1963).



Mapa 26. Plethadenia cubensis Urb.

- **3. Amyris** P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica: 208. 1756 (Mar)  $\equiv$  *Elemi* Adans., Fam. Pl. 2: 342, 552. 1763, *nom. illeg*.
- Tipo (Wilson 1911: 216): Amyris balsamifera L.
- = *Elemifera* Burm. in Plumier, Pl. Amer.: 87. 1756 (Oct). Tipo (Swart in Stafleu 1956: card #1436): *Amyris elemifera* L.
- = Schimmelia Holmes in Pharm. J. 62: 53. 1899. Tipo: Schimmelia oleifera Holmes
- Kodalyodendron Borhidi & Acuña in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19:
   42. 1974. Tipo: Kodalyodendron cubense Borhidi & Acuña (Amyris cubensis (Borhidi & Acuña) Beurton).

Arbustos, arbolitos o árboles. *Ramas* glabras o pubérulas. *Hojas* alternas u opuestas, de olor aromático a veces desagradable, 1-3-folioladas (a veces

en apariencia simples) o imparipinnadas, rara vez bracteiformes y espinescentes, con un par de catafilos estipuliformes, triangulares o subulados, caedizos o persistentes cerca de la base; pecíolo y raquis con o (en Cuba) sin alas; lámina o folíolos a menudo con glándulas oleíferas; nervadura inconspicua, broquidódroma, o bien desarrollada hasta al tercer orden de nervios. Inflorescencias terminales a axilares, en panícula multi- o pauciflora, a veces unifloras. Pedicelos mayormente bibracteolados. Flores pequeñas, 4(-5)-meras, actinomorfas, hermafroditas. Cáliz persistente, ciatiforme o urceolado, con sépalos concrescentes hasta ½-¾. Pétalos libres, caedizos, de prefloración imbricada, con ápice a menudo inflexo. Estambres 2× el número de los pétalos, los episépalos ≥ del largo de los pétalos, los epipétalos algo más cortos; filamentos libres; anteras precozmente caedizas, las del ciclo exterior e interior ± heteromorfas, sobre todo cuando jóvenes. Ovario monómero; ginóforo conspicuo o subnulo; primordios seminales 2, apicales, péndulos; estigma sésil o subsésil, plano a capitado. Fruto en drupa normalmente monosperma, ± negra cuando madura; exocarpo carnoso volviéndose coriáceo, con glándulas oleíferas; endocarpo poco endurecido, apergaminado. Semillas sin endospermo; testa sutil, membranácea, lustrosa; cotilédones carnosos, frecuentemente verdes.

Distribución: Género de ca. 20 especies, de América tropical y subtropical, sobre todo México y Antillas. Representado en Cuba por 7 especies, 4 de ellas endémicas.

T a x o n o m í a : Engler (1896, 1931) agrupa *Amyris, Stauranthus* Liebm. (México) y *Teclea* Delile (África tropical) en las *Toddalioideae*, subtribus *Amyridinae* Engl., caracterizada por un ovario monómero, fruto en drupa y semilla sin endospermo. Sin embargo, la composición química de *Teclea* y *Amyris* difieren fundamentalmente (Silva & al. 1988). *Amyris* comparte con *Zanthoxylum*, *Plethadenia* y *Helietta* las flores ± radiales, inconspicuas, verdes o blanco-verdosas, con pétalos, anteras y carpelos sueltos. Las diferencias carpológicas tienden a ocultar esas afinidades.

Biología de la reproducción: Polinización probablemente entomógama. Diseminación zoocora, quizas ornitocora. Flores probablemente proterandras; las plantas florecen con profusión pero producen frutos escasos, siendo quizás autoincompatibles.

E c o l o g í a : Las especies cubanas del género se hallan con frecuencia en bosques de galería y matorrales costeros o subcosteros. La designación

cubana "cuabal" para la formación vegetal que Capote & Berazaín (1984) denominan "matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina" deriva del nombre común de *Amyris*, cuaba.

Importancia e conómica: Todas las especies son ricas en resina olorosa, que tiene uso en la medicina popular.

Nombre común: Cuaba (Roig 1963).

## Clave para las especies

1	Hojas simples o unifolioladas; nervadura conspicua, con nervios secundarios numerosos y paralelos (Fig. 5.6-11) o, cuando inconspicua, plantas espinosas
1*	Hojas mayormente compuestas; plantas inermes; nervadura inconspicua (Fig. 5.12) o, cuando conspicua, con pocos nervios secundarios
2 2*	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
3	Hojas mayormente en braquiblastos; lámina de $0,4-0,8 \times 0,2-0,5$ cm o a veces ausente; nervadura poco conspicua, con pocos nervios secundarios; plantas espinosas
3*	Hojas esparcidas a lo largo de las ramas; lámina de 1,5-4 × 0,9-3 cm; nervios secundarios numerosos y paralelos; plantas inermes
4	Hojas unifolioladas; pecíolo delgado, de 3-12 × 0,5 mm; folíolo coriáceo pero flexible, estrechamente oval a lanceolado, acuminado, rara vez obtuso
4*	Hojas de apariencia simple; pecíolo robusto, de $2-4 \times 1,5$ mm; lámina rígida, oblongo-rómbica, oval u obovada, obtusa o emarginada, rara vez mucronada o acuminada
5	Ovario y fruto joven hispídulos; drupa elipsoidea u obovoide, de 6-14 mm de largo
5*	Ovario y fruto glabros; drupa ± globosa, de 2-9 mm de diámetro 6
6	Folíolos de $\leq$ 0,6 cm de ancho, casi $3\times$ tan largos como anchos
6*	Folíolos de $\geq 0.8$ cm de ancho, comúnmente $\pm 2\times$ tan largos como anchos

- **3.1.** Amyris balsamifera L., Syst. Nat., ed. 10: 1000. 1759  $\equiv$  *Elemifera balsamifera* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1-2: 100. 1891. Lectotipo (Jarvis 2007: 287): [Jamaica], Br[owne] in Herb. Linn. No. 490.2 (LINN!).
- = *Schimmelia oleifera* Holmes in Pharm. J. 62: 53. 1899. Descrito de Venezuela, "Puerto Cabello"; tipo no designado.
- "Amyris sylvatica" sensu Richard in Sagra (1845: 164) (non Amyris sylvatica Jacq. 1763, nom. illeg.). Fig. 5.12.

Arbusto o árbol aromático de 2-13 m de alto, glabro o en partes hispídulo por pelos diminutos. Hojas ± opuestas, con olor desagradable; pecíolo – de 2-4(-5) cm de largo – y raquis glabros o hispídulos; folíolos 3-5(-7), ovados, aovado-lanceolados o a veces ovales, de 4-9(-13) × 1,8-7 cm, cartáceos a coriáceos, acuminados, largamente acuminados o agudos, de base redondeada a cuneiforme y margen entero o crenulado, los laterales con peciólulo de 2-5(-7) mm de largo. Inflorescencias terminales o subterminales, rara vez axilares, en panícula a menudo multiflora de 3-7(-14) cm de largo, con ejes diminutamente hispídulos. Pedicelos de ca. 1 mm de largo. Flores 4-meras, de ca. 4 mm de largo. Sépalos concrescentes hasta la mitad, los lobos aovado-triangulares u ovados, de ca. 0,8 mm de ancho y largo, hispídulos, glandulosos. Pétalos ovales, de 3,1 × 1,2 mm, blancos, con glándulas oleíferas por fuera, a veces unguiculados. Estambres dimorfos, los episépalos de ca. 4 mm de largo, con antera elipsoidea a subglobosa, los epipétalos de ca. 3,2 mm de largo, con antera sagitada. Ovario oblongo-ovoideo, ovoide o elipsoideo, hispídulo, con ginóforo a menudo bien desarrollado. Drupa elipsoidea u obovoide, de 6-11(-14) × 4-9(-10) mm, ± apiculada, subsésil o brevemente atenuada. - Fl. y Fr.: I-XII.

D i s t r i b u c i ó n : Estados Unidos de América (Florida), América Central (Honduras), América del Sur (Ecuador, Colombia, Venezuela), Jamaica, Navassa, La Española. Presente en Cuba occidental: PR, Hab, C Hab, Mat, IJ, Cuba central: Ci, SS (Loma de Banao; cerca de San Felipe) y Cuba oriental: Gr (Ensenada de Mora; Alegría de Pío), Ho, Gu. Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, bosque semideciduo mesófilo, con frecuencia en bosque de galería. Es probable que antiguamente tuviera una distribución más amplia en Cuba, siendo reemplazada por *Amyris elemifera* debido a la degradación de la vegetación natural. – Mapa 27.


V a r i a b i l i d a d : Ver bajo la especie siguiente.

Fitoquímico de las hojas ha detectado la presencia de saponinas (Alemán & al. 1972, Sánchez & al. 1995) y trazas

de alcaloides (Sánchez & al. 1995). El aceite esencial de las hojas contiene una fuerte proporción de valerianol (Pino & al. 2006).

U s o s: Planta medicinal (Fuentes & Expósito 1997). La resina de la corteza y del tronco "se puede emplear para suplir el bálsamo de Tolú y para secar con mayor prontitud la pintura" (Grosourdy 1864, 3: 260). "Se emplea la raíz que sale al naciente, macerada en vino dulce, que cura el ahogo" (Roig 1974: 342). Según Fors (1968: 48) "La madera puede ser empleada en la fabricación de objetos torneados, de ciertos aceites y localmente como postes de cerca". Roig (1963: 332-333) menciona su uso en hachones y para hacer estantes.

N o m b r e s c o m u n e s : Cuaba, cuaba amarilla, cuaba blanca, cuaba caracolillo, cuaba de cosechas, cuaba de monte, cuaba de olor, cuabilla, palo de roble (Gómez & Roig 1914, León & Alain 1951, Roig 1963).



Mapa 27. Amyris balsamifera L.

- **3.2.** Amyris elemifera L., Syst. Nat., ed. 10: 1000. 1759 ≡ *Amyris sylvatica* Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist.: 107. 1763, *nom. illeg*. Lectotipo (Howard 1988: 557): [ícono] "*Frutex trifolius resinosus floribus tetrapetalis albis racemosis*" en Catesby, Nat. Hist. Carolina 2: t. 33, f. [3]. 1734.
- = *Amyris maritima* Jacq., Enum. Syst. Pl.: 19. 1760 ≡ *Elemifera maritima* (Jacq.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1-2: 100. 1891. Descrito de Cuba, costa rocosa cerca de La Habana; tipo no designado.
- = Amyris floridana Nutt. in Amer. J. Sci. Arts 5: 294. 1822 ≡ Elemifera floridana (Nutt.) M. Gómez & Roig in Bol. Estac. Exp. Agron. Santiago de las Vegas 22: 73. 1914. Holotipo: Estados Unidos de América, Florida oriental, X-XI-1821, Ware (BM? [n.v.]).
- = *Amyris diatrypa* Spreng. in Neue Entdeck. Pflanzenk. 3: 48. 1822. Descrito de La Española; tipo no designado.

- = Amyris granulata Urb. in Ark. Bot. 24A(4): 15. 1932. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] La Española, República Dominicana, prov. Barahona, "Candlewood, Trujín", 8 a 14-II-1922, Abbott 1711 (BM!; isolectotipos: GH #44001 [n.v.], NY #2130!).
- "Amyris plumieri" sensu Grisebach (1866: 66) et Sauvalle (1873: 20) (non Amyris plumieri DC. 1825).

Árbol o arbusto aromático, de 1-11(-17) m de alto, glabro o en partes hispídulo por pelos diminutos. Hojas opuestas o subopuestas, glabras, a menudo con numerosas glándulas oleíferas; peciolo – de 0,5-2,5(-4) cm de  $largo - y raquis \pm delgados$ ; foliolos 3-5(-7), ovados, lanceolado-aovados, rómbico-aovados, rómbicos, suborbiculares, ovales u obovados, de (0.8-)1- $7(-8) \times (0.6-)1-4(-4.5)$  cm, cartáceos a coriáceos,  $\pm$  densamente pelúcidoglandulosos, agudos a ± largamente acuminados, apiculados, obtusos o emarginados, de margen crenulado plano a recurvado, de base cuneiforme subtruncada o, redondeada, los laterales con peciólulo de (2-)3-6(-10) mm de largo. Inflorescencias terminales o a veces axilares, en panícula a menudo multiflora de (1,5-)3-5(-7) cm de largo, con ejes a veces pulverulentos a menudo glandulosos. Pedicelos de 1,5-1,8 mm de largo. Flores 4-meras. Sépalos concrescentes basalmente o hasta la mitad, ovados a triangulares, de 0,3-0,7 mm de largo, glandulosos, de margen eroso y ciliado. Pétalos obovados u ovales, de 1,5-3,5 mm de largo, blancuzcos, con glándulas oleíferas por fuera, a veces unguiculados, de margen eroso. Estambres subhomomorfos, todos con antera sagitada. Ovario oblongoovoide, ovoide o elipsoideo, mayormente glabro, de 0,6-0,8 mm de largo, con ginóforo subnulo a bien desarrollado. Drupa globosa, de (2-)3-8(-9) mm de diámetro, glauca a negra, subsésil o rara vez brevemente atenuada. – Fl. y Fr.: I-XII.

D i s t r i b u c i ó n : Estados Unidos de América (Florida), dudosamente en México y América Central, Bahamas, Antillas. Presente en Cuba occidental: PR, Hab (Boca de Canasí), C Hab, Mat (Bahía de Matanzas; Rincón Francés), IJ, Cuba Central: Ci, SS (Topes de Collantes; Loma de Banao), CA (entre San Felipe y Guadalupe; cerca de Boquerón), Cam, LT y Cuba oriental: Gr, Ho, SC, Gu. Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, y bosque semideciduo microfilo, entre 0 y 600 msm. – Mapa 28.

V a r i a b i l i d a d : Las hojas presentan gran variabilidad, tanto ontogenética (hojas más divididas en los individuos jóvenes) como geográfica.

Las dimensiones máximas de los folíolos coinciden con las de *Amyris balsamifera*, de la cual se diferencia por el indumento del ovario y la forma del fruto. En las regiones más áridas las hojas son muy pequeñas, marcadamente aromáticas por tener glándulas de aceite más conspicuas: Ci (Loma del Burro), Ho (Bahía de Vita, Punta Pesquero Nuevo) y Gu (costa sur), también en la República Dominicana (Barahona).

Fitoquímica: Las hojas poseen aceite esencial que contiene una fuerte proporción de beta-cariofileno (Pino & al. 2000).

U s o s : Los mismos que para *Amyris balsamifera*. Roig (1963: 333) menciona que la madera es dura, amarilla y se usa para antorchas.

N o m b r e s c o m u n e s: Cuaba amarilla, cuaba amarilla de costa, cuaba blanca, cuaba de costa, cuaba de monte, cuaba de sabana, cuaba ruda, cuabilla, incienso, incienso de costa, palo de incienso, palo de resina, tarro de chivo (Gómez & Roig 1914, León & Alain 1951, Roig 1963).



Mapa 28. Amyris elemifera L.

**3.3. Amyris polymorpha** Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 64. 1925. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Oriente [Granma], "in peninsula Cabo Cruz prope Niquero, in calcareis litoralibus", 16-I-1923, *Ekman 16162* (S!; isolectotipo: NY #2135!).

Arbusto muy aromático. *Ramas* diminutamente pelosas. *Hojas* opuestas; *pecíolo* de 1-2 mm de largo; *–peciólulos* glanduloso-verrugosos y diminutamente pelosos, los laterales de 0,2-0,5 mm de largo, el terminal de 0,3-1 mm de largo; *folíolos* (1-)3, obovados o rómbico-obovados, de 0,8-1,5(-2)  $\times$  0,3-0,5(-0,7) mm, coriáceos, densamente glandulosos, glabros o diminutamente pubescentes por el envés, estrechados desde los  $\frac{2}{3}$  de su

longitud hasta la base cuneiforme, de margen glanduloso-repando, recurvado o revoluto; *nervios* secundarios poco numerosos. *Inflorescencias* terminales y subterminales, paucifloras, de 1-3 cm de largo; *pedúnculo* de ≤ 1 cm de largo. *Pedicelos* de 2-5 mm de largo, bibracteolados. *Flores* 4-meras. *Sépalos* (en el botón) triangulares, de 0,5 mm de largo, de margen eroso. *Pétalos* ovales, de ca. 2 mm de largo; *Estambres* 8. *Ovario* oblongo-elipsoideo, glabro; *estigma* cónico, sésil. *Drupa* subglobosa, de 5-6 mm de diámetro, negra. − Fl.: I, V, X; Fr.: V.

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Gr (Cabo Cruz; El Hondón; Ensenada de Mora). Crece en bosque siempreverde microfilo y matorral xeromorfo costero y subcostero. — Mapa 29.



Mapa 29. Amyris polymorpha Urb.

- **3.4.** Amyris stromatophylla P. Wilson in N. Amer. Fl. 25: 217. 1911. Lectotipo (Designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Sierra Nipe, along trail Piedra Gorda to Woodfred, serpentine formation", 400-500 msm, 13-I-1910, *Shafer 3711* (NY #2139!; isolectotipo: NY #2138!).
- = *Amyris stromatophylla* subsp. *moaënsis* Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18: 30. 1973. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Delta of Moa", 17-IV-1945, *Acuña 12452* (HAC!).
- = Amyris stromatophylla subsp. yumuriensis Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18: 29. 1973. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Sierra de Baracoa, valle de Yumurí, entre Baracoa y Maisí", X-1939, León & Matos 17400 (HAC!; isotipo: NY #688302!).

Arbusto de 1-1¼ m de alto. *Ramas* robustas, glabras, glandulosoverrugosas cuando jóvenes. *Hojas* alternas, unifolioladas o en apariencia simples; *pecíolo* a veces distalmente articulado, de 2-5 × 1,5 mm, glabro,

glanduloso-verrugoso; lámina oval, oblongo-obovada, oblongo-aovada o rómbica, de (2-)2,5-8 × 0,5-4 cm, coriácea, rígida, densamente glandulosa, emarginada, obtusa o a veces acuminada o mucronada, de base redondeada o anchamente cuneiforme y margen grueso, entero o glandulosorepando; nervadura más prominente en el envés que en la haz, con nervio medio robusto, los secundarios numerosos, rectos y paralelos, confluentes en un nervio intramarginal robusto, y los terciarios escasos, rectos. Inflorescencias axilares y terminales, en panícula subcorimbosa pauciflora de 1-3 cm de largo. Pedicelos de 2-5 mm de largo. Flores 4-meras. Sépalos concrescentes hasta ½ en un cáliz ciatiforme o ± urceolado de ca. 1 mm de largo, los lobos triangulares o semiorbiculares, de 0,7-0,9 mm de ancho, de margen eroso. Pétalos libres, ovales, de ca. 2,4 mm de largo, densamente glandulosos, amarillo pálido, de margen eroso. Estambres episépalos con antera subglobosa, los epipétalos más breves y con antera aguda, sagitada. Ovario subgloboso, densamente glanduloso; estilo corto y grueso; estigma subcapitado. Drupa subglobosa, de 5-7(-10) mm de diámetro. - Fl.: V-VI, X: Fr.: I, IV-VI.

Distribución: Endémica en Cuba oriental: Ho, Gu (valle del Yumurí; Cajobabo). Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina y en bosque de galería destruido, entre 0 y 800 msm. – Mapa 30.

V a r i a b i l i d a d : La distinción, por Borhidi & Muñiz (1973), de tres subespecies es prematura. El tamaño de las hojas no es un criterio válido. En particular, el modelo de Borhidi (1996: 253) de una disminución gradual del tamaño de las hojas de este a oeste no se corresponde con la realidad. Las plantas de Moa y de la Sierra de Nipe tienen hojas de igual tamaño, mientras que en el medio, en la Sierra del Cristal, las hojas son más grandes.



Mapa 30. Amyris stromatophylla P. Wilson




Figura 5.1-11. Amyris lineata C. Wright ex Griseb. (especímenes: Ekman 9546, S [1, 4], Jack 7893, NY [3, 7], Clemente 5156, BP [5], HFC 31013, HAJB [6], Clemente 5156, US [8-9], HFC 59249, HAJB [10], Wright 1154, S [11]); 5.12. Amyris balsamifera L. (espécimen Curtiss 589, F) (dibujos de Michael Rodewald).

1. Ramas con flores y botones; 2. Inflorescencia; 3. Flor; 4. Diagrama floral; 5. Fruto;

Ramas con flores y botones;
 Inflorescencia;
 Flor;
 Diagrama floral;
 Fruto;
 Hojas unifolioladas, mostrando la variabilidad;
 Folíolo.

- **3.5.** Amyris lineata C. Wright ex Griseb. in Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 8: 177. 1860 ≡ *Elemifera lineata* (Griseb.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1-2: 100. 1891. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Prope villam Monte Verde dictam", [26-II, fide GH] 1859, *Wright 1154* (GOET!; ¿isotipos?: GH [n.v.], K!).
- = Amyris maestrensis Borhidi & Kereszty in Acta Agron. Acad. Sci. Hung. 27: 432. 1978. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Loma del Gato, Sierra Maestra, bosque", XII-1946, Clemente 5156 (HAC [n.v.]; isotipos: BP!, HAJB!, US!).
- Amyris verrucosa Borhidi & Kereszty in Acta Agron. Acad. Sci. Hung.
   27: 432. 1978. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Sancti Spíritus, "Las Lagunas, Buenos Aires", 9-IV-1930, Jack 7893 p.p. (HAC [n.v.]; isotipos: BP [fragm.]!, NY ##688304-688305!, S!, US!).

Arbusto o árbol delgado de  $\leq 8(-13)$ m de alto. Ramas glabras, flexibles. Hojas alternas, unifolioladas; pecíolo delgado, de 3-12 × 0,5 mm, distalmente articulado; folíolo con peciólulo de 0,2-0,8 mm de largo, estrechamente oval, oblongo-lanceolado o lanceolado, de (3-)7-10(-18) × 0,3-1,2(-3) cm, coriáceo pero flexible, glabro, ± largamente acuminado en un acumen conduplicado o rara vez obtuso, de margen entero; nervios secun rectos, paralelos, confluentes en un nervio intramarginal. Inflorescencias axilares o rara vez terminales, en panícula subcorimbosa pauciflora de ≤ 2,5 cm de largo. Pedicelos de 0-5 mm de largo. Flores 4(-5)-meras. Sépalos de 0,4-1(-1,4) mm de largo, concrescentes por ½ o ¾ en un cáliz urceolado, los lobos triangular-aovados a semiorbiculares, de prefloración imbricada, de margen eroso. Pétalos ovales, de 2,8-3,5 mm de largo, pelúcido-glandulosos, ± largamente unguiculados o no, de margen entero o ligeramente eroso. Estambres de 3-4,5 mm de largo, los episépalos con antera globosa, los epipétalos más cortos y con antera sagitada. Ovario de ≤ 1 mm de largo; ginóforo de 0,4-0,8 mm de largo, incluso en el cáliz o exerto; estilo corto o nulo; estigma capitado o plano. Drupa globosa, de 5 mm de diámetro. Fl.: II, IV, VI-VIII, X-XII; Fr.: II, XII.

Distribución: Probablemente en La Española (*Alain & Perfa 19546*, JBSD!, NY!; estéril). Presente en Cuba occidental: PR, Cuba central: Ci (Sierra del Escambray: Las Lagunas) y Cuba oriental: Ho, SC, Gu. Crece en matorral xeromorfo espinoso y subespinoso sobre serpentina, complejo de vegetación de mogotes, entre 0 y 1000 msm. – Mapa. 31.

Variabilidad: Las hojas y los frutos son variables, pero sin correlación geográfica o edáfica evidente. En el estado actual del conocimiento no es posible delimitar taxones infraespecíficos.

Nombre común: Cuaba de la Maestra (León & Alain 1951).



Mapa 31. Amyris lineata C. Wright ex Griseb.

**3.6. Amyris polyneura** Urb. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 113. 1922. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "prope Baracoa in saxis calcar. ad Taco Bay", 5-XII-1914, *Ekman 3759* (S!; isolectotipos: GH #44004 [n.v.], NY #2136 [foto!]).

Arbusto. Ramas glabras. Hojas opuestas o subopuestas, en apariencia simples: pecíolo de 2-5 mm de largo, robusto, surcado, con o sin articulación distal, glanduloso-verrugoso; lámina obovado-cuneiforme u obovada, más raramente elíptico-obovada, de 1,5-4 × 0,9-3 cm, coriácea, brillante en la haz, mate en el envés, con numerosas glándulas pelúcidas, emarginada, más raramente retusa u obtusa, de margen ± revoluto, entero a ligeramente glanduloso-repando; nervadura impresa en la haz, los nervios secundarios numerosos, paralelos y rectos. Inflorescencias terminales y axilares, en panícula pauciflora de 1-1.5 cm de largo, con ejes y brácteas pubescentes. Pedicelos de 1,5-2 mm de largo, pubescentes. Flores 4-meras. Sépalos basalmente concrescentes, triangular-lanceolados, de 0,6-0,8 mm de largo, pubescentes y densamente glandulosos. Pétalos libres, ovales, de 3 × 2 mm, blanco crema, brevemente unguiculados. Estambres epipétalos de 1,5 mm de largo, los episépalos de 2,5 mm de largo; anteras subhomomorfas, globosas, ligeramente apiculadas. Ovario algo oblicuo, sésil, elipsoideo; estilo corto y grueso; estigma capitado. Drupa joven ovoide, de 3 × 2 mm. – Fl.: X-XII; Fr.: XII.

Distribución: Endémica en Cuba central: Ci (Sierra del Escambray: Loma del Burro) y Cuba oriental: Ho (Sierra de Moa), Gu (Bahía de Taco). Crece en bosque siempreverde microfilo, bosque de pinos, muy localizada en las crestas de los pinares, entre 100 y 900 msm. – Mapa 32.



Mapa 32. Amyris polyneura Urb.

**3.7. Amyris cubensis** (Borhidi & Acuña) Beurton, **comb. nov.** ≡ *Kodalyodendron cubense* Borhidi & Acuña in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19: 43. 1974. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Breñales de Playa de la Vaca, Moa, Baracoa", 25-V-1945, *Acuña 13816* (HAC!).

Arbusto o arbolito muy ramoso. Ramas con entrenudos de 1-10 mm de largo y braquiblastos abundantes de 0,8-3(-4) cm de largo, las jóvenes a veces hispídulas. Hojas dimorfas, las normalmente desarrolladas limitadas a los braquiblastos, unifolioladas o simples; pseudoestípulas espinescentes, de 0,2-0,6 mm de largo; pecíolo de 1-3 mm de largo, surcado, glanduloso; lámina oval, obovada o suborbicular, de 4-8 × 2-5 mm, coriácea, pelúcidoo negruzco-glandulosa, redondeada o emarginada; de base redondeada, sésil o muy cortamente (0,4 mm) peciolulada, y margen revoluto; hojas bracteiformes ± opuestas a lo largo de las ramas y en la base de los braquiblastos, ± reducidas a un pecíolo espinescente robusto de 1-2 mm de largo, sin lámina o con lámina escuamiforme, triangular, caediza. Inflorescencias axilares, uni- o paucifloras, con brácteas estériles. Flores 4meras, de ca. 1,6 mm de largo en botón. Sépalos basalmente concrescentes, algo desiguales, triangulares u ovados, de margen ciliado. Pétalos libres, elíptico-obovados, de ca. 1,5 mm de largo, brevemente unguiculados, de margen subglabro o ciliado. Disco bien desarrollado. Estambres episépalos con anteras elipsoideas a subglobosas, los epipétalos con anteras sagitadas. Drupa joven [n.v.] supuestamente ovoide, de 2-4 mm de largo, 2-sperma. - Fl.: XI; Fr.: ?

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Ho (Playa la Vaca), SC (Loma Saca la Lengua). Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, entre 100 y 600 msm. Registrada como "Extinta" (Berazaín & al. 2005), pero probablemente subsiste en la segunda localidad. – Mapa 33.



Mapa 33. Amyris cubensis (Borhidi & Acuña) Beurton

T a x o n o m í a : La separación de un género monotípico *Kodalyodendron* para esta especie (Borhidi & al. 1974: 42) no se justifica. No hay diferencias, entre *Amyris cubensis* y las otras especies de *Amyris*, ni en la posición y morfología de los estambres ni en el número de primordios seminales. En todas las especies aparecen ocasionalmente frutos dispermos. Ni el menor número de flores por inflorescencia ni la presencia de braquiblastos y pseudoestípulas constituyen criterios genéricos válidos.

V a r i a b i l i d a d : Las plantas de la Sierra del Cristal (Loma Saca la Lengua) son menos espinosas que las costeras (Playa la Vaca).

**4. Helietta** Tul. in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 3, 7: 280. 1847. Tipo: *Helietta plaeana* Tul.

Arbustos o árboles inermes, de 1-10(-25) m de alto. *Ramas* glabras o pubescentes. *Hojas* opuestas a alternas, generalmente trifolioladas, glabras o pubescentes; *pecíolo* canaliculado cerca de la base, a veces distalmente alado; *foliolos* sésiles, ligeramente asimétricos, el terminal más largo que los laterales, de margen usualmente entero, glanduloso. *Inflorescencias* terminales, en panícula laxa con ramas ± opuestas, patentes; *pedúnculo* corto; *brácteas* y bractéolas escuamiformes. *Flores* pequeñas, actinomorfas, usualmente hermafroditas, (3-)4-5-meras. *Sépalos* basalmente concrescentes o libres, persistentes. *Pétalos* usualmente libres, patentes, glandulosos, de prefloración imbricada. *Estambres* alternipétalos; *filamentos* libres; *anteras* medialmente dorsifijas, versátiles. *Disco* cupuliforme, de borde entero a undulado. *Ovario* (3-)4-5-mero; *carpelos* sésiles, concrescentes por lo menos basalmente, glandulosos, glabros o pubescentes; *primordios seminales* 2 por lóculo, colaterales. *Fruto* en esquizocarpo alado; *mericarpos* (3-)4-5 secos, indehiscentes, monospermos, samaroides, con ala dorsal

reticulado-nerviosa; *exocarpo* coriáceo, *mesocarpo* sutil, *endocarpo* duro. *Semilla* libre del exocarpo, elipsoidea; *testa* sutil, parda a negra, glabra; *endospermo* carnoso; *embrión* linear-complanado; *radícula* superior, corta; *cotilédones* largos, plano-convexos.

D i s t r i b u c i ó n : Género neotropical de 8 especies mayormente mesófilas o xerófilas. En Cuba una sola especie.

T a x o n o m í a : Engler (1896, 1931) colocó *Helietta* junto con otros 3 géneros neotropicales en *Toddalioideae*, subtribu *Pteleinae* Engl. La existencia de estrechas relaciones entre esos 4 géneros fue comprobada por recientes investigaciones morfológicas y fitoquímicas (Silva & al. 1994, Pirani 1998).

P a l i n o l o g í a : Polen tricolporado (datos inéditos de la autora).

Biología de la reproducción: Dispersión anemocora.

- **4.1. Helietta glaucescens** Urb., Symb. Antill. 9: 179. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Papayo, Mandinga hill", ca. 850 msm, 5-VIII-1918, *Ekman 9456* (S!; isolectotipos: BM!, G [n.v.], GH [n.v.], MO [n.v], NY #21165!).
- Helietta cubensis Monach. & Moldenke in Phytologia. 2: 223. 1947.
   Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Mina Cayoguan, Pta. Gorda", 21-VII-1944, Clement[e] & al. 3971 (NY #21164!; isotipo HAC!).

Arbolito de  $\leq 3$  m de alto. *Ramas* jóvenes y pérulas glabras o pubérulas. *Hojas* generalmente opuestas; *pecíolo* de (1-)2-6 cm de largo, a veces estrechamente alado, glabro o diminutamente pubérulo; *foliolos* (1-)3, obovadolanceolados, obovados u ovales, de 3-9(-12) × (1-)1,7-4(-5,5) cm, cartáceos a subcoriáceos, usualmente glaucos, pubescentes cuando jóvenes, densamente pardo-pelúcido-glandulosos, redondeados o emarginados, de base estrechado-cuneiforme y margen plano a subrevoluto; *nervadura* insconspicua. *Inflorescencias* de 2,5-6(-12) cm de largo, gráciles, con ejes pulverulentos o glabrescentes; *pedúnculo* de 1-2 cm de largo. *Pedicelos* de 1-1,6 mm de largo. *Flores* de ca. 3-4 mm de largo, 4(-5)-meras. *Sépalos* basalmente concrescentes, de ca. 1 mm de largo y ancho, suborbiculares a triangulares, de margen escarioso a ciliado, muy glanduloso. *Pétalos* elíptico-linguiformes, de ca.  $3 \times 1,3$  mm, amarillentos, muy glandulosos,




Figura 6. *Helietta glaucescens* Urb. (especímenes: *PFC* 26972, B [1 p.p. (solo las inflorescencias)]; *Beurton 995*, B [1 p.p., 2-3], *Ekman 16566*, S [4, 6], *Ekman 15269*, S [5]; dibujos de Michael Rodewald).

1. Ramas con botones florales; 2-3. Envés de un folíolo terminal, con detalle; 4. Flor terminal 5-mera, con un pétalo removido; 5. Fruto inmaduro con 4 mericarpos samaroides; 6. Diagrama de una flor 4-mera.

alguno de los interiores subcuculado. *Estambres* < que los pétalos; *filamentos* de ca. 1,4 mm de largo; *anteras* de ca. 0,5 mm de largo. *Disco* undulado. *Ovario* 4(-5)-mero; *carpelos* concrescentes; *estilo* único, de ca. 0,5 mm de largo; *estigma* capitado. *Mericarpos* 4(-5), alados, de 6,5-7 × 5-7 mm, verdosos, con glándulas pardo claro. *Semilla* (inmadura) plana, oval, de ca. 4 × 1,5 mm. Fl.: V-XII, IX; Fr.: IX, XII.

Distribución: Endémica en Cuba occidental: PR (Sierra de Viñales) y Cuba oriental: Ho, SC (El Uvero; alrededores de Loma Saca la Lengua), Gu. En Cuba occidental crece en complejo de vegetación de mogotes, en Cuba oriental en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, bosque pluvial montano sobre lateritas y bosque siempreverde mesófilo sobre calizas, entre 100 y 500 msm. Registrada como "Vulnerable" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 34.

F i t o q u í m i c a : Tamizajes fitoquímicos han detectado flavonoides y lactona (coumarinas) y trazas de triterpenos, aceites esenciales, saponinas y carotenos, en hojas y tallos (Castillo & al. 2004).

Nombre común: Fragante (Roig 1963).



Mapa 34. Helietta glaucescens Urb.

## **5. Pilocarpus** Vahl, Eclog. Amer. 1: 29. 1797. Tipo: *Pilocarpus racemosus* Vahl

Arbolitos o arbustos. Ramas lenticeladas; p'erulas terminales con catafilos grandes, cóncavos. Hojas alternas o subrosuladas en el ápice de las ramas, simples o compuestas. Inflorescencias terminales o axilares, subsésiles, alternifloras, en racimo o espiga. Pedicelos, si presentes, incurvados en el botón,  $\pm$  patentes en la antesis, ascendentes en el fruto. Flores 5(-4)-meras, hermafroditas, globosas en botón. C'aliz gamosépalo, dentado o

lobado, persistente. *Pétalos* libres pero coherentes por su ápice uncinado, ovados, ovales o lanceolados, de prefloración valvar, reflexos en la antesis. *Estambres* alternipétalos; *filamentos* subulados (en Cuba) o abruptamente truncados; *anteras* ± anchamente ovoides, de base cordiforme, dorsifijas, versátiles (en Cuba) o fijas, con una glándula dorsal cerca del ápice. *Disco* anular a cupuliforme, con glándulas por dentro. *Ovario* 5(-4)-mero, glabro o piloso; *carpelos* basalmente concrescentes, distalmente libres pero unidos por el estilo; *primordios seminales* (1-)2 por carpelo; *estilos* subapicales, postgenitalmente concrescentes; *estigma* único. *Fruto* cortamente estípitado; *folículos* (1-)2-5, bivalvados, ± sésiles, por lo general monospermos, los abortivos usualmente persistentes; *exocarpo* con prominencias transversales subparalelas; *endocarpo* liso, cartilaginoso, elástico; *arilodio* más fino. *Semillas* subangular-reniformes, lateralmente comprimidas; *hilo* estrechamente oblongo-triangular.

D i s t r i b u c i ó n : Género de 16 especies de México, América Central y del Sur y Antillas. En Cuba existe una sola especie.

T a x o n o m í a : Junto con los géneros cubanos *Cusparia y Ravenia*, *Pilocarpus* pertenece a la tribu neotropical *Cusparieae* DC. (*Galipeeae* Kallunki), que se caracteriza por sus flores mayormente grandes, radiales hasta zigomorfas, con colores parcialmente llamativos. *Pilocarpus* es uno de los cuatro géneros de la subtribu *Pilocarpinae* Engl., que se diferencia de *Cuspariinae* Engl. por tener botones florales globosos y no oblongos, corola subregular y pétalos casi libres. Un tratamiento monográfico de *Pilocarpus* fue realizado por Kaastra (1982) y revisado por Skorupa (1998, 1999, 2003).

Palinología: Granos de polen parecidos a los de *Zanthoxylum* (Barth 1985: 147).

C i t o l o g í a : Números cromosómicos: n = 18, 22 (Stace & al. 1993).

Biología de la reproducción: Flores proterandras. Como en *Plethadenia*, las semillas son catapultadas fuera del folículo; en ese proceso el endocarpo, que queda unido a la semilla, se separa del exocarpo.

I m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a : Varias especies poseen el alcaloide pilocarpina, muy usado en oftalmología como parasimpático. A causa de su interes farmacológico se han cosechado enormes cantidades de hojas y ramas, hasta comprometer la sobrevivencia de dos especies brasileñas, *Pilocarpus jaborandi* Holmes y *Pilocarpus microphyllus* Stapf ex Wardleworth.




Figura 7. *Pilocarpus racemosus* Vahl subsp. *racemosus* (especímenes: *Beurton & Mory 893*, B, de Puerto Rico [1 p.p.]; *Morton & Acuña 3434*, US [1 p.p., 2-3], *Shafer 29387*, US, de Puerto Rico [1 p.p., 4], *León & Alain 19176*, US [5-8]; dibujos [1-8] de Renate Israel).

1. Rama con inflorescencia; 2. Capullo; 3-4. Flor en fase  $\Im$  y  $\Im$  (gineceo); 5. Fruto con dos folículos fértiles, abiertos, y tres abortivos; 6. Endocarpo proyectado de uno de los folículos fértiles; 7-8. Semilla en vista lateral y ventral; 9. Diagrama floral.

Especie a excluir: *Pilocarpus cubensis* (Borhidi & O. Muñiz) Lippold (*Allophylus cubensis* Borhidi & O. Muñiz), especie conocida solo por el tipo (Sierra Maestra, HAC #27130!), no pertenece a *Pilocarpus* y ni siquiera a *Rutaceae*, sino quizás es una *Forchhammeria* (*Capparaceae* s.l.).

- **5.1. Pilocarpus racemosus** Vahl, Eclog. Amer. 1: 29. 1797. Lectotipo (Kaastra 1982: 157): [espécimen] Antillas Menores, "Monserrat", *Ryan* (C-Vahl [foto! microficha IDC #54-A3]; isolectotipos: BM [n.v.], P [n.v.]).
- = *Pilocarpus longipes* Rose in Contr. U.S. Natl. Herb. 5: 112. 1897. Lectotipo (Kaastra 1982: 157): [espécimen] México, Guerrero, "Acapulco and vicinity", X-1894 a III-1895, *Palmer 514* (US #256912 [foto!]; isolectotipos: F [n.v.], GH [n.v.], MO [n.v.], NY #67055 [foto!], UC [n.v.], US #256916 [foto!]).
- = *Pilocarpus insularis* Rose, Amer. Fauna 14: 80. 1899. Holotipo: [espécimen] México, Islas de las Tres Marías, "María Madre, Isl.", 3 a 25-V-1897, *Nelson 4307* (US #346051 [foto!]; isotipos: K!, NY #67056 [fragm.]!).
- "Pilocarpus heterophyllus" sensu Griseb. (1860: 170, 1866: 48) (non Pilocarpus heterophyllus (DC.) Griseb. 1860).

Arbolito o arbusto de 2-8(-10) m de alto. Corteza lisa, gris oscuro. Ramas glabras, con lenticelas de ca. 1 mm de largo. Hojas a veces simples, generalmente glabras; pecíolo de (0,5-)3-7(-11) cm de largo, con o sin alas; Folíolos (1-7), o lámina foliar, ± estrechamente ovales a subobovados, de (4-)6-18(-30) × (1,5-)2,8-8(-9,5) cm, coriáceos a cartáceos, generalmente glabros, pelúcido- u opaco-glandulosos, emarginados, de base estrechada en un peciólulo de 0-1,5 mm de largo (1-3,8 cm en el folíolo terminal) y margen entero. Racimos subterminales, multifloros, de (5-)9-25(-50) cm de largo, erectos. Pedicelos de 0,8-2,1 cm de largo. Flores de 7,5-9 mm de diámetro. Cáliz de prefloración valvar, de 0,6-0,7 mm de largo, coriáceo. Pétalos ovados, de 3,2-4 × 1,8-2,8 mm, coriáceos, con ápice inflexo. Estambres de 1,7-2,2(-2,8) mm de largo. Ovario diminuto en la fase 3, desarrollándose tardíamente; estilo y estigmas formando un complejo claviforme de 1,8-2 mm de largo; primordios seminales superpuestos. Foliculos fértiles 1-3(-5), lateralmente comprimidos, ± semiorbiculares, ventralmente rectos, de 9-12 × 8-9 mm, glandulosos; endocarpo amarillento o anaranjado; arilodio fino, pardo claro. Semillas de 5-7 × 1-4 mm, rugulosas, negro pardusco brillante. - Fl.: XII-V, IX-X; Fr.: XII-II, IV, VI-VII, IX-X.

D i s t r i b u c i ó n : México (Yucatán), América Central y del Sur, Antillas.

V a r i a b i l i d a d: Las plantas de América Central (Costa Rica, El Salvador y probablemente Belice) difieren de las demás por flores verdosas en todas sus partes, y generalmente sus hojas tienen folíolos más numerosos. Fue descrita por Kaastra (1982: 160) como subespecie distinta, *Pilocarpus racemosus* subsp. *viridulus* Kaastra. La población de Yucatán difiere de las antillanas y suramericanas por mostrar las ramas jóvenes, el pecíolo y raquis de los folíolos pubescentes (y no glabros), además las pérulas terminales son pubescentes por fuera (apicalmente peniciladas pero con superfície glabra en las demás poblaciones). Esa población fue descrita por Kaastra (1982: 159) como variedad particular, *Pilocarpus racemosus* var. *yucatanus* Kaastra, pero mejor se considera como subespecie distinta.

#### **5.1.1. Pilocarpus racemosus** Vahl subsp. **racemosus** — Fig. 7.

*Hojas* simples ó 1-3(-5)-folioladas. *Flores* purpurascentes o rojo oscuro en todas sus partes excepto el estigma que es verde.

Distribución: América del Sur (Venezuela, Guayana Francesa), Antillas (excepto Jamaica). Presente en Cuba occidental: PR, C Hab (Cojímar), IJ (Caleta Cocodrilos), Cuba central: VC (Arroyo Grande; Arroyo Trinitario), Ci (Vegas de Matagua; sur del Pico San Juan), SS (Pico Poterillo, Topes de Collantes; Loma de Banao) y Cuba oriental: Gr (Sierra Maestra: río Yao), Ho, Gu. Crece en bosque pluvial montano, bosque de pinos, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, matorral xeromorfo costero y subcostero, complejo de vegetación de mogotes, entre 0 y 800 msm. – Mapa 35.



Mapa 35. Pilocarpus racemosus Vahl subsp. racemosus

Palinología: Granos de polen de tipo similar al de *Zanthoxylum* (Barth 1985: 147): de mediano tamaño, isopolar, prolado, 3-colporado, recto y longicolpado con endoaperturas lalongadas. Exina reticulada.

F i t o q u í m i c a : Mediante tamizaje fitoquímico se ha determinado la presencia de alcaloides y saponinas en las hojas (Alemán & al. 1972, Sandoval & Oquendo 1990).

Nombre común: Aceitillo (Alain 1988).

#### 6. Cusparia Humb., Essai Géogr. Pl.: 58. 1807.

Tipo: Cusparia febrifuga Humb. [= Cusparia trifoliata (Willd.) Engl.].

Bonplandia Willd. in Mém. Acad. Roy. Sci. Hist. (Berlin) 1802: 26.
 1804 (non Bonplandia Cav. 1800) ≡ Angostura Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 188. 1819. Tipo: Angostura cuspare Roem. & Schult., nom. illeg. (Bonplandia trifoliata Willd., Angostura trifoliata (Willd.) T. S. Elias, Cusparia trifoliata (Willd.) Engl.).

Arbustos o árboles de ≤ 15 m de alto, inermes, pubescentes en todas partes por pelos estrellados de rayos desiguales. Hojas alternas, pecioladas, (1-)3(-5-7)-folioladas; lámina cartácea, de margen entero. Inflorescencias terminales, en panícula tirsoide. Flores hermafroditas. Cáliz sinsépalo, 5lobado, persistente. Corola subactinomorfa, 5-mera, cortamente simpétala, blanca o crema, con segmentos patentes o recurvados. Estambres fértiles 2, flanqueando el pétalo superior y más interno; filamentos aplanados, libres entre si, pero con márgenes contiguos soldados por pelos crespos entrelazados y abaxialmente adherentes por sus pelos al tubo de la corola, formando un pseudotubo corto; anteras libres, exertas del tubo de la corola, elipsoideas, glabras, usualmente con dos apéndices denticulados o bífidos en la base; estaminodios  $\leq 5$ , con parte apical libre espatulada o subulada, frecuentemente glandulosa. Disco glabro, cupuliforme, 5-lobado, más corto que el ovario, de margen entero, crenado o dentado. Ovario 5(-6)-mero; carpelos libres; estilo único, glabro o pubescente; estigma ± capitado o alargado. Fruto de 1-5 folículos monospermos, bivalvados; libres o apenas concrescentes, de ápice rostrado; endocarpo elásticamente córneo; arilodio membranáceo. Semillas lisas o subrugulosas, glabras; testa crustácea.

D i s t r i b u c i ó n : Género neotropical de ca. 8 especies, todas raras, de América Central y del Sur, una sola de ellas endémica en Cuba.



Figura 8. *Cusparia ossana* (DC.) Beurton (reproducido de Candolle 1822: t. 3).

1. Rama con hojas; 2. Inflorescencia; 3. Infructescencia; 4. Flor en fase preantética; 5. Corola abierta en vista ventral, con dos estambres fértiles y 5 estaminodios; 6. Gineceo; 7. Folículo con exocarpo, endocarpo y placenta endocarpal; 8. Exocarpo; 9. Endocarpo con restos de la placenta y semilla; 10. Endocarpo; 11. Semillas; 12. Placenta; 13. Flor fructífera, con los folículos removidos.

T a x o n o m í a : Los géneros *Cusparia* y *Ravenia* pertenecen a la tribu *Cusparieae*, subtribu *Cuspariinae* Engl. (*Galipeinae* Kallunki), redefinida por Kallunki & Pirani (1998) con clarificación de los límites genéricos. Ambos géneros cubanos comparten una corola tubular, la tendencia hacia la zigomorfia de corola y androceo, el número de estambres fértiles reducido a 2 (con transformación de los demás estambres en estaminodios) y los filamentos formando un falso tubo.

Palinología: Granos de polen grandes, 5-6-corto-colporados ó 5-porados, oblato-esferoidales; exina con escultura baculada y pequeñas estructuras variformes entre los báculos (Morton & Kallunki 1993, Beurton 2004).

Biología de la reproducción: Faltan observaciones de campo, pero la estructura especializada de las flores, proterandras, sugiere zoogamia. En *Galipea jasminiflora* (A. St.-Hil.) Engl., especie brasileña de la misma subtribu y con flores del mismo tipo morfológico, se observó autopolinización parcial además de la visita de varios insectos, polinizantes o no (Piedade & Ranga 1993).

F i t o q u í m i c a : La corteza contiene varios tipos de alcaloides y angosturina, sustancia amarga.

I m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a : Los nativos de América del Sur y Antillas utilizaban la corteza como tónico estimulante, y sigue siendo utilizada como antipirético (cortex angosturae) y base de un licor aromático venezolano, ingrediente de varios cocteles, llamado Amargo de Angostura.

N o t a : Contrariamente a lo que opina Elias (1970), el nombre genérico *Cusparia* fue válidamente publicado por Humboldt en 1807.

**6.1. Cusparia ossana** (DC.) Beurton, **comb. nov.**  $\equiv$  *Galipea ossana* DC., in Mém. Mus. Hist. Nat. 9: 149.  $1822 \equiv Raputia ossana$  (DC.) Engl. in Martius, Fl. Bras. 12(2): 104.  $1874 \equiv Angostura ossana$  (DC.) Beurton in Wildenowia 34: 278. 2004. Holotipo: [espécimen] Cuba "ad Habana", *La Ossa* (G-DC [foto! microficha IDC #270-A6 y botón floral!]). — Fig. 8.

Arbusto glabro a blanco-tomentoso. *Hojas* glabras a blanco-tomentosas; *peciolo* de 5,3-9,1 cm de largo; *foliolos* 3, ovales, de  $\leq$  14,5  $\times$  6 cm, cartáceos, glandulosos, acuminados, de base estrechada, subsésil a cortamente peciolulada, y margen entero. *Inflorescencias* multifloras, subcorimbosas,

de 19-35 cm de largo, glabras a densamente pubescentes; *pedúnculo* de 14-24 cm de largo; *cimas* de 1-3,5 cm de largo, las inferiores más largas que las superiores. *Pedicelos* de 0,8-4 cm de largo. *Flores* (solo conocidas en botón) de 8-12 mm de largo. *Cáliz* de ca. 3,3 mm de largo, densamente pubescente y glanduloso por fuera, con lobos ovales de 2-2,4 mm de largo, agudos. *Pétalos* de 6-10 mm de largo, densamente seríceos por fuera, los pelos con radios basiscopicos alargados, por dentro más esparcidamente pubescentes por pelos equiradiados. *Anteras fértiles* colaterales, libres, de ca. 5 × 1,4 mm, con apéndices pequeños o ausentes; *estaminodios* 4-5, con parte apical subulada, glandulosa, de 1,2-2,2 mm de largo. *Disco* 5-lobado, lóbulos bidentados. *Ovario* 5-mero, inicialmente glabro, luego seríceo; *estilo* lateral; *estigma* 5-partido, capitado; *primordios seminales* 2, superpuestos. *Folículos* 5, angular-ovoideos, de 10-12 × 6 mm; *endocarpo* anaranjado; *arilodio* pequeño, triangular-acroscópico. *Semillas* globosas; *testa* sutil, frágil, negra. – Fl.: ?; Fr.: III.

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba occidental: PR (probablemente San Diego de los Baños), C Hab o Hab ("ad Habana"). Registrada como "Extinta" (Berazaín & al. 2005). – No mapificada.

T a x o n o m í a : Entre las 7 especies conocidas de *Cusparia*, la única que se parece a la especie cubana es *Cusparia trifoliata* (Willd.) Engl., de Venezuela (Beurton 2004).

P a l i n o l o g í a : Granos de polen 5-corto-colporados, suboblato-esferoidales; eje polar de 49,5-56,1  $\mu$ m, eje ecuatorial de 59,4-62,7  $\mu$ m (Beurton 2004).

Biología de la reproducción: Los folículos vacíos persisten durante largo tiempo después de la dehiscencia; las semillas, probablemente eyectadas, quedan envueltas en el endocarpo.

U s o s : El nombre común sugiere que la corteza, que es amarga, tónica y antipirética, se utilizaba como sustituto de la quinina (Beurton 2004).

Nombre común: Quina del país (Gómez 1889: 93).

### 7. Ravenia Vell., Fl. Flumin.: 20. 1829.

Tipo: Ravenia infelix Vell.

= *Lemonia* Lindl. in Edwards's Bot. Reg. 26: 59. 1840. Tipo: *Lemonia* spectabilis Lindl.

Arbustos o árboles inermes. Hojas opuestas, (1-)3-folioladas o en apariencia simples y entonces las de un par  $\pm$  desiguales; foliolos  $\pm$  inequiláteros, glanduloso-punteados. Inflorescencias paucifloras, en cima terminal pareciendo axilar, o unifloras. Flores hermafroditas, 4-5-meras, vistosas, zigomorfas. Sépalos persistentes, glandulosos, de prefloración coclear, biseriados, los 2 exteriores más grandes que los interiores, de forma variada, ± alargados después de la antesis, envolviendo los folículos, luego patentes. los 2-3 interiores basalmente ± concrescentes. Corola tubuloso-infundibuliforme, glandulosa, glabra por fuera, con lobos desiguales de prefloración imbricada. Estambres fértiles 2; filamentos (fértiles y estériles) aplanados; libres pero con márgenes contiguos soldados entre si y al tubo de la corola, formando un pseudotubo; anteras soldadas entre si, subsésiles en el ápice del pseudotubo, estrechamente elipsoideas a triangularovoideas, caedizas, ventralmente con dos hileras de glándulas grandes flanqueando el conectivo; estaminodios 3, con ápices libres subulados, blanquecinos, glandulosos, de tamaño desigual, el medial a veces trilobado. Disco cupuliforme, carnoso o ± sutil, blanquecino, pelúcido, de margen entero, crenado o dentado. Ovario 4-5-mero; carpelos libres, inmersos en el disco; estilos laterales, libres, distalmente soldados pero separables durante la antesis, filiformes; estigma 4-5-lobado; rudimentos seminales 2 por carpelo, superpuestos. Folículos 1-5, libres, bivalvados, (1-)2-spermos; endocarpo elástico, córneo; arilodio triangular, membranáceo. Semillas glanduloso-verrugosas, ricas en aceites.

Distribución: Género de 10-11 especies en Antillas Mayores, América Central (Nicaragua) y del Sur. En Antillas Mayores crecen 5 especies: una endémica en Puerto Rico, 3 endémicas en Cuba, una en Cuba y La Española.

T a x o n o m í a : Ver bajo Cusparia.

P a l i n o l o g í a : Granos de polen 4-6-colporados, oblato-esferoidales o prolato-esferoidales, grandes; exina reticulada (Morton & Kallunki 1993: 304 y datos inéditos de la autora).

Biología de la reproducción: Flores proterandras. Urban (1883: 369-372, 401-402) describe detalladamente el desarrollo de las flores de *Ravenia spectabilis* en plantas cultivadas en el Jardín Botánico de Berlín. Las anteras abren antes que el estilo se alargue y los estigmas se separen, y se caen cuando empieza la fase femenina, lo que impide la

autopolinización. Dispersión autocora por eyección de las semillas por el endocarpo elástico, y luego posiblemente por hormigas (mirmecocoria).

#### Clave para las especies

1	Hojas trifolioladas
1*	Hojas simples 2
2	Flores generalmente 4-meras 7.4. R. shaferi Flores generalmente 5-meras 3
3	Sépalos exteriores de 5-9 mm de ancho, ± anchamente ovados; pedúnculo y pedicelos glabros
3*	Sépalos exteriores de 1-2(-4) mm de ancho, lingüiformes o linear- aovados; pedúnculo y pedicelos pubescentes 7 3 R haracoensis

**7.1. Ravenia spectabilis** (Lindl.) Planch. ex Griseb. in Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 8: 170. 1860 ≡ *Lemonia spectabilis* Lindl. in Edwards's Bot. Reg. 26: 59. 1840. Lectotipo (designado aquí): [ícono] "*Lemonia spectabilis*" en Edwards's Bot. Reg. 26: t. 59. 1840, basado en material vivo importado desde Cuba por Loddiges.

Arbustos. *Ramas* grises o gris pardo. *Pecíolo* de 0,5-2(-2,8) cm de largo, canaliculado, apenas alado, frecuentemente pubescente; *foliolos* (2-)3, cartáceos a coriáceos, de base cuneiforme o gradualmente estrechada en un peciólulo de 0-1 mm de largo. *Cimas* 1-3 floras, de 2-6,5(-9) cm de largo; *pedúnculo* glabro. *Pedicelos* de 2-7(-10) mm de largo, subglabros. *Flores* generalmente 5-meras. *Sépalos* exteriores ovales u ovados, de 1,2-1,5 × 0,8-1 cm, patentes en la antesis, los interiores (2-)3, erectos y ± adpresos al tubo de la corola, ovales a orbiculares, de 0,7-1 × 0,6-1 cm, más pálidos que los exteriores, de margen entero. *Corola* de tubo cilíndrico de 0,8-1,5 cm de largo y lobos ovales de 1-2 × 0,5-1,3 cm, púrpura rojo o rosado intenso. *Pseudotubo* estaminal con pelos simples por dentro; *estaminodios* con ápices libres pilosos, a veces trilobados. *Folículos* fértiles 3-4, más 1 ó 2 abortivos. *Semillas* irregularmente redondeado-tetrahédricas, de 2,5-3,6 × 1,8-2,4 mm, parduscas. – Fl. y Fr.: III-XII.

D i s t r i b u c i ó n : La Española (Haití). Cultivada en Trinidad, Guadalupe y Jamaica. — Mapa 36.

C i t o l o g í a : Número cromosómico: n = 18 (Stace & al. 1993).




Figura 9.1-2. Ravenia spectabilis (Lindl.) Planch. ex Griseb. subsp. spectabilis (adaptados de Lindley 1840); 9.3-10. Ravenia simplicifolia C. Wright ex P. Wilson (especimenes: Ekman 15139, S [3-7, 10], Ekman 9973, S [8-9]; dibujos de Michael Rodewald). 1. Rama con hojas y flores; 2. Flor en fase ♂ (vista frontal), mostrando las 2 anteras y 3 ápices estaminodiales (el medial trilobado); 3. Flor en la fase ♀, con el tubo de la corola y 2 sépalos interiores removidos; 4. Sépalo exterior; 5. Dos sépalos interiores; 6. Disco y gineceo en sección longitudinal; 7. Anteras soldadas secas en vista dorsal y ventral; 8. Fruto en dehiscencia, con los 5 sépalos persistentes, en vista frontal; 9. Las dos semillas superpuestas de un carpelo, en vista lateral; 10. Diagrama floral.

Nombres comunes: Arraiján, lemonia, rosita (Sauvalle 1873, Roig 1974).

## Clave para las subespecies

- Folíolos, en hojas bien desarrolladas, de  $\geq$  (1,5-)2 cm de ancho; flores de  $\geq$  2,5 cm de largo .............. 7.1.1. R. spectabilis subsp. spectabilis

# **7.1.1. Ravenia spectabilis** (Lindl.) Planch. ex Griseb. subsp. **spectabilis** – Fig. 9.1-2 y 10.1-6.

Foliolos de hojas bien desarrolladas de 4-7(-9)  $\times$  (1,5-)2-2,3(-3) cm, usualmente ovales u oblongo-obovados, a veces subrómbicos, usualmente obtusos o apiculados, a veces emarginados, de margen plano a recurvado, rara vez revoluto. *Pedúnculo* de (1,8-)3,2-5(-8)  $\times$  0,3-1 mm. *Flores* de 2,5-3,5 cm de largo.

D i s t r i b u c i ó n : Cultivada en Trinidad y Jamaica. Endémica en Cuba occidental: PR (Arroyo Sagua), Hab (Loma el Grillo), Cuba central: Ci (entre San Blás y Buenos Aires; Arroyo Navarro, Mina Carlota), SS (río Tayabacoa) y Cuba oriental: Ho. Crece en complejo de vegetación de mogotes, bosque siempreverde mesófilo, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina y bosque pluvial montano, parcialmente degradados, entre 200 y 800 msm. – Mapa 36a.



Mapa 36a. Ravenia spectabilis (Lindl.) Planch. ex Griseb. subsp. spectabilis

V a r i a b i l i d a d : La variación de tamaño y forma de los folíolos está documentada por las Fig. 10.1-6. La forma del ápice de los folíolos puede

variar dentro de un mismo ejemplar de colecta. Folíolos rómbicos se conocen hasta ahora solo de Cuba oriental.

F i t o q u í m i c a : Las hojas contienen varios tipos de alcaloides (Willaman & Li 1970, Fish & Waterman 1973).

- **7.1.2. Ravenia spectabilis** subsp. **leonis** (Vict.) Beurton, **comb. & stat. nov.** ≡ *Ravenia leonis* Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 69. 1948. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Santiago de Cuba, "Renté, sur la baie de Santiago de Cuba", 2-VIII-1913, *León & Pierre 3751* (MT!; isotipos: HAC!, MT!).
- = Ravenia clementiana Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 71.
   1948 ≡ Ravenia leonis subsp. clementiana (Vict.) Borhidi & O. Muñiz in Bot. Közlem. 62: 25. 1975. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Santiago de Cuba, "Chivirico, camino del Sonador", IV-1944, Clement[e] & Chrysogone 3394 (MT!; isotipo: HAC!).

Foliolos de hojas bien desarrolladas de  $(1,6-)2,1-6(-7)\times0,5-1,4(-1,6)$  cm, estrechamente lanceolados o estrechamente obovados, rara vez estrechamente oblongo-aovados, obtusos, apiculados o agudos, rara vez emarginados, de margen recurvado a revoluto, rara vez plano. *Pedúnculo* de  $(1-)2,-6,5(-8)\times0,5-1,2$  mm. *Flores* de 1,2-2 cm de largo.

D i s t r i b u c i ó n : La Española (Haití: Massif de la Hotte), cultivada en Guadalupe. Presente en Cuba central: VC (cerca de Santa Clara), Cam, LT (Puerto Padre) y Cuba oriental: Ho, SC, Gu. Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero, complejo de vegetación de mogotes, menos frecuente en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, entre 400 y 600 msm. – Mapa 36b.



Mapa 36b. Ravenia spectabilis subsp. leonis (Vict.) Beurton




Figura 10. Folíolos escaneados de *Ravenia spectabilis* (Lindl.) Planch. ex Griseb. 1-6. *Ravenia spectabilis* subsp. *spectabilis* (especímenes: *León & La Torre 6358*, MT [1], *León 6358*, US [2], *HFC 10680*, JE [3], *HFC 7029*, JE [4], *HFC 57050*, B [5], *HFC 45221*, B [6]).

7-16. Ravenia spectabilis subsp. leonis (Vict.) Beurton (especimenes: Clemente & Chrysogone 3394, MT [7], Chysogone 2856, MT [8], Ekman H.5389, de Haití, S [9], HFC 13411, JE [10], HFC 6573, JE [11], HFC 50716, B [12], HFC 19312, JE [13], HFC 43184, B [14], HFC 38334, B [15], HFC 52800, B [16]).

V a r i a b i l i d a d : La variación de tamaño y forma de los folíolos está documentada por las Fig. 10.7-16. Los folíolos más pequeños se encuentran en ambientes áridos, o a veces sobre serpentina.

Palinología: Granos de polen 6-colporados (Morton & Kallunki 1993).

U s o s : Es utilizada en Cuba oriental como ornamental y medicinal (Roig 1963).

Nombre común: Arraiján (Roig 1963).

- **7.2. Ravenia simplicifolia** C. Wright ex P. Wilson in N. Amer. Fl. 25: 177. 1911. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Road to pinar Mayarí-Abajo", 6-VIII-[1860] *Wright 2179* (GH!).
- ?=Ravenia carabiae Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 64. 1948. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Sierra de Nipe" 5-IV-1940, Carabia 4079 (HAC!; isotipos MT!, NY!).
- Ravenia spectabilis var. simplicifolia C. Wright in Griseb., Cat. Pl. Cub.: 48. 1866, nom. nud.
   Fig. 9.3-10.

Arbusto de ca. 2,5 m de alto. *Hojas* en apariencia simples; *pecíolo* de 0,2-1,8 cm de largo; *lámina* oval, rara vez oblongo-obovada, de (2-)3-6,5(-11,5)  $\times$  1-2,8(-3,2) cm, cartácea a subcoriácea, obtusa y  $\pm$  apiculada, aguda o redondeada, de base estrechada algo asimétrica y margen revoluto. *Cimas* terminales y aparentemente axilares, (1-)2-10-floras, de 3-6,5 cm de largo, glabras. *Pedicelos* de 2-7 mm de largo, glabros o pelosos. *Flores* (4-)5-meras, la terminal (en seco) de ca. 2,8 cm de largo y ca. 3,2 cm de diámetro, las laterales + de 1,2-2,5 cm de largo y 0,7-3 cm de diámetro. *Sépalos* exteriores usualmente  $\pm$  anchamente ovados u orbicular-triangulares, de 0,7-1,2  $\times$  0,5-0,9 cm, redondeados, los interiores triangular-ovados o semiorbiculares, de 0,3-0,4  $\times$  0,25-0,35 cm, de margen a veces hialino, frecuentemente ciliado. *Corola* rosado  $\pm$  intenso, con tubo de 1-1,7 cm de largo y lobos ovales de 1-1,4  $\times$  0,6-0,8 cm. *Estilo* de ca. 5 mm de largo, *estigma* con lobos de ca. 1,7 mm de largo. *Frutos* desconocidos. – Fl.: II, IX-X; Fr.: ?

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Ho (Sierra de Nipe: río Canapú; río Piloto; Piedra Gorda, río Jojo?). Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, y en bosque pluvial montano sobre suelo ígneo ácido, entre 150 y 600 msm. Registrada como "Vulnerable" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 37.

T a x o n o m í a : *Ravenia carabiae* se dijo estar caracterizada por inflorescencias unifloras y flores 4-meras, pero es dudosamente distinta de *Ravenia simplicifolia*, descrita de la misma región (Sierra de Nipe).

N o t a : El holotipo de *Ravenia simplicifolia* tiene dos etiquetas de campo con la escritura de Wright. La primera, cuya localidad se corresponde con el área conocida de la especie, parece correcta; la otra, "Buen Consejo", con fecha 8-VI, quizás esté equivocada, o de lo contrario se refiera a localidad en Cuba oriental que se desconoce, porque *Ravenia simplicifolia* no se encuentra en la provincia de La Habana donde se encuentran localidades nombradas Buen Consejo.



Mapa 37. Ravenia simplicifolia C. Wright ex P. Wilson


**7.3. Ravenia baracoensis** Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Hung. 22: 304. 1977. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "En charrascales de la 'Ermita' al este de Yunque de Baracoa", 15-I-1960, *Alain & Acuña A 7573* (HAC!; isotipo: HAC!).

Arbustos o arbolitos de 5-6 m de alto, con partes jóvenes desde glabras hasta densamente vellosas. *Hojas* en apariencia simples; *pecíolo* de 0,3-1(-1,5) cm de largo; *lámina* oval a obovada, de 4-11  $\times$  2-4,5 cm, cartácea a coriácea, obtusa y a veces apiculada, rara vez emarginada, de base estrechada y margen revoluto. 1-7-floras, de 2-6 cm de largo, densamente vellosas; *pedúnculo* de 0,6-2 cm  $\times$  0,2-0,4 mm. *Pedicelos* de 2-4 mm de largo, densamente vellosos. *Flores* 5-meras. *Sépalos* asimétricos, los exteriores estrechamente lingüiformes o linear-aovados, de (0,5-)0,7-2  $\times$  0,1-0,2(-0,5) cm, pelosos por pelos simples y estrellados en ambas caras, redondeados u obtusos, los interiores 3, triangular-aovados a semiorbiculares, de 3-4  $\times$  2,5-3,5 mm, de margen a veces hialino, frecuentemente ciliado. *Corola* con tubo subrecto de 1,5-2,2 cm de largo y lobos (en seco)

ovales, de 1,2-2,2(-3) cm de largo, roja a rosado intenso. *Pseudotubo* estaminal con pelos simples por dentro; *estaminodios* 3 con ápices libres basalmente pelosos. *Fruto* desconocido. *Semillas* (no vistas) subreniformes, de 4 mm de largo. – Fl.: I-III, VI; Fr.: ?

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Gu (Yunque de Baracoa, entre Tabajó y Bernardo; Arroyo Blanco, Loma los Guineos). Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, bosque pluvial montano y bosque siempreverde mesófilo, entre 150 y 400 msm. Registrada como "Vulnerable" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 38.

T a x o n o m í a : Los sépalos exteriores largos y estrechos que caracterizan *Ravenia baracoensis* también se encuentran en *Ravenia urbanii* Engl. de Puerto Rico.



Mapa 38. Ravenia baracoensis Borhidi & O. Muñiz

- **7.4. Ravenia shaferi** P. Wilson in Bull. Torrey Bot. Club 37: 437. 1910. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Alluvial valley of Río Yamaniguey", 27-II a 1-III-1910, *Shafer 4218* (NY #2168!; isolectotipos: K!, NY #67129 [foto!].
- = Ravenia ekmanii Urb., Symb. Antill. 9: 178. 1924 ≡ Ravenia shaferi var. ekmanii (Urb.) Borhidi & O. Muñiz in Bot. Közlem. 62: 25. 1975. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "In 'charrascales-pinales' inter Taco et Nibujon (ad litor. mar.) prope rivulum", 4-XII-1914, Ekman 3742 (S!; isolectotipos: BM!, NY #67128!).

Arbustos o arbolitos de 4-7 m de alto, con partes jóvenes densamente vellosas. *Hojas* en apariencia simples; *peciolo* de 0-6(-10) × ca. 2 mm; *lámina* ovada, oval u obovada, de 3,5-14 × (1,8-)3-7 cm, cartácea o coriácea, aguda, obtusa, redondeada o rara vez emarginada, de base estrechada o redondeada y margen entero, mayormente revoluto. *Cimas*  $\pm$  terminales,  $\leq$ 

10-floras, de 3-7(-10) cm de largo; *pedúnculo* de 2,2-4 × ca. 1 mm, glabro o velloso. *Pedicelos* de 4-5 mm de largo, glabros o vellosos. *Flores* generalmente 4-meras, de 2,5-3,5 cm de largo. *Sépalos* exteriores ± anchamente ovados, de 1-1,8 × 0,6-1,5 cm, ± gruesamente coriáceos, frecuentemente vellosos cerca de la base, redondeados u obtusos, de base truncada a cordiforme; los interiores ovados, de 0,5-0,8 × 0,3-0,6 cm, redondeados, de margen eroso. *Corola* roja; con tubo de 1,2-1,5 cm de largo, blanquecinotomentoso por dentro, y lobos ovales, de tamaño desigual, de 1,4-2 × 0,8-1 cm. *Estaminodios* con àpices libres de tamaño muy desiguales, el medial mas pequeño. *Disco* cupuliforme o con lobos erectos, oblongo-triangulares. *Carpelos* 4(-5); *estilo* de 1,2-1,5 mm de largo; *estigma* 4(-5)-lobado. *Folículos* 3-4, algo angulosos, de 7-8 × 3-4 mm. *Semillas* irregularmente tetrahédricas, de 3 mm de largo; *hilo* orbicular, excavado. – Fl.: I-VIII, X, XII; Fr.: VI, VIII, XII.

Distribución: Endémica en Cuba oriental: Ho, Gu. Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina y bosque pluvial montano, entre 0 y 500 msm. – Mapa 39.

F i t o q u í m i c a : Batista & al. (1994) han detectado, mediante tamizaje fitoquímico, la presencia de alcaloides y saponinas en los tallos.

Nombre común: Rosita (Roig 1963).



Mapa 39. Ravenia shaferi P. Wilson

**8. Spathelia** L., Amoen. Acad. 5: 377. 1760, nom. & orth. cons. emend. ≡ Spathe P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica: 187. 1756, nom. rej. Tipo: Spathelia sorbifolia L. (Spathelia simplex L., Sp. Pl., ed. 2: 386. 1762, nom. illeg.).

= Sohnreyia K. Krause in Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 147. 1914 ≡ Spathelia subg. Sohnreyia (K. Krause) R. S. Cowan & Brizicky in

- Mem. New York Bot. Gard. 10(2): 64. 1960. Tipo: *Sohnreyia excelsa* K. Krause (*Spathelia excelsa* (K. Krause) R. S. Cowan & Brizicky).
- = *Diomma* Engl. ex Harms in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 19a: 460. 1931 ≡ *Spathelia* subg. *Diomma* (Harms) R. S. Cowan & Brizicky in Mem. New York Bot. Gard. 10(2): 61. 1960. Tipo: *Diomma ulei* Engl. ex Harms (*Spathelia ulei* (Harms) R. S. Cowan & Brizicky).

Árboles o arbolitos polígamos o (en Cuba) andromonoicos, con tronco delgado, no o esparcidamente ramoso, con huellas de las hojas conspicuas. Hojas alternas, agrupadas hacia el ápice del tronco, impari- o paripinnadas; foliolos 20-200, opuestos o alternos, glandular-punteados (a veces solo cerca del margen), de margen crenado a entero. Inflorescencias terminales, en panícula de  $\leq 3$  m de largo, con eje (en Cuba)  $\pm$  rojo. Pedicelos, hasta los fructíferos, delgados. Flores pequeñas, 5-meras. Sépalos libres o basalmente concrescentes, estrechamente lanceolados a ovales, glabros o pubescentes, de prefloración (en Cuba) imbricada. Pétalos libres. lanceolados a obovado-lanceolados, con una glándula apical, de prefloración imbricada. Estambres alternipétalos; filamentos glabros o hírtulos por dentro, sin alas o con alas a veces apicalmente libres bidentadas, los de las flores d'algo más largos; anteras versátiles. Ovario (rudimentario en las flores (3) con ginóforo largo a subnulo, (2-)3(-4)-mero; carpelos concrescentes, lateralmente comprimidos; estigma 2-3-partido; primordios seminales 1(-2) por carpelo, péndulos, apótropos. Fruto sincárpico, seco e indehiscente, elipsoideo a ovoide, (2-)3(-4)-alado; lóculos monospermos; mesocarpo con una cavidad resinífera grande por debajo de cada ala; endocarpo leñoso. Semillas fusiformes, ventralmente aplanadas, dorsalmente convexas; endosperma (en Cuba) carnoso.

Distribución: Norte de América del Sur, Bahamas y Antillas Mayores, con unas 12 especies en 3 subgéneros. Solo *Spathelia* subg. *Spathelia*, con 9 especies en Bahamas, las Antillas Mayores (Jamaica) y Cuba, donde crecen 5 especies endémicas: 4 en Cuba oriental y una en Cuba occidental (Borhidi 1996, Samek 1973).

T a x o n o m í a : Inicialmente incluido en "Terebinthaceae" (Jussieu 1789) y Simaroubaceae (Planchon 1846), el género Spathelia fue asignado por Engler (1896, 1931) a una subfamilia monogenérica de Rutaceae, Spathelioideae Engl. Cowan & Brizicky (1960), en base a un estudio de la morfología del fruto (Stern & Brizicky 1960), incluyeron en Spathelia, con rango de subgéneros, dos géneros previamente controvertidos: Diom-

ma, que Harms (1931: 460) dudosamente asignaba a Simaroubaceae, con dos especies en las Guayanas; y Sohnreyia, monotípico, de Brasil. Marie-Victorin (1948, publicación póstuma) revisó los taxones antillanos del género, fragmentando desmesuradamente algunas especies. En el juicio de la autora, en base solamente al material de herbario es imposible realizar una clasificación definitiva, incluso infraespecífica, de los taxones de Cuba oriental, y el esquema propuesto aquí debe considerarse como preliminar. El material de herbario, debido al gran tamaño de las hojas e inflorescencias, consiste de fragmentos, las flores bien abiertas (que son de tamaño desigual en varias partes de una misma inflorescencia) y los frutos maduros fueron escasamente colectados y no permiten un tratamiento estadístico de las medidas. Estudios de campo, incluso fenológicos, son necesarios para un mejor entendimiento de los taxones del género.

Palinología: Las especies cubanas poseen granos de polen tricolporados y reticulados, patrón típico de *Rutaceae* (datos inéditos de la autora).

B i o l o g í a d e l a r e p r o d u c c i ó n : Los árboles de este género son monocárpicos y necesitan de 8-10 años de desarrollo antes de producir flores, para morir unos 6 meses después luego de fructificar. Las primeras flores de la inflorescencia son todas masculinas, las siguientes en parte hermafroditas (Adams 1972: 383 y observaciones de campo de la autora). No existen datos concretos sobre la polinización y dispersión. Las flores son pequeñas y numerosas, su color rojo, unido al rojo intenso de los ejes y a los filamentos rojos apicalmente y con alas  $\pm$  blancas, es visible desde lejos y apto a atraer polinizantes. Los frutos indehiscentes, también rojos y con mesocarpo rico en resina, quizás sean atractivos para aves.

# Clave para las especies

- **8.1. Spathelia brittonii** P. Wilson in N. Amer. Fl. 25: 208. 1911. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Pinar del Río, "Baños de San Vicente, jogged rocky hill"; 12 a 16-IX-1910, *Britton & al. 7386* (NY #2165!; isolectotipos: K!, NY ##2162-2164! y 2166!]).

Árbol de ca. 10 m de alto. Hojas mayormente imparipinnadas, de 40-70 cm de largo, las jóvenes aterciopelados por pelos estrellados diminutos mezclados con otros simples; foliolos 42-65, ovales, de 7-19 × 1,5-2,8 cm, cartáceos, glándulosos, gradualmente acuminados y con una glándula apical, sésiles a cortamente peciolulados, de base oblicua ± redondeada a cordiforme y margen gruesamente crenado-dentado por lo menos en la mitad proximal, con una hilera de glándulas. Panícula de ≤ 1,5 m de largo y ancho, con ejes aterciopelados. Pedicelos de 3-6 mm de largo (0,8-1 cm en el fruto), tomentuloso-vellosos. Flores de 5-6 mm de largo. Sépalos de 1,2-1,8 mm de largo, verdoso amarillo, tomentuloso-vellosos, con una gruesa glándula central por dentro. Pétalos de 5,5-6 × 2,5-3,5 mm, carmesí a blancuzcos. Estambres de ca. 2,8 mm de largo; filamentos en la mitad proximal con alas apicalmente libres, los dientes densa y largamente pubescentes por fuera. Disco de 0,5 mm de largo. Ovario de ca. 4 mm de largo, sésil (pero el rudimentario de las flores de con un ginóforo largo). Fruto (inmaduro) de ca. 1,5 × 1 cm, obovoideo, emarginado. – Fl.: VIII-IX; Fr.: VIII-IX.

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba occidental: PR (Sierra de Viñales; Sierra de Sumidero; Sierra de Francisco). Es uno de los árboles más característico y vistosos en el complejo de vegetación de mogotes, ca. 600 msm. – Mapa 40.

Fitoquímica: Mediante tamizaje fitoquímico de las hojas se ha detectado la presencia de saponinas y alcaloides (Alemán & al. 1972, Sánchez & al. 1985).

Nombres comunes: Bonita de Sierra, protocán (Alain 1969, León & Alain 1951, Roig 1963).



Mapa 40. Spathelia brittonii P. Wilson

- **8.2. Spathelia cubensis** P. Wilson in Bull. Torrey Bot. Club 37: 437. 1910. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Sierra Nipe, along trail from Piedra Gorda to Woodfred", 8-XII-1909, *Shafer 3091* (NY #2157!; isolectotipos?: K!, NY ##2155-2156!).
- = Spathelia lobulata Urb., Symb. Antill. 9: 181. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Santiago de Cuba, "Prope Bayate in cacumine montis calcarei Picote", alt. 550 msm, 15-III-1918, Ekman 9157 (S!; isolectotipo: NY #67163 [fragm.!]).
- Spathelia stipitata Urb., Symb. Antill. 9: 180. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Sierra de Nipe, in charrascales ad Sojo trail", alt. ca. 700 msm, fl, 16-X-1919, Ekman 9967 (S!; isolectotipo: NY #67167!).

Arbolito de 1-3 m de alto, con partes jóvenes aterciopeladas por pelos estrellados rojizos mezclados con otros simples. *Tronco* de ca. 2 cm de diámetro. *Hojas* de 20-35 cm de largo; *pecíolo* de 2-11 cm de largo; *foliolos* 24-57, alternos o  $\pm$  opuestos,  $\pm$  anchamente lineares, de (2-)3-7(-10,5) × 0,3-1(-1,2) cm, cartáceos a subcoriáceos, agudos, apiculado-obtusos o redondeados, frecuentemente con glándula apical, con peciólulos de 0(-1) mm de largo, de base  $\pm$  asimétrica, cordiforme, redondeada u obtusa, y margen revoluto o recurvado, entero, raramente crenulado-dentado. *Panícula* de 0,6-1,3 m de largo, con ejes diminutamente estrellado-pubescentes, glabrescentes. *Pedicelos* de 1-10 mm de largo (0,4-1,2 cm en el

fruto), estrellado-vellosos a glabros. *Flores* de 3-4 mm de largo, rojo escarlata. *Sépalos* ovales, de 3,1  $\times$  1,8 mm, glanduloso-mucronados, glabros. *Pétalos* de 3-4,4 mm de largo. *Filamentos* estaminales de 1,5-2,5 mm de largo, glabros, con alas de 0,9-1 mm de largo cortamente libres en el ápice. *Disco* corto. *Ovario* sésil (también el rudimentario de las flores 3). *Fruto* de ca. 1,5  $\times$  0,9 cm, emarginado, con alas de ca. 2 mm de ancho, casi tan grandes como el lóculo fértil. – Fl.: II, VII, IX-X, XII; Fr.: II, IX.

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Ho (Sierra de Nipe: La Mensura; Mina Woodfred; Cayo Rey), SC (El Picote; Loma de la Estrella; entre El Oro y Los Güiros). Crece en matorral xeromoro subespinoso sobre serpentina, bosque de pinos y raramente en complejo de vegetación de mogotes y bosque siempreverde mesófilo, entre 300 y 1000 msm. Registrada como "En Peligro" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 41.



Mapa 41. Spathelia cubensis P. Wilson

V a r i a b i l i d a d : Se observa una variación notable en las características de los folíolos (Fig. 12.1-6); una forma particular, que fue descrita como *Spathelia stipitata*, muestra peciólulos de ca. 1 mm de largo (Fig. 12.6), mientras que normalmente los folíolos son ± sésiles; en las plantas que crecen sobre caliza en el mogote El Picote, descritas como *Spathelia lobulata*, los folíolos son crenulado-dentados en su mitad distal, no enteros como es lo usual (Fig. 12.5).

Fitoquímico se ha detectado la presencia de alcaloides y saponinas en las hojas (Alemán & al. 1972).

**8.3. Spathelia splendens** Urb., Symb. Antill. 9: 181. 1924. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "prope fluvim Maraví in pinetis", 26-XII-1914, *Ekman 4057* (S!; isolectotipos: NY ##67165-67166!)

— Fig. 11.1-4.




Figura 11.1-4. Spathelia splendens Urb. (espécimen Clemente & Alain 4043, US); 7.5-7. Spathelia vernicosa Planch. (espécimen HFC 57370, B) (dibujos de Michael Rodewald).

1. Hábito de una planta en flor; 2-3. Parte media de una hoja, con detalle, haz y envés; 4-5. Partes de una inflorescencia, con botones, flores y frutos; 6. Flor hermafrodita joven, con un sépalo removido; 7. Gineceo y ginóforo de 6; 8. Diagramas de flores ♂ y hermafroditas de *Spathelia*.




Figura 12. Folíolos escaneados de *Spathelia*. 1-6. *Spathelia cubensis* P. Wilson (especímenes: *HFC 56730*, B [1], *Shafer 3091*, NY [2],

HFC 50322, B [3], Ekman 15612, NY [4], Ekman 9157, S [5], Ekman 9967, S [6]). 7-13. Spathelia vernicosa Planch. (especímenes: HFC 42890, B [7], León & al. 2000, MT [8], HFC 42508, B [9], Ekman 15835, S [10], HFC 7255, JE [11], HFC 58642, B [12], HFC 49478, B [13]).

14-18. *Spathelia wrightii* Vict. (especímenes: *Ekman 3521*, S [14], *Clement(e) 3618*, MT [15], *HFC 17143*, JE [16], *HFC 7634*, JE [17], *HFC 20146*, JE [18]).

Arbolito. *Troncos* jóvenes tuberculados, con entrenudos de 3-5 mm de largo. *Hojas* de 15-32 cm de largo, usualmente con una yema terminal; *pecíolo* de 1,5-5 cm de largo, raquis subterete, ligeramente canaliculado; *folíolos* 140-200, distantes ≤ 6 mm entre si, lineares, de 8-15 × 1-2 mm, coriáceos, glabros y brillantes por la haz, pardo-pelosos por el envés, obtusos o redondeados, de base sésil truncada o cordiforme y margen revoluto; nervio medio ± impreso en la haz, prominente en el envés, los laterales obsoletos. *Panícula* de ca. 35 cm de largo, con ramas ascendentes. *Pedicelos* de ca. 1,5 mm de largo, furfuráceos. *Flores* (solo ♂, en botón) de 2,5-3 mm de largo. *Sépalos* de ca. 2,5 × 1,2 mm, ovales, furfuráceos por fuera, algunos con una glándula apical, de margen algo eroso. *Pétalos* ovales, de ca. 3 mm de largo. *Filamentos* de ca. 1,8 mm de largo, con alas glabras cortamente libres apicalmente; *anteras* de ca. 1,5 mm de largo. *Frutos* desconocidos. − Fl.: VII; Fr. ?

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Ho (Playa la Vaca; Mina Delta; Yamanigüey; Cerro de Miraflores), Gu (río Maraví; río Navas). Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, bosque de pinos y bosque de galería degradado, entre 0 y 700 msm. Registrada como "Vulnerable" (Berazaín & al. 2005). – Mapa 42.

F i t o q u í m i c a : Mediante tamizaje fitoquímico se ha detectado la presencia de alcaloides en las hojas y de saponinas en hojas y tallos (Batista & al. 1994).



Mapa 42. Spathelia splendens Urb.

**8.4. Spathelia vernicosa** Planch. in London J. Bot. 5: 581. 1846 ≡ *Spathe vernicosa* (Planch.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1-2: 104. 1891. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] "Cuba, prov. Santiago de Cuba, "Sagua, Santa Catalina, fl. amaranthus", VI-1844 [fide GENT], *Linden 1943* (K #H/0314/12/14!; isolectotipos: GENT!, K #H/0314/11/14!).

- Spathelia pinetorum Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 38.
   1948. Lectotipo (designado aquí [ver Nota]): [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Sierra de Nipe, in charrascales", 21-IV-1919, Ekman 9544 (S!; isolectotipo: F!, US!).
- = Spathelia pinetorum var. megaphylla Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 44. 1948 ≡ Spathelia pinetorum subsp. megaphylla (Vict.) Borhidi in Bot. Közlem. 58: 176. 1971. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Holguín, "Sierra de Moa, Mine Delta, au sommet d'une montagne de serpentine, a l'est du río Cayoguan", 27 a 31-V-1943, Marie-Victorin & Clement[e] 21751 (MT!; isotipos: MT!).
- = *Spathelia subintegra* Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 34. 1948. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Loma Yateras-La Laja", 10-V-[1860] (err.: "1865"), *Wright 2191* (GH #32778!).

- Fig. 11.5-7 y 12.7-13.

Arbolito de 2-5 m de alto, con partes jóvenes furfúraceas luego glabrescente. Tronco de (0,4-)1-3 cm de diámetro. Hojas de (8-)30-60 cm de largo, con yema terminal o folíolo apical reducido; pecíolo de (1,5-)2-6 cm de largo; foliolos (40-)60-92, alternos u opuestos, ovales, obovado-lanceolados u oblongo-obovados, de  $(1,1-)1,5-3,3(-5) \times (0,3-)0,4-1,1(-1,8)$  cm, cartáceos, redondeados u obtusos, de base sésil o subsésil, redondeada a truncada, y margen recurvado, entero o  $\pm$  crenulado-dentado sobre todo distalmente. Panícula usualmente más larga que las hojas, con ramas ascendentes. Pedicelos de 3-6 mm de largo (0,4-1 cm en el fruto), glabros. Flores de ca. 5 mm de largo. Sépalos libres, lineares, de 2,5-4 × 0,8-1,5 mm, a veces con glándula apical, de base truncada y margen glanduloso a veces dentado. Pétalos oblongo-lanceolados, de 2,5-5 × 1-2 mm, con glándula apical, de base truncada y margen glanduloso. Estambres de  $\leq$  4 de largo (en las flores hermafroditas ca. 2,5 mm); filamentos con alas largas y densamente blanquecino-pubescentes por dentro (en las flores hermafroditas glabras), no libres apicalmente. Ovario de ca. 3 mm de largo, con ginóforo corto y grueso. Fruto 3(-4)-alado, de 0,7-1,5(-2) × 0,4-1(-1,1) cm, redondeado a subemarginado. – Fl.: II-VIII; Fr.: II, IV-VIII, XII.

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Ho, SC, Gu. Crece en bosque pluvial montano sobre suelos ferríticos púrpura, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, bosque de pinos y bosque siempreverde microfilo, en ocasiones en áreas degradadas, entre 100 y 850 msm. — Mapa 43.

V a r i a b i l i d a d : Se observa una gran variabilidad en la forma de los folíolos (Fig. 12.7-13), pero esa variación no está claramente correlacio-

nada con la distribución geográfica o preferencia edáfica de las plantas. Algunas de las formas observadas fueron descritas y bautizadas (p. ej. *Spathelia pinetorum, Spathelia subintegra*), otras no.

F i t o q u í m i c a : Mediante tamizaje fitoquímico se ha detectado la presencia de alcaloides (Batista & al. 1994, Sánchez & al. 1985) y saponinas en las hojas (Alemán & al. 1972).

N o t a : Bajo *Spathelia pinetorum*, Marie-Victorin (1948: 43) se equivocó en su designación del ejemplar tipo. Cita como tipo *Ekman 5985* de "Sierra de Nipe, ad marginem charrascal" (S), pero con la fecha de recolección (IV-1919) de *Ekman 9544*; y bajo otros ejemplares enumera *Ekman 9544*, de la misma localidad, pero con la fecha 9-VI-1915 que pertenece a *Ekman 5985*. Consideramos por lo tanto ambas muestras como sintipos.



Mapa 43. Spathelia vernicosa Planch.

- **8.5. Spathelia wrightii** Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 31. 1948. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Cuchillas de Baracoa", 14-V-[1861], *Wright 2191* (GH!; ¿isotipos?: BM!, S!).
- = Spathelia leonis Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63: 36. 1948. Lectotipo (designado aquí): [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Jauco Arriba, peladeros and charrascos, thickets on silicious ground" 17-VII a 4-VIII-1924, León 11796 (MT!; isolectotipos: MT!, NY ##2153-2154!).
- Spathelia yumuriensis Vict. in Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal. 63: 33.
   1948. Holotipo: [espécimen] Cuba, prov. Guantánamo, "Valle de Yumurí", VI-1940, Matos 17924 (MT!).

Arbolito de 2-4(-5) m de alto. *Tronco* de 3-5 cm de diámetro. *Hojas* de 15-60 cm de largo, pari- o imparipinnadas, con una yema apical o folíolo

terminal reducido; pecíolo - de 4-7 cm de largo - y raquis pubérulos o glabros, glandulosos; foliolos 30-36, alternos a subopuestos, ovales, oblongo-aovados u obovado-lanceolados, de 0,9-3,5(-7) × 0,5-1(-2) cm. cartáceos, pubérulos por la haz en el nervio medio o glabros, obtusos o truncados, de base asimétrica, estrechada en peciólulo corto, y margen recurvado, crenulado-dentado en los <sup>2</sup>/<sub>3</sub> distales, raramente entero. Panícula poco ramosa, pubescente o glabra. Pedicelos de 3-6 mm de largo (0,3-1 cm en el fruto), glabros. Flores de ca. 5 mm de largo. Sépalos oblongolanceolados, de 4-6 × 1-2 mm, glanduloso-apiculados. Pétalos de 4-7 × 1.8-3 mm, redondeados, con glándula apical. Estambres de 3-6 mm de largo (en las flores hermafroditas ca. 2.7 mm); filamentos totalmente alados, larga y densamente blanquecino-pubescentes por dentro (en las flores hermafroditas con alas apicalmente libres y solo algunos fascículos de pelos); anteras de ca. 2 mm de largo. Ovario de ca. 3 mm de largo; ginóforo corto. Fruto 3-alado, de 0,9-1,1(-1,5) × 0,6-1(-1,1) cm, redondeado o subemarginado. – Fl.: I-II, V-VIII, XI; Fr.: XI-II, IV-VIII.

D i s t r i b u c i ó n : Endémica en Cuba oriental: Ho, Gu. Crece en matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, bosque de pinos, bosque pluvial montano sobre suelos ferríticos púrpura y bosque de galería degradado, entre 200 y 900 msm. – Mapa 44.



Mapa 44. Spathelia wrightii Vict.

V a r i a b i l i d a d : Se observa una gran variabilidad especialmente en el tamaño de los folíolos (Fig. 12.14-18), los más grandes en la Sierra de Moa, los más pequeños en Peladeros de Jauco, Baracoa), pero siempre son cortamente peciolulados y estrechados hacia la base asimétrica.

Fenología: Según Marie-Victorin (1948: 32), cuando *Spathelia* wrightii se encuentra simpátrica con *Spathelia vernicosa* (su *Spathelia* 

pinetorum), como en las Cuchillas de Moa y de Baracoa, las dos suelen florecer en tiempos distintos, la segunda algo más tarde, cuando *Spathelia wrightii* ya está fructificando. El material de herbario disponible no parecen corroborar esa información, que se tendría que verificar en el campo.

F i t o q u í m i c a : Se ha detectado, por medio de tamizaje fitoquímico, la presencia de saponinas en las hojas (Sánchez & al. 1985), tallos y frutos (Fernández & al. 1992).

Nombre común: Flor de peladero (Roig 1963).

- **9. Glycosmis** Corrêa in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 6: 384. 1805, nom. cons. Tipo: *Glycosmis arborea* (Roxb.) DC. (*Limonia arborea* Roxb.).
- = Panel Adans., Fam. Pl. 2: 447, 587. 1763. nom. rej. Tipo: Limonia winterlia Steud.

Arbustos o árboles inermes, aromáticos o no, densamente ferrugíneo-farináceo-tomentosos en los brotes jóvenes. *Hojas* alternas, compuestas; peciólulos usualmente articulados; folíolos 1-5(-15), con lámina glandulosopunteada, cartácea a coriácea. *Inflorescencias* axilares o pseudoterminales, en racimo o panícula. *Flores* pequeñas, hermafroditas, usualmente 4-5-meras, fragantes. *Sépalos* triangulares a semiorbiculares, libres o basalmente concrescentes, de prefloración imbricada. *Pétalos* libres, de prefloración imbricada. *Estambres* 2× el número de los pétalos; *filamentos* libres, de base filiforme, dilatados hacia arriba y estrechándose abruptamente en una punta acuminada; *anteras* ovoides con base cordiforme, a menudo con una glándula apical. *Disco* anular, lobado. *Ovario* sincárpico, 2-5-locular; *primordios seminales* 1(-3) por lóculo; *estilo* usualmente robusto y corto; *estigma* ancho, pulviniforme, persistente. *Fruto* seco o carnoso, en baya globosa, elipsoidea. *Semillas* elipsoideas a subglobosas; *testa* membranácea; cotilédones carnosos, verdes.

D i s t r i b u c i ó n : Género de ca. 40 especies del sur y sureste de Asia, Malasia y Australasia; una cultivada y aparentemente naturalizada en Cuba.

T a x o n o m í a : Género imperfectamente conocido (Brizicky 1962, Stone 1985a-b; 1994). Por sus compuestos químicos especializados y en base a los datos moleculares aparece filogenéticamente aislado, lejano de los géneros supuestamente relacionados, *Clausena y Murraya* (Samuel & al. 2001).



Figura 13. *Glycosmis parviflora* (Sims) Little (especímenes: *Pollard & al. 195*, NY [1 p.p.], *Marie-Victorin 21361*, MT [1 p.p. y 2], *PFC 47052*, B [3]; dibujos de Alexander Ehler [1-2] y Michael Rodewald [3]).

1. Rama con flores y frutos; 2. Ápice de una inflorescencia, con botones florales, frutos jóvenes y submaduros; 3. Flor con sépalos, disco y gineceo (pétalos ya caídos).

Palinología: *Glycosmis pentaphylla* posee granos de polen de tamaño medio, 3-colporados, subprolados (Grant & al. 2000).

C i t o l o g í a : Número cromosómico: n = 9 (Stace & al. 1993).

- **9.1. Glycosmis parviflora** (Sims) Little in Phytologia 2: 463.  $1948 \equiv Li$ *monia parviflora* Sims in Bot. Mag.: ad t. 2416. 1823. Lectotipo (Stone 1985a: 15): [ícono] en Bot. Mag.: t. 2416. 1823.
- = *Limonia citrifolia* Willd., Enum. Pl.: 448. 1809 (non *Limonia citrifolia* Salisb. 1796) ≡ *Glycosmis citrifolia* Lindl. in Trans. Hort. Soc. London 6: 72. 1826 ≡ *Glycosmis pentaphylla* var. *citrifolia* (Lindl.) Backh. f. in Blumea 6: 366. 1950. Holotipo: [espécimen] planta cultivada en Berlín, *Willdenow* (B-W #8116/1!).
- = *Glycosmis heterophylla* A. Rich. in Sagra, Hist. Phys. Cuba, Pl. Vasc.: 231. 1841. Tipo no designado.
- Glycosmis americana Sagot ex Oliver in J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5, Suppl. 2: 37. 1861. Descrito de la Guayana Francesa; tipo no designado.
- = *Amyris axilliflora* Griseb., Cat. Pl. Cub.: 66. 1866. Holotipo: [espécimen] Cuba oriental, *Wright 2283* (GOET!).
- "Glycosmis pentaphylla" sensu Esquivel & al. (1992) (non Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. 1824).


Arbusto o árbol de  $\leq$  3 m de alto. *Hojas* alternas, unifolioladas o mayormente pinnadas; folíolos estrechamente ovales u oblongo-elípticos, rara vez lanceolados u obovado-lanceolados, de 4-13  $\times$  2-5(-7) cm, cartáceos, acuminados, de base estrechada y margen entero o diminutamente crenulado-aserrado. *Inflorescencias* en panícula larga y estrecha. *Flores* subsésiles, 5-meras. *Sépalos* basalmente  $\pm$  concrescentes, de margen ciliado, glanduloso. *Pétalos* ovales, de 3,5-4 mm de largo, blancos. *Disco* de 0,4-1 mm de largo. *Ovario* 5-locular, de 0,5-1 mm de largo, glabro; *estigma* 5-lobado. *Fruto* subgloboso, de 0,7-1(-1,3) cm de diámetro, blanco, amarillo o carmesí, aromático. – Fl.: I-V, VII, XI-XII; Fr.: II-IV, VII-IX, XII.

D i s t r i b u c i ó n : Oriunda del sur de China e Indochina. Introducida en la horticultura en Gran Bretaña, hoy cultivada en jardines de las regiones tropicales del mundo y naturalizada en Estados Unidos de América (Florida), Antillas Mayores y Guadalupe. Cultivada y en ocasiones aparentemente naturalizada en Cuba oriental: Gr (Minas de Bueycito), SC, Gu. Crece en bosque siempreverde y semideciduo mesófilos, entre 0 y

600 msm. Con distribución quizás más amplia en Cuba pero escasamente representada en los herbarios. – Mapa 45.

T a x o n o m í a : Especie muy cercana a *Glycosmis pentaphylla* (Retz.) DC. y a menudo unida con ella (ver Stone 1985a, 1994: 118).

N o m b r e s c o m u n e s : Limoncillo, limoncito de China, naranjilla, naranjita de cristal, naranjita de la Vírgen (León & Alain 1951, Roig 1963, Rodríguez & Sánchez 2001).



Mapa 45. Glycosmis parviflora (Sims) Little

**10.** Murraya J. Koenig ex L., Mant. Pl.: 554, 563. 1771, nom. et orth. cons.

Tipo: Murraya exotica L.

- = Chalcas L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 293. 1767; Mant. Pl.: 68. 1767, nom. nondum rej. ≡ Camunium Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1-2: 99. 1891, nom. illeg. (non Camunium Adans. 1763, nom. illeg.). Tipo: Chalcas paniculata L.
- = Bergera J. Koenig ex L., Mant. Pl. 2: 555, 563. 1771, nom. rej.. Tipo: Bergera koenigii L.

Arbustos o arbolitos inermes. *Hojas* alternas, compuestas; *folíolos* alternos a subopuestos. *Inflorescencias* axilares o terminales, en panícula o racimo, o unifloras. *Flores* (4-)5-meras. *Sépalos* basalmente concrescentes. *Pétalos* libres, lanceolados, espatulados o lineares. *Estambres* 2× el número de los pétalos, libres, los episépalos más largos que los alternisépalos. *Ovario* sincárpico, 2-5-locular; primordios seminales (1-)2 por lóculo, superpuestos o casi colaterales; *estilo* alargado, tardíamente caedizo; *estigma* capitado. *Fruto* en pequeña baya ovoide o subglobosa, mono- a polispermo. *Semilla* con testa sutil; *cotilédones* plano-convexos.

Distribución: Género de unas 15 especies; del sureste de Asia y Oceanía; una cultivada y aparentemente naturalizada en Cuba.

T a x o n o m í a : Estudios cariológicos, fitoquímicos y moleculares (Samuel & al. 2001) sugieren que en su delimitación actual, que incluye *Bergera*, este género es heterogéneo.




Figura 14. *Murraya paniculata* (L.) Jack (espécimen *Acevedo & al. 4009*, NY, de St. John, Islas Vírgenes, [1, 3]; planta cultivada, *IPEN No. XX-0-B-0541874*, B [2]; dibujos de Michael Rodewald).

1. Ramas con frutos jóvenes; 2. Flor, con un pétalo removido; 3. Fruto joven.

I m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a : Algunas especies se cultivan como ornamentales en las regiones tropicales.

- **10.1.** Murraya paniculata (L.) Jack in Malayan Misc. 1: 31. 1820 ≡ *Chalcas paniculata* L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 293. 1767; Mant. Pl.: 68. 1767. Lectotipo (Nair in Jarvis & al. 1993: 32): [ícono] "*Camunium*" en Rumphius, Herb. Amboin. 5: t. 17. 1747.
- = *Murraya exotica* L., Mant. Pl.: 563. 1771 ≡ *Camunium exoticum* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1-2: 99. 1891. Neotipo (Nair in Jarvis & al. 1993: 68): Herb. Linn. #539.1 (LINN [foto!]). Fig. 14.

Arbustos de 2-3 m de alto. Ramas jóvenes pubérulas. Hojas siempreverdes, alternas, imparipinnadas o paripinnadas, de \le 9 cm de largo, aromáticas; pecíolo de 4-12 mm de largo; foliolos (1-)3-7(-9), ± alternos, obovados a ovales, de 1-4(-5) × 0,7-1,8(-2,2) cm, coriáceos o cartáceos, pulverulentos a glabros, pelúcido-glandulosos, obtusos, redondeados o abruptamente acuminados, de base cuneiforme peciolulada (peciólulo de 1-3 mm de largo) y margen entero a crenado, revoluto. Inflorescencias axilares y terminales, en panícula corimbiforme, 2-8- o pluriflora, de 5-6 cm de largo, eje delgado, pulverulento. Flores fragantes, de 1-3 cm de largo. Cáliz con lobos triangulares, de 5-7 mm de largo, pulverulentos. Pétalos 5(-6), oblongo-espatulados, de 1,3-2,1 cm de largo, blancos, glanduloso-punteados, de ápice recurvo. Estambres episépalos de 8-11 mm de largo, ± alcanzando el pistilo, los alternisépalos de ca. 6 mm de largo; filamentos subulados, blancos; anteras subglobosas, con glándula apical. Disco prominente, carnoso. Ovario usualmente 2-locular, de 1,5-1,8 mm de largo, glabro, glanduloso; estilo delgado, cilíndrico, de 7-10 mm de largo; estigma aplanado-capitado. Baya 1(-2)-sperma, ovoide a elipsoidea, de ca. 1,2 cm de largo, glanduloso-verrugosa, rojo o anaranjado brillante cuando madura, subacuminada; pulpa acuosa, amarga. Semillas de 6-8 mm de largo y ancho, densamente pubescentes. - Fl.: XII; Fr.: I-III.

D i s t r i b u c i ó n : Oriunda de Indomalasia, Australia tropical y Nueva Caledonia, domesticada probablemente en China. Cultivada a través de los trópicos. Cultivada y en ocasiones aparentemente naturalizada en Cuba occidental: PR (San Diego de los Baños), Mat (Hato Nuevo; cerca de Playa Buey Vaca; valle del río San Juan), Cuba central: VC (Manacas) y Cuba oriental: Gu (Imías: alrededores del río Jojo). Crece en bosque de galería y vegetación secundaria. Con distribución quizás más amplia en Cuba pero escasamente representada en los herbarios. — Mapa 46.

T a x o n o m í a : Mabberley (1998) reconoce una sola especie que abarca *Murraya paniculata* s. str. (las plantas silvestres) y "*Murraya exotica*" (las variedades cultígenas; ver discusión en Stone 1985b).

P a l i n o l o g í a : Granos de polen de tamaño medio, 3-colporado, prolado-esferoidal (Grant & al. 2000).

C i t o l o g í a : Número cromosómico: n = 9 (Stace & al. 1993).

F i t o q u í m i c a : Se ha detectado, mediante tamizaje fitoquímico, la presencia de alcaloides en hojas y tallos (Fernández & al. 1995). Las hojas poseen un aceite esencial que contiene beta-cariofileno como compuesto mayoritario (Pino & al. 2006).

U s o s : Cultivada en cercas vivas por su follaje atractivo, sus flores fragantes y bayas coloreadas; se utiliza también para coronas (León & Alain 1951) y en las religiones afro-cubanas (L. González-Géigel, com. pers.).

Nombres comunes: Boj de Persia, jazmín de Persia, jazmín francés, mirto, mirto criollo, murallera, muraya (León & Alain 1951, Roig 1963).



Mapa 46. Murraya paniculata (L.) Jack

## 11. Triphasia Lour., Fl. Cochinch. 1: 152. 1790.

Tipo: *Triphasia aurantiola* Lour., *nom. illeg.* (*Limonia trifolia* Burm. f., *Triphasia trifolia* (Burm. f.) P. Wilson).

Arbustos espinosos. *Ramas* ligeramente zigzagueantes. *Hojas* alternas, usualmente 3-folioladas, con 1-2 espinas axilares rectas y subuladas; *peciolo* corto, no articulado apicalmente; *foliolos* coriáceos, glanduloso-

punteados. *Inflorescencias* unifloras o en fascículo axilar paucifloro. *Pedicelos* cortos, diminutamente 2-bracteolados. *Flores* hermafroditas, 3(-4)-meras. *Cáliz* cupuliforme, 3(-4)-lobulado, persistente. *Pétalos* 3(-4), libres, de prefloración imbricada. *Estambres* 6-8, biseriados; *filamentos* subulados, ensanchados hacia la base; *anteras* estrechamente elipsoideas. *Disco* carnoso. *Ovario* sincárpico, 3(-4)-mero; *primordio seminal* 1 por lóculo; *estilo* usualmente largo, delgado, deciduo; *estigma* ± capitado. *Frutos* en pequeña baya carnosa; *exocarpo* coriáceo, punteado. *Semillas* 1-3.

Distribución: Género de 3 especies, probablemente oriundo de Asia; una cultivada y aparentemente naturalizada en Cuba.

**11.1. Triphasia trifolia** (Burm. f.) P. Wilson in Torreya 9: 33. 1909 ≡ *Limonia trifolia* Burm. f., Fl. Indica: 103. 1768 ≡ *Limonia trifoliata* L. Mant. Pl.: 237. 1771, *nom. illeg.* ≡ *Triphasia trifoliata* DC. Prodr. 1: 536. 1824, *nom. illeg.* Lectotipo (designado aquí): [ícono] "*Limonia trifolia*" en Burman, Fl. Indica: t. 35, f. 1. 1768. − Fig. 15.

Arbusto de 1-2(-3) m de alto. Ramas jóvenes subcilíndricas, pubérulas, con espinas de  $\leq$  1,8 cm de largo. Hojas (1-)3-folioladas; peciolo de 2-4 mm de largo;  $foliolos \pm$  coriáceos, glabros o pubérulos, obtusos y emarginados, con peciólulos 1-2 mm de largo, de margen crenulado o crenado; el terminal lanceolado, de 2,5-5  $\times$  1,2-3,5 cm, de base cuneiforme, los laterales ovales, más pequeños, de base obtusa. Flores 3(-4)-meras, muy fragantes. Cáliz de ca. 4 mm de largo, con lobos redondeado-triangulares, pubescentes. Pétalos obovados, de 8-9 mm de largo, blancos, de ápice recurvo y base cuneiforme. Estambres 6. Ovario elipsoideo, glabro; estigma carnoso, blanco. estigma carnoso, carnoso, carnoso carnoso, carnoso carnoso carnoso carnoso carnoso car

D i s t r i b u c i ó n : Silvestre en India. Cultivada y naturalizada en el sur de los Estados Unidos de América (Florida hasta Texas) y Antillas Mayores. Cultivada y en ocasiones aparentemente naturalizada en Cuba occidental: PR (Finca Toscano) y Cuba oriental: SC (alrededores de la ciudad), Gu (Baracoa: Dos Bocas). Crece en matorral xeromorfo costero y subcostero y bosque semideciduo microfilo, entre 0 y 10 msm. Con distribución quizás más amplia en Cuba pero escasamente representada en los herbarios. – Mapa 47.




Figura 15. *Triphasia trifolia* (Burm. f.) P. Wilson (espécimen *Fosberg 54100*, US, de Sta. Cruz, Islas Vírgenes; dibujos de Michael Rodewald).

1. Ramita con flores y frutos jóvenes; 2. Flor; 3. Fruto.

P a l i n o l o g í a : Granos de polen grandes, 3-colporados, subprolados o prolados (Grant & al. 2000).

Fitoquímica: En las hojas se ha determinado la presencia de alcaloides (Magadán & al. 1983), también poseen un aceite esencial con germacreno B como compuesto mayoritario (Pino & al. 2006).

U s o s : Plantada como ornamental por sus flores fragantes y frutos dulces, apetitosos.

N o m b r e s c o m u n e s : Limoncillo, limoncillo colorado, limoncillo dulce, limoncito (León & Alain 1951, Esquivel & al. 1992).



Mapa 47. Triphasia trifolia (Burm. f.) P. Wilson

- **12.** Citrus L., Sp. Pl.: 782. 1753. Tipo: Citrus medica L.
- = *Poncirus* Raf., Sylva Tellur.: 143. 1838. Tipo: *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. (*Citrus trifoliata* L.).
- = *Papeda* Hassk. in Flora 25, Beibl. 2: 42. 1842 ≡ *Citrus* subg. *Papeda* (Hassk.) Swingle in Webber & Batchelor, Citrus Industry 1: 432. 1943. Tipo: *Papeda rumphii* Hassk.
- Eremocitrus Swingle in J. Agric. Res. 2: 86. 1914 ≡ Citrus subg. Eremocitrus (Swingle) Burkill in Gard. Bull. Straits Settlem. 5: 218. 1931.
   Tipo: Eremocitrus glauca (Lindl.) Swingle (Triphasia glauca Lindl., Citrus glauca (Lindl.) Burkill).
- Fortunella Swingle in J. Wash. Acad. Sci. 5: 167. 1915 ≡ Citrus subg. Fortunella (Swingle) Burkill in Gard. Bull. Straits Settlem. 5: 218. 1931. Tipo: Fortunella margarita (Lour.) Swingle (Citrus margarita Lour.).

- Microcitrus Swingle in J. Wash. Acad. Sci. 5: 570. 1915 ≡ Citrus subg. Microcitrus (Swingle) Burkill in Gard. Bull. Straits Settlem. 5: 219. 1931. Tipo: Microcitrus australasica (F. Muell.) Swingle (Citrus australasica F. Muell.).
- = *Clymenia* Swingle in J. Arnold Arbor. 20: 251. 1939. Tipo: *Clymenia polyandra* (Tanaka) Swingle (*Citrus polyandra* Tanaka).

Arbustos o árboles. Ramas usualmente con espinas solitarias, o las más viejas inermes. Hojas alternas, simples o 1-folioladas; peciolo alado o a veces solo marginado, usualmente articulado apicalmente; lámina cartácea o coriácea, glabra o cortamente pelosas en el envés, de margen entero, aserrado o crenulado. Inflorescencias axilares, unifloras o en racimo corimbiforme. Flores hermafroditas o 3, actinomorfas, grandes, fragantes. Cáliz cupuliforme, 4-5-dentado, verde. Pétalos 4-5(-8), libres, gruesos; de prefloración imbricada. Estambres 4-8(-10)× el número de los pétalos; filamentos concrescentes por grupos en la base; anteras elipsoideas a sagitadas. Disco anular. Ovario sincárpico, 5-18(-25)-locular; placentación axial; primordios seminales 4-8(-12) por lóculo; estilo 1, cilíndrico; estigma globoso-capitado. Fruto en hesperidio (baya carnosa plurilocular, con pericarpo coriáceo); exocarpo densamente glanduloso, pigmentado; mesocarpo blanco y esponjoso; endocarpo membranáceo, sutil; lóculos rellenos de numerosas vesículas jugosas. Semillas pocas a numerosas, angulares a elipsoides, a menudo aplanadas. Embriones blancos o verdes, a menudo varios en cada semilla (poliembrionía).

D i s t r i b u c i ó n : Género oriundo de Australia, Malasia y sureste de Asia, con 14-22(-30) especies e innumerables cultivares mayormente hibridógenos, cuya paternidad era mayormente desconocida pero con métodos moleculares modernos se comienza a dilucidar.

T a x o n o m í a : Se habían reconocido varios géneros como distintos (Citrus, Eremocitrus, Fortunella, Microcitrus, Poncirus, Clymenia), pero recientes análisis filogenéticos (Scott & al. 2000, Samuel & al. 2001, Araújo & al. 2003) demuestran que son estrechamente relacionados y forman parte de un clado natural. Por lo tanto aceptamos la unificación o reunificación de los géneros mencionados en un único género Citrus, como lo propone Mabberley (1997, 1998, 2004). Los taxones de Citrus con frutos comestibles resultan en su gran mayoría de la hibridización entre pocas especies silvestres. Los híbridos forman linajes estables que se propagan por semillas (apomixis por poliembrionía adventicia y eliminación de los embriones zigóticos). Algunos autores (p. ej. Tanaka 1954)

reconocen estos linajes como especies independientes, y según ellos el número de especies de *Citrus* alcanza 180. Swingle (1943) y Swingle & Reece (1967) las redujeron a 12 especies con frutos comestibles (*Citrus* subg. *Citrus*) y 6 con frutos no comestibles (*Citrus* subg. *Papeda*). Recientes estudios experimentales y basados en datos químicos y moleculares tampoco apoyan ese concepto sino sugieren que *Citrus* subg. *Citrus* solo abarca 4 especies silvestres alopátricas, y que 3 de ellas, *Citrus* maxima, *Citrus* medica y *Citrus* reticulata, son los progenitores de casi todos los cítricos comestibles comerciales (Scora 1989, Scora & Kumamoto 1983). En este tratamiento se adopta fundamentalmente el concepto de clasificación de Mabberley (1997, 1998, 2004).

Palinología: *Citrus* tiene usualmente granos de polen de tamaño mediano, 4(-5)-colporados (mayormente 5-colporados en *Citrus maxima*), oblato-esferoidales a subprolatos, con exina generalmente reticulada pero foveolada en *Citrus maxima* (Bamzai & Randhawa 1965, Grant & al. 2000).

C i t o l o g í a : Número cromosómico básico: x = 9 (Stace & al. 1993).

Especies cultivadas [nombres entre corchetes en la clave]. Además de las especies de amplio cultivo y mayor importancia económica, que se tratan más adelante, se hallan en Cuba los cuatro taxones siguientes (León & Alain 1951, Roig 1963, Esquivel & al. 1990, 1992, Rodríguez & Sánchez 2001):

- Citrus japonica Thunb. (Fortunella japonica (Thunb.) Swingle [= Citrus madurensis Lour.], inclusos los cultivares Fortunella margarita (Lour.) Swingle, 'Nagami', y Fortunella crassifolia Swingle, 'Meiwa'), kumquat, naranjita japonesa, sembrado en jardínes.
- Citrus ×latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka (Citrus ×aurantiifolia var. latifolia Yu. Tanaka), lima persa [Citrus ×aurantiifolia × Citrus medica], con jugo muy agrio y de sabor parecido al del limón.
- Citrus medica L., cidra, cidrón, cuyos frutos sirven en las fiestas judías de los Tabernáculos y producen la "cáscara de limón".
- Citrus ×microcarpa Bunge (×Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands [= Citrus mitis Blume, "Citrus madurensis" auct. fl. cub.; ver Wijnands 1984]), calamondín, naranjita de San José, naranjita del obispo [Citrus japonica × Citrus reticulata], cultivado por su jugo agrio.

También se utilizan una especie y cuatro híbridos, algunos a gran escala, como patrones de injertos (Hammer & al. 1991, Fuentes 2005). A pesar de su indudable importancia económica no son bien conocidos por los

botánicos y el público general, y dado que normalmente se encuentran en el estatus estéril no es fácil ni útil insertarlos en la clave. Este tratamiento se satisface con enumerarlos.

- Citrus ×insitorum Mabb. (= ×Citroncirus webberi J. W. Ingram & H. E. Moore), citrange 'Troyer' y 'Carrizo', citrumelo 'Swingle' [Citrus trifoliata × Citrus ×aurantium].
- Citrus ×jambhiri Lush., limón rugoso [Citrus medica × Citrus reticulata o Citrus ×limon × Citrus reticulata].
- Citrus ×lumia Risso & Poit. (Citrus volkameriana Pasq.), volkameriana [Citrus ×limon × Citrus ×aurantium].
- Citrus ×macrophylla Wester, macrofila [Citrus medica × Citrus hystrix], también cultivado como frutal.
- Citrus trifoliata L. (Poncirus trifoliata (L.) Raf.), mencionado por Hammer & al. (1991) y Esquivel & al. (1992).

Especies a excluir: Otros taxones mencionados en la literatura (y enumerados por Esquivel & al. 1992) solo se hallan en colecciones o ya no se cultivan:

- Citrus amblycarpa (Hassk.) Ochse (Citrus limonellus var. amblycarpa Hassk.);
- Citrus australasica F. Muell. (Microcitrus australasica (F. Muell.) Swingle);
- Citrus depressa Hayata;
- Citrus hystrix DC.;
- Citrus ichangensis Swingle;
- Citrus junos (Makino) Tanaka (Citrus aurantium subsp. junos Makino);
- Citrus limetta Risso;
- Citrus limettioides Tanaka;
- Citrus macroptera Montrouz.;
- Citrus taiwanica Tanaka & Y. Shimada;
- Citrus webberi Wester.

## Clave para las especies y los híbridos

1	Frutos con 3-7 gajos; primordios seminales 2 en cada lóculo
	[C. japonica]
1*	Frutos con (8-)10-14(-18) gajos; primordios seminales 4-12 en cada
	lóculo

Pecíolo sin alas, no articulado con la base de la lámina; fruto ovoide a elipsoideo, de  $15-25 \times 10-15$  cm, con cáscara muy gruesa [C. medica]

2*	Pecíolo $\pm$ alado, articulado con la base de la lámina; fruto $\pm$ globoso, oblato o subpiriforme, o cuando ovoide de $\leq$ 6 $\times$ 5 cm; cáscara sutil o moderadamente gruesa
3	Pecíolo anchamente alado distalmente, abruptamente estrechado hacia la base
3*	Pecíolo estrechamente o apenas alado, de ancho uniforme o gradu- almente estrechado hacia la base
4	Hojas pubescentes en los nervios por el envés; frutos de 10-20(-30) cm de diámetro
4*	Hojas glabras o subglabras; frutos de 6-15 cm de diámetro
5	Estambres usualmente > 4 veces el número de los pétalos; pétalos abaxialmente purpúreos, rosados en el botón; fruto ovoide, con ápice mamiforme
5*	Estambres usualmente 4 veces el número de los pétalos; pétalos blancos o color crema; fruto de forma variada, con ápice no mamiforme pero a veces en forma de pequeña papila
6	Cáscara del fruto separándose fácilmente de los gajos; embrión verde
6*	Cáscara del fruto fuertemente adherido a los gajos; embrión blanco 8
7	Lámina de la hoja anchamente oval; fruto de ca. 3 cm de diámetro, anaranjado o rojo-anaranjado; cáscara jugosa; jugo agrio
7*	Lámina de la hoja lanceolada, oval u ovada; fruto de 3-5(-8) cm de diámetro, verdoso-anaranjado o anaranjado; cáscara casi seca; jugo ± dulce
8	Fruto con cáscara gruesa, de 5-9 mm de grosor; pulpa anaranjada; jugo dulce
8*	Fruto con cáscara sutil, de < 1 mm de grosor; pulpa verdosa; jugo muy agrio
9	Plantas usualmente con numerosas espinas; pétalos blancos; estambres fértiles; fruto subgloboso, de 3,5-6 cm de diámetro, verde a verde amarillento; semillas presentes
9*	Plantas usualmente sin espinas; pétalos esfumados de púrpura; estambres estériles; fruto ovoide, elipsoideo u obovoide, de 2,5-4 cm de largo, amarillo pálido; semillas ausentes o raras [C. ×latifolia]

**12.1. Citrus maxima** (Burm.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 46, 296. 1917 ≡ *Aurantium maximum* Burm. in Rumphius, Herb. Amboin. Auctuar.: [90]. 1755 ≡ *Citrus decumana* L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 508. 1767, *nom. illeg*. Lectotipo (Scora &

Nicolson 1986: 593): [ícono] "Limo decumanus" en Rumphius, Herb. Amboin. 2: t. 24, f. 2 & B. 1741.

Citrus aurantium var. grandis L., Sp. Pl.: 783. 1753 ≡ Citrus grandis (L.) Osbeck, Dagb. Ostind. Resa: 98. 1757 ≡ Citrus aurantium var. decumana L., Sp. Pl., ed. 2: 1101. 1763. nom. illeg. Lectotipo (Mabberley 1997: 170): [ícono] "Malus arantia, fructu rotundo maximo pallescente humanum caput excedente" en Sloane, Voy. Jamaica: t. 12, f. 2-3. 1707.

Árbol de  $\leq$  15 m de alto. *Ramas* jóvenes angulosas, usualmente pubescentes, inermes o con espinas de 1-3(-5) cm de largo. *Hojas* pubescentes en los nervios del envés; *pecíolo* deltoideo u obcordiforme, de  $\leq$  4 cm de largo, articulado apicalmente, con alas de > 3 cm de ancho, alcanzando  $\frac{1}{2}$  del ancho de la lámina; *folíolo* oval, de 5-25  $\times$  2-15 cm, obtuso o agudo, de base anchamente redondeada o  $\pm$  cordiforme, a veces solapando el pecíolo, y margen subentero a crenulado. *Inflorescencias* unifloras o en racimo corto, paucifloro. *Flores* de 3-7 cm de diámetro. *Cáliz* 5-lobado. *Pétalos* (4-)5, blancos o crema. *Estambres* 20-25; *anteras* grandes. *Ovario* globoso; *estilo* claramente delimitado, deciduo. *Fruto* de 10-30 cm de diámetro, deprimido-globoso o piriforme, verde a amarillo pálido o rosado; *cáscara* gruesa; *gajos* 11-14, grandes; *jugo* agrio y amargo o dulzón. *Semillas* grandes, escabrosas,  $\pm$  estrechado-ovoides, amarillentas; *embrión* usualmente único.

D i s t r i b u c i ó n : Sureste de Asia. Ampliamente cultivada en varios países tropicales y subtropicales, también en Cuba.

V a r i a b i l i d a d : En Cuba se cultivan algunos cultivares, p. ej. 'Chandler'.

U s o s : Comparativamente a otros cítricos, las plantaciones de esta especie en Cuba tienen importancia algo menor. Los frutos no se comen frescos sino en confituras, también son ornamentales.

N o m b r e s c o m u n e s : Grapefruit, naranja moreira, pomelo, toronja, toronja criolla (León & Alain 1951, Esquivel & al. 1990, 1992).

- **12.2. Citrus** ×**limon** (L.) Osbeck, Reise Ostindien: 250. 1765 ≡ *Citrus medica* var. *limon* L., Sp. Pl.: 782. 1753. Lectotipo (Mabberley 1997: 169): [ícono] "*Limon vulga-ris*" en Ferrarius, Hesperides: 193. 1646.
- = Limon vulgare Mill., Gard. Dict., ed. 8, Limon #1. 1768. Tipo no designado.
- = Citrus limonum Risso in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 20: 201. 1813. Tipo no designado.
- = Citrus limonia Osbeck, Reise Ostindien: 250. 1765. Tipo no designado.
- = *Citrus limetta* var. *bergamia* Risso in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 20: 197. 1813 ≡ *Citrus ×bergamia* (Risso) Risso & Poit., Hist. Nat. Orangers: t. 53-56. 1819. Tipo no designado.

[Citrus medica × Citrus × aurantium].

Arbusto o árbol de  $\leq$  6 m de alto, fuertemente espinoso, con espinas de  $\leq$  11 mm de largo. *Hojas* unifolioladas; *pecíolo* de ca. 1,5  $\times$  0,12-0,2 cm, articulado apicalmente,

marginado o estrechamente alado; *folíolo* estrechamente oval a ovado, de 5-10(-15) × 3-6(-8) cm, glabro, agudo o redondeado, de base cuneiforme o redondeada y margen subserrado a aserrado-crenulado. *Inflorescencias* unifloras o en racimo corto, paucifloro. *Flores* 5-meras, grandes, hermafroditas o *3. Cáliz* de 0,5 cm de largo. *Pétalos* ovales, de ca. 2 cm de largo, blancos por dentro, purpúreos por fuera, rosados en el botón. *Estambres* 20-40. *Ovario* atenuado gradualmente en el estilo. *Fruto* ovoide, de 3-6 × 2,5-5 cm, con ápice mamiforme; *cáscara* ± gruesa, amarilla en la madurez, glandulosa; *gajos* 8-10; *pulpa* con vesículas verde pálido a amarillento; *jugo* agrio. *Semillas* pequeñas, ovoides, lisas, agudas; *embrión* blanco.

D i s t r i b u c i ó n : Nativa en el sureste de Asia, muy cultivado en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, incluso en Cuba.

V a r i a b i l i d a d : Se conoce desde hace poco (Mabberley 2004) que el limón resulta del cruzamiento de cidra y naranja, es decir, tiene cidra, pomelo y mandarina como parentesco. Grupos de cultivares: (1) *Citrus ×limon* s. str., con los cultivares que resultaron del cruzamiento original, se corresponde con el Grupo del limón verdadero (limón, limón agrio, limón chino, limón francés, limón persa, limón rugoso); (2) *Citrus ×limonia*, el Grupo del limón dulce (lima rangpur, limón dulce, limón francés dulce), resulta del retrocruzamiento del limón con la mandarina – uno de sus progenitores; (3) *Citrus ×bergamia*, el Grupo de la bergamota (bergamota), se postula (Mabberley 2004) resulte del retrocruzamiento del limón con la naranja.

U s o s : Del limón verdadero, cultivado en los jardines por sus frutos, usados como sazón y por su jugo, sobre todo se conoce el cultivar 'Eureka' (Esquivel & al. 1992). Los cultivares de *Citrus ×limonia* (en particular modo 'Kusaie' y 'Otaheite') se cultivan por sus frutos y también para uso ornamental y como portainjertos. La bergamota, que en la cáscara de sus frutos produce aceites esenciales utilizados en perfumería, es escasamente cultivada en Cuba en la actualidad.

N o m b r e s c o m u n e s (León & Alain 1951, Roig 1963, Esquivel & al. 1990, 1992, Rodríguez & Sánchez 2001): ver bajo los grupos de cultivares. Con frecuencia, sobre todo en trabajos de etnobotánica, lo que se designa como "limón" es en realidad *Citrus ×aurantiifolia* 'Mexicana'.

- **12.3.** Citrus ×aurantium L., Sp. Pl.: 782. 1753. Lectotipo (Mabberley 1997: 170): [espécimen] Herb. Linn. #937.2, fila superior de hojas (LINN!).
- = Citrus ×aurantium var. sinensis L., Sp. Pl.: 783. 1753 ≡ Citrus ×sinensis (L.) Osbeck, Reise Ostind.: 250. 1765. Lectotipo (Mabberley 1997): [espécimen] Herb. Linn. 937.2, fila inferior de hojas (LINN!).
- = Citrus ×nobilis Lour., Fl. Cochinch. 1: 466. 1790. Tipo no designado.
- = *Citrus vulgaris* Risso in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 20: 180. 1813. Tipo no designado.
- = *Citrus aurantium* var. *myrtifolia* Ker Gawl. in Bot. Reg.: ad t. 346. 1818 ≡ *Citrus myrtifolia* (Ker Gawl.) Raf., Sylva Tellur.: 141. 1838. Tipo no designado.




Figura 16.1. *Citrus* × *aurantium* L., Grupo de las naranjas agrias (espécimen *Britton & Wilson 4904*, NY); 16.2-3. *id.*, Grupo de las toronjas (planta cultivada, *IPEN No. XX-0-B-0756174*, B) (dibujos de Michael Rodewald).

1. Rama con botones florales; 2. Flor; 3 Flor con la parte anterior del cáliz y tres pétalos removidos.

- = *Citrus bigaradia* Loisel. in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. 7: 99. 1819 ≡ *Citrus aurantium* var. *bigaradia* (Loisel.) Hook f., Fl. Brit. India 1: 515. 1875.
- = Citrus ×paradisi Macfad. in Bot. Misc. 1: 304. 1830. Tipo no designado.
- Citrus ×tangelo J. W. Ingram & H. E. Moore in Baileya 19: 169. 1975.
   Holotipo: [ícono] "Tangelo cv. 'Sampson" en Yearb. U.S. Dept. Agric. 1904: t. 17-18. 1905.

[Citrus maxima × Citrus reticulata].

- Fig. 16.

Árbol o arbusto de 4-15 m de alto, inerme o con pocas espinas mayormente cortas y finas pero que pueden alcanzar 5-8 cm de largo en los retoños. Hojas subglabras, aromáticas; pecíolo de 1-3 × 0,2-2(-2) cm, articulado apicalmente, con alas estrechas o anchas y entonces ensanchadas y redondeadas distalmente y estrechadas hacia la base; foliolo oval u ovado, de 6-11 × 3-6 cm, obtusamente agudo o acuminado, a veces ± emarginado, de base redondeada o cuneiforme y margen undulado, serrulado, crenulado o entero. Inflorescencias unifloras o en racimo corto, paucifloro. Flores 5meras, fragantes, hermafroditas o algunas (< 10%) \$\bar{\dagge}\$. Cáliz de 4,5-6 mm de largo, con lobos de 2-3 mm de largo. Pétalos oblongo-lineares, blancos. Estambres 20-25. Ovario subgloboso; estilo claramente delimitado. Fruto subgloboso a ligeramente deprimido, generalmente de 6-15 cm de diámetro: cáscara ± gruesa, amarillo verdoso a anaranjado vivo a veces teñido de rojo; pulpa con vesículas anaranjadas; jugo agrio y amargo o dulce. Semillas pocas o numerosas, cuneado-ovoides, blancas, poliembrionales; embrión blanco.

Distribución: Taxón híbrido cultígeno, cultivado en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Cultivada en toda Cuba, aparentemente naturalizada en Cuba occidental: Hab (Managua; Sierra Anafe), Mat (Valle del Yumurí), Cuba central: Ci (Siguanea), Cam (La Gloria) y Cuba oriental: SC (Firmeza). – Mapa 48.

V a r i a b i l i d a d : Se conocen numerosos cultivares, varios de ellos resultan del retrocruzamianto con una u otra de las especies parentales. Los grupos de cultivares (Mabberley 1997) que más se cultivan en Cuba son los siguientes. (1) Citrus ×aurantium var. aurantium [Citrus vulgaris, incl. Citrus myrtifolia, Citrus bigaradia], Grupo de las naranjas agrias (cajela, naranja agria, naranja cajel, naranja de Sevilla, naranja varía), que de los híbridos originales son los que más tienen características de Citrus

maxima; (2) Citrus ×aurantium var. sinensis, Grupo de las naranjas dulces (naranja, naranja china, naranja de ombligo, naranja de Valencia, naranja dulce), más parecidas a Citrus reticulata; (3) Citrus ×paradisi, Grupo de las toronias (grapefruit, toronia), que resulta de un retrocruzamiento de Citrus ×aurantium var. aurantium con Citrus maxima; (4) Grupo de las chironias (chironia), retrocruzamientos entre Citrus ×aurantium var. sinensis y Citrus maxima; (5) Citrus ×nobilis, Grupo de los tangor (tangor, narania moreira), retrocruzamientos de Citrus ×aurantium var. sinensis con Citrus reticulata; (6) Citrus ×tangelo, Grupo de los tangelos (tangelo), retrocruzamientos de Citrus ×paradisi con Citrus reticulata, que tienen frutos más dulces que las toronjas y con cáscara fácilmente amovible. Además. Rodríguez & Sánchez (2001) mencionan (7) una naranja 'Blanca de Mayajigua' (naranja blanca), que se produjo en Sancti Spíritus por cruzamiento de naranja dulce y toronja, variedad altamente productiva que recomiendan para los huertos caseros, pero que demanda ser estudiada antes de colocarla en un Grupo.



Mapa 48. Citrus ×aurantium L.

U s o s : De las naranjas agrias se cultivan varios cultivares; de sus hojas, flores y frutos se extraen aceites esenciales con aromas particulares: aceite de nafa o de neroli de las flores, aceite de bigarada de las cáscaras, aceite de petitgrain de los retoños y frutos; la "cáscara de naranja" entra en la producción de dulces y con los frutos enteros se hace una mermelada amarga llamada "inglesa", o mermelada de Sevilla. Las naranjas dulces; con sus numerosos cultivares y formas, son los cítricos más apreciados por la población en Cuba y se cultivan comercialmente a gran escala. También muy cultivados como frutales y bien conocidos son las toronjas, chironjas (al origen de producción portoriqueña), los tangelos (sobre todo el cultivar 'Orlando', introducido desde la Florida en los años 1930) y los tangor.

Nombres comunes (León & Alain 1951, Roig 1963, Esquivel & al. 1990, 1992, Rodríguez & Sánchez 2001): ver bajo los grupos de cultivares.

- **12.4. Citrus reticulata** Blanco, Fl. Filip.: 610. 1837. Neotipo (Swingle 1943: 413): Filipinas, Luzón, *Merrill 402* (UC [n.v.], BM [n.v.], K [n.v.]).
- = Citrus deliciosa Ten., Ind. Sem. Hort. Bot. Neapol. 1840: 9. 1840 ≡ Citrus reticulata subsp. deliciosa (Ten.) D. Rivera & al., Varied. Trad. Frut. Cuenca Río Segura [2]: 187. 1998. Tipo no designado.
- = *Citrus aurantium* var. *reshmi* Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(4): 200. 1896 ≡ *Citrus reshmi* (Engl.) Tanaka in Stud. Citrol. 8: 68. 1935. Tipo no designado.
- = Citrus aurantium var. tachibana Makino in J. Jap. Hort. Soc. 75: 2. 1896 ≡ Citrus tachibana (Makino) Tanaka in Bult. Sci. Fak. Terk. Kjaŝu Imp. Univ. 1: 31. 1924
   ≡ Citrus reticulata subsp. tachibana (Ten.) D. Rivera & al., Varied. Trad. Frut. Cuenca Río Segura [2]: 189. 1998. Tipo no designado.
- = Citrus tangerina Tanaka in Mem. Tanaka Citrus Exp. Sta. 1(1): 29. 1927. Tipo no designado.

Árbol o arbusto de 2-8 m de alto. *Ramas* delgadas, usualmente con pocas espinas cortas. *Hojas* unifolioladas; *pecíolo* de 0,5-2 cm de largo, articulado apicalmente, marginado pero sin alas; *folíolo* lanceolado, oval u obovado, de 3-8 × 1,5-4 cm, obtuso o agudo, de base cuneiforme y margen usualmente crenado o crenulado. *Inflorescencias* unifloras o en racimo corto, paucifloro. *Flores* 5-meras, hermafroditas. *Cáliz* lobado. *Pétalos* de 7-8 mm de largo, blancos. *Estambres* 18-23. *Fruto* deprimido-globoso, de 3-5(-8) cm de diámetro, a veces con una mamila apical, anaranjado verdoso a brillante; *cáscara* fina, algo seca, fácilmente separable de los gajos; *gajos* 10-15; *pulpa* con vesículas anaranjado pálido a vivo; *jugo* dulce, de sabor característico. *Semillas* pequeñas, casi lisas, de base aguda; *embrión* verde.

D i s tri b u c i ó n : China subtropical. Cultivada ampliamente por sus frutos comestibles, también en Cuba.

V a r i a b i l i d a d : Algunos cultivares de la mandarina, p. ej. 'Clementine', 'Cleopatra' (*Citrus reticulata* subsp. *tachibana* [= *Citrus reshmi*]) y 'Dancy', se cultivan en Cuba a escala comercial.

U s o s : Frutales de importancia considerable. La mandarina 'Cleopatra' es ornamental por madurar frutos durante todo el año y también se utiliza como patrón de injertos.

N o m b r e s c o m u n e s : Mandarina, mandarina deliciosa (León & Alain 1951, Roig 1963, Esquivel & al. 1990, 1992).

**12.5. Citrus** ×aurantiifolia (Christm.) Swingle in J. Wash. Acad. Sci. 3: 465. 1913 ≡ *Limonia aurantiifolia* Christm., Vollst. Pflanzensyst. 1: 618.

1777. Lectotipo (Stone 1985b: 424): [ícono] "Limonellus sive Limon Nipis" en Rumphius, Herb. Amboin. 2: t. 29. 1741. [Citrus maxima × Citrus cf. ichangensis Swingle].

Árbol o arbusto de 3-5 m de alto, muy ramoso, usualmente con numerosas espinas cortas, rígidas. *Hojas* glabras; *pecíolo* de 0,7-2,5 × 0,4-1 cm, articulado apicalmente, estrechamente alado, con ala espatulada; *folíolo* oval a oblongo-aovado, de 4-9 × 2-5 cm, agudo, redondeado o emarginado, de base redondeada y margen crenulado. *Inflorescencias* unifloras o en racimo corto, paucifloro. *Flores* 4-5-meras; muy fragantes. *Cáliz* de 1,5 mm de largo, con lobos de ca. 1,2 mm de largo. *Pétalos* de 8-12 × 3-5 mm, blancos. *Estambres* 20-25. *Ovario* ± globoso, *estilo* claramente delimitado. *Fruto* globoso a elipsoideo, de 3,5-6 cm de diámetro, verde a verde amarillento en la madurez, con ápice a veces mamiforme; *cáscara* muy fina, densamente glanduloso-punteada; *gajos* 9-12; *pulpa* con vesículas pequeñas; *jugo* muy agrio. *Semillas* pequeñas, rollizas, ovoides, lisas, poliembrionales; embrión blanco.

D i s t r i b u c i ó n : Taxón híbrido cultígeno, cultivado en muchas regiones tropicales del mundo. Cultivada en toda Cuba, aparentemente naturalizada en Cuba occidental: PR (río San Miguel, de Volador a Mal Paso), Hab (Sierra de Anafe), C Hab (río Bacuranao), IJ (Sierra de Caballos) y Cuba central: VC (Hoyo de Manicaragua), SS (Pitajones), Cam (La Gloria; Cayo Sabinal). – Mapa 49.

V a r i a b i l i d a d : Existen varios cultivares, de los cuales 'Mexicana' es el más conocido. El parentesco de *Citrus ×aurantiifolia* estuvo controvertido (Mabberley 1997, Scora & Kumamoto 1983); en este tratamiento adoptamos la nueva hipótesis de parentesco que sugiere Mabberley (2004).



Mapa 49. Citrus ×aurantiifolia (Christm.) Swingle

U s o s : Frutal apreciado por ser resistente y producir frutos abundantes durante una gran parte del año. Se utiliza el jugo en la preparación de refrescos. También planta condimenticia (Fuentes & López 2000), medicinal (Fuentes & Expósito 1997) y de uso en medicina veterinaria (Fuentes 2001).

N o m b r e s c o m u n e s : Lima, lima dulce, lima de Rangpur, limón, limón agrio, limón criollo, naranja lima (León & Alain 1951, Roig 1963, Esquivel & al. 1990).

## Referencias bibliográficas

Acuña Galé, J. 1974. Plantas indeseables en los cultivos cubanos. La Habana.

Adams, C. D. 1972. Flowering plants of Jamaica. Mona, Jamaica.

Taylor, D. R. & Warner, J. M. 1973. N-methylflindersine from Spathelia sorbifolia. – Phytochemistry 12: 1359-1360.

Alain, Hno. ["Liogier, A. H."] 1969. Flora de Cuba. Suplemento. Caracas.

- 1985. La flora de la Española 3. San Pedro de Macorís.
- 1988. Descriptive flora of Puerto Rico and adjacent islands. Spermatophyta 2.
   Río Piedras, Puerto Rico.
- Alemán Frías, E., Aurich, O., Ezcurra Ferrer, L., Gutiérrez Vázquez, M., Horstmann, C., López Rendueles, J., Rodríguez Graquitena, E., Roquel Casabella, E. & Schreiber, K. 1972. Phytochemische Untersuchungen an Pflanzen der kubanischen Flora. Kulturpflanze 19: 359-425.
- Araújo, E. F. de, Queiroz, L. P. de & Machado, M. A. 2003. What is *Citrus?* Taxonomic implications from a study of cp-DNA evolution in the tribe *Citreae (Rutaceae subfamily Aurantioideae)*. Organisms Diversity Evol. 3: 55-62.
- Armstrong, J. A. 2002. *Zieria (Rutaceae)*: a systematic and evolutionary study. Austral. Syst. Bot. 15: 277-463.
- Bamzai, D. R. & Randhawa, G. S. 1965. Palynological studies in Citrus. J. Palynol. 1: 111-121.
- Barth, O. M. 1981. Pollen morphology of a Brazilian *Rutaceae: Zanthoxylum (Fagara*). Pollen & Spores 22: 425-436.
- 1982. Variações polínicas em espécies brasileiras da familia *Rutaceae*. Bol. Inst. Geoci. Univ. São Paulo 13: 129-134.
- 1983. Pollen morphology of Brazilian Rutaceae: Dictyoloma and Hortia. Pollen & Spores 25: 409-420.
- 1985. Pollen morphology of Brazilian Rutaceae: Pilocarpus. Pollen & Spores 27: 145-154.
- Batista Báez, M., Dominicis Bravo, E., Sarduy Domínguez, R. & Fernández de Cordoba, H. 1994. Tamizaje de alcaloides y saponinas de plantas que crecen en Cuba I. Moa 1. Revista Cub. Farm. 28: 61-68.
- Berazaín Iturralde, R., Areces Berazaín, F., Lazcano Lara, J. C. & González Torres, L. R. 2005. Lista roja de la flora vascular cubana. Doc. Jard. Bot. Atlántico Gijón 4.

- Beurton, C. & Urquiola Cruz, A. J. 2000. Zanthoxylum duplicipunctatum C. Wright ex Griseb.: rediscovery of a Rutaceae after 136 years. P. 15 en: Zanoni, T. A. & Buck, W. R. (ed.), Symposium: Flora of the Greater Antilles. 23-24 June 2000. Program and abstracts. Bronx, NY.
- Beurton, C. 1986a. Phyllodienbildende Zanthoxylum-Sippen in Cuba I. Zanthoxylum phyllopterum und Zanthoxylum rolandii (Fam. Rutaceae). Feddes Repert. 97: 29-41.
- 1986b. Zanthoxylum bissei, eine neue Art aus Cuba (Rutaceae). Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 6(2): 3-9.
- 1987. Phyllodienbildende Zanthoxylum-Sippen in Cuba II. Zanthoxylum dumosum,
   Zanthoxylum pseudodumosum, Zanthoxylum ignoratum und Zanthoxylum arnoldii
   (Fam. Rutaceae). Feddes Repert. 98: 53-73.
- 1994. Gynoecium and perianth in Zanthoxylum s.l. (Rutaceae). Pl. Syst. Evol. 189: 165-191.
- 1996. Die Früchte und Samen der kubanischen Zanthoxylum-Arten (Rutaceae).
   Willdenowia 26: 283-299.
- 2000a. The genus *Plethadenia (Rutaceae)*. Willdenowia 30: 115-123.
- 2000b. Notes on Zanthoxylum (Rutaceae) from the Antilles. Willdenowia 30: 125-130.
- 2001. Clave de especies cubanas del género Zanthoxylum L. s.l. (Rutaceae). Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 22: 157-163.
- 2004. Angostura ossana (Rutaceae), a component of the Cuban flora Willdenowia 34: 277-289.
- Borhidi, A., 1996. Phytogeography and vegetation ecology of Cuba, ed. 2. Budapest.
- , Acuña, J. & Muñiz, O. 1974. New plants in Cuba III. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19: 37-45.
- & Muñiz, O. 1973. New plants in Cuba II. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 18: 29-48.
- Brako, L. & Zarucchi, J. L. 1993. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. St Louis.
- Brizicky, G. K. 1962. Taxonomic and nomenclatural notes on *Zanthoxylum* and *Glycosmis (Rutaceae)*. J. Arnold Arbor. 43: 80-93.
- Candolle, A.-P. de, 1824. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, 1. Paris, Strasbourg & London.
- Capote, R. P. & Berazaín, R. 1984. Clasificación de las formaciones vegetales de Cuba. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 5(2): 27-75.
- Castillo Ochoa, S., González-Lavaut, J. J. A., González Guevara, H., Prieto-González, S. & Urquiola Cruz, A. 2004. Identificación fitoquímica de las hojas y ramas de la *Helietta cubensis* Monach-Moldenke, especie endémica de Cuba. Revista Cub. Farm. 38: 1-4.
- Chase, M. W., Morton, C. M. & Kallunki, J. A. 1999. Phylogenetic relationships of *Rutaceae*: a cladistic analysis of the subfamilies using evidence from RBC and ATP sequence variation. Amer. J. Bot. 86: 1191-1199.
- Chiang, F. 2001. Casimiroa [en: Stevens, W. D., Ulloa Ulloa, C., Pool, A. & Montiel, A. M. (ed.), Flora de Nicaragua]. – Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85: 2289.
- Cowan, R. S. & Brizicky, G. K, 1960. Taxonomic relationships of *Diomma* Engler ex Harms gen. inc. sed. Mem. New York Bot. Gard. 10(2): 58-64.

- Dominicis, M. E., Oquendo, M., Batista, M. & Herrera, P. 1995. Tamizaje de alcaloides y saponinas de plantas que crecen en Cuba. II. Península de Guanahacabibes. Revista Cub. Farm. 29: 52-57.
- Elias, T. S. 1970. The correct name for the genus *Cusparia (Rutaceae)*. Taxon 19: 573-575.
- Engler, A. 1896. *Rutaceae.* Pp. 95-201 en: Engler, A. & Prantl, K. (ed.), Die natürlichen Pflanzenfamilien 3(4). Leipzig.
- 1931. *Rutaceae*. Pp. 187-359 en: Engler, A. & Prantl, K. (ed.), Die natürlichen Pflanzenfamilien, ed. 2, 19a. Leipzig.
- Erdtman, G. 1952. Pollen morphology and plant taxonomy: Angiosperms. Stockholm. Esquivel, M., Castiñeiras, L., Knüpffer, H. & Hammer, K. 1990. A checklist of the cultivated plants of Cuba. Kulturpflanze 37: 211-357.
- , Knüpffer, H. & Hammer, K. 1992. Inventory of the cultivated plants. Pp. 213-454 en: Hammer, K., Esquivel, M. & Knüpffer, H. (ed.), "... y tienen faxones y fabas muy diversos de los nuestros ...". Origin, evolution and diversity of Cuban plant genetic resources. Gatersleben.
- , Krieghoff, K., Uranga, H., Walcón, L. & Hammer, K. 1989b. Collecting plant genetic resources in Cuba. Report of the third mission, March 1988. – Kulturpflanze 37: 359-372.
- Fernández de Cordoba, H., Batista, M. & Sarduy Domínguez, R. 1995. Tamizaje de alcaloides y saponinas de plantas que crecen en Cuba III. Sierra del Rosario. Revista Cub. Farm. 29: 58-64.
- H., Sandoval, D., Díaz, M. C., Herrera, P. & Oquendo, M. 1992. Detección de alcaloides en plantas que crecen en Cuba. 1992. – Rep. Invest. Inst. Ecol. Sist., Ser. Bot. 7.
- Fish, F. & Waterman, P. G. 1973. Chemosystematics in the *Rutaceae*. II. The chemosystematics of the *Zanthoxylum/Fagara* complex. Taxon 22: 177-203.
- Fors, A. J. 1968, Maderas cubanas, ed. 3. La Habana.
- Fuentes Fiallo, V. R. 2001. Apuntes para la flora económica de Cuba IV. Especies medicinales de uso veterinario. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 22: 221-245.
- 2005. Apuntes para la flora económica de Cuba VII. Especies frutales. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 24: 177-217.
- & Expósito, A. 1997. Las encuestas etnobotánicas sobre plantas medicinales en Cuba. – Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 16: 77-145.
- & López, L. P. 2000. Apuntes para la flora económica de Cuba III. Plantas condimenticias. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 21: 47-70.
- Gómez de la Maza, M. 1889. Diccionario botánico de los nombres vulgares cubanos y puerto-riqueños. La Habana.
- & Roig y Mesa, J. T. 1914. Flora de Cuba (datos para su estudio). Bol. Estac.
   Exp. Agron. Santiago de las Vegas 22.
- Grant, M., Blackmore, S. & Morton, C. 2000. Pollen morphology of the subfamily *Aurantiodeae (Rutaceae)*. Grana 39: 8-20.
- Gregor, H. 1977. *Zanthoxylum wendingense* nov. spec. aus untersarmatischen Riessee-Ablagerungen. Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläontol. 17: 249-256.
- Grieve, C. M. & Score, R.W. 1980. Flavonoid distribution in the *Aurantioideae* (*Rutaceae*). Syst. Bot. 45: 524-545.

- Grisebach, A. 1860. Plantae Wrightianae, e Cuba orientali. Pars I. Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 8: 153-192.
- 1866. Catalogus plantarum cubensium. Leipzig.
- Grosourdy, R. 1864. El médico botánico criollo, 1-4. Paris.
- Guerra, M., Dos Santos, K. G. B., Barros e Silva, A. E. & Ehrendorfer, F. 2000. Heterochromatin banding patterns in *Rutaceae-Aurantioideae* a case of parallel chromosomal evolution. Amer. J. Bot. 87: 735-747.
- Hammer, K., Esquivel, M., Fuentes, V., Lima, H. & Knüpfer, H. 1991. Additional notes to the checklist of Cuban cultivated plants (1). Kulturpflanze 38: 325-343.
- Harms, H. 1931. Nachträge zu Band 19a. Pp. 457-460 en: Engler, A. & Prantl, K. (ed.), Die natürlichen Pflanzenfamilien, ed. 2, 19a. Leipzig.
- Hartley, T. G. 1966, A revision of the Malasian species of *Zanthoxylum (Rutaceae*). J. Arnold Arbor. 47: 171-221.
- Heusser, C. J. 1971. Pollen and spores of Chile. Tucson, Arizona.
- Hitchcock, A. S. & Green, M. L. 1929. Standard species of Linnean genera of *Phane-rogamae* (1753-54). Pp. 111-195 en: Ramsbottom, J., Willmott, A. J., Wakefield, E. M. & Sprague, T. A. (ed.). International Botanical Congress Cambridge (England), 1930. Nomenclature proposals by British botanists. London.
- Howard, R. A. 1988. Flora of the Lesser Antilles, Leeward and Windward Islands, 4. Jamaica Plains.
- Jarvis, C. E. 2007. Order out of chaos. Linnaean plant names and their types. London.
- , Barrie, F. R., Allan, D. M. & Reveal, J. L. 1993. A list of the Linnaean generic names and their types. Regnum Veg. 127.
- Jussieu, A. L. de, 1789. Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Paris.
- Kaastra, R. C. 1982. Pilocarpinae (Rutaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 33.
- Kallunki, J. A. 2002. *Rutaceae* [en: Guide to vascular plants of central French Guiana]. Mem. New York Bot. Gard. 76(2): 649-656.
- 2005. Rutaceae. Pp. 1-39 en: Steyermark, J. A., Berry, P. E., Yatskievych, K. & Holst, B. K. (ed.), Flora of the Venezuelan Guayana 9. St Louis.
- & Pirani, J. R. 1998. Synopses of *Angostura* Roem. & Schult. and *Conchocarpus* J. C. Mikan (*Rutaceae*). Kew Bull. 53: 257-334.
- Kuck, A. M., Albonico, S. M., Deulofeu, V. & Escalante, M. G. 1967. Alkaloids from Argentine *Fagara* species. Phytochemistry 6: 1541-1550.
- León, Hno. & Alain, Hno. 1951. Flora de Cuba 2. Dicotiledóneas: Casuarinaceas a Meliaceas. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 10.
- Lim, A. L. 2001. *Citrus* and Citroids: Recent biological findings. Malayan Nat. J. 55: 221-229.
- Lobreau-Callen, D., Oltmann, O. & Straka, H. 1975. Palynologia Madagassica et Mascarenica. Fam. 99-110. Pollen & Spores 17: 11-57.
- Mabberley, D. J. 1997. A classification for edible *Citrus (Rutaceae)*. Telopea 7: 167-172.
- 1998. Australian Citreae with notes on other Aurantioideae (Rutaceae). Telopea
   7: 333-344.
- 2004. Citrus (Rutaceae): A review of recent advances in etymology, systematics and medical applications. – Blumea 49: 481-498.

- Magadán, R., Milián, O., Franco, P., Marquina, G., Estévez, A. & Celeiro, L. 1983.
  Aislamiento y caracterización de un alcaloides de la especie *Triphasia trifolia* (*Rutaceae*). Revista Pl. Med. 3, Supl.: 33.
- Marie-Victorin, Hno. 1948. Nouvelles études taxonomiques sur la flore de Cuba. Contr. Inst. Bot. Univ. Montréal 63.
- Martínez, M. 1951. Las Casimiroas de México y Centroamérica. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 22: 25-81.
- Moore, J. A. 1936. Floral anatomy and phylogeny in the *Rutaceae*. New Phytol. 35: 318-322.
- Morton, C. M., Grant, M. & Blackmore, S. 2003. Phylogenetic relationships of the *Aurantioideae* inferred from chloroplast DNA sequence Data. Amer. J. Bot. 90: 1463-1469.
- & Kallunki, J. A. 1993. Pollen morphology of the subtribe *Cuspariinae (Rutaceae)*. Brittonia 45: 286-314.
- Ng, K. M., Gray, A. I. & Waterman, P. G. 1987. Benzophenanthridine alkaloids from the stem bark of a *Zanthoxylum* species. Phytochemistry 26: 3251-3254.
- Oviedo, R. 2007. *Rutaceae.* Pp. 62-63 in: González-Torres, L. R., Leiva Sánchez, Á. T., Rankin Rodríguez, R. & Palmarola Bejerano, A. (ed.), Categorización preliminar de taxones de la flora de Cuba 2007. Santa Clara, Cuba.
- Payo, A., Oquendo, M. & Oviedo, R. 1996. Tamizaje fitoquímico preliminar de plantas que crecen en Sierra de Nipe, Holguín. Revista Cub. Farm. 30: 120-131.
- Piedade, L. H. & Ranga, N. T. 1993. Ecologia da polinização de *Galipea jasminiflora* Engler (*Rutaceae*). Revista Brasil. Bot. 16: 151-157.
- Pino, J. A., Agüero, J., Marbot, R. & Fernandes, P. (2005) Composition of the essential oil of Zanthoxylum fagara (L.) Sargent, from Cuba. J. Essential Oil Res. 17: 413-414.
- , Marbot, R. & Fuentes, V. (2006). Aromatic plants from Western Cuba VI.
   Composition of the leaf oils of *Murraya exotica* L., *Amyris balsamifera* L. *Severinia buxifolia* (Poir) Ten. and *Triphasia trifolia* (Burm. f.) P. Wilson. J. Essential Oil Res. 18: 24-28.
- , Rosado, A., Bello, A., Urquiola, A. & García, S. 2000. Essential oil of *Amyris elemifera* L. from Cuba. J. Essential Oil Res. 12: 39-40.
- Pirani, J. R. 1993. A new species and a new combination in *Zanthoxylum (Rutaceae)* from Brazil. Brittonia 45: 154-158.
- 1998. A revision of Helietta and Balfourodendron (Rutaceae-Pteleinae). Brittonia 50: 348-380.
- Planchon, J. E. 1846. Revue de la famille des simaroubées. London J. Bot. 5: 560-584.
   Porter, D. M. 1977. Zanthoxylum (Rutaceae) in North America north of Mexico. Brittonia 28: 443-447.
- Richard, A. 1841. Pp. 1-336 en: Sagra, R. de la, Histoire physique, politique et naturelle de l'Ile de Cuba. Botanique. Plantes vasculaires. Paris.
- Rodríguez Nodals, A. A. & Sánchez Pérez, P. 2001. Especies de frutales cultivadas en Cuba en la Agricultura urbana. La Habana.
- Roig y Mesa, J. T. 1933. Hierbas y otras plantas dañinas en Cuba. Revista Agríc. Comercio Trab. (Habana) 14(9): 108-131.
- 1963. Diccionario botánico de nombres vulgares cubanos, ed. 3. Santiago de las Vegas.

- 1974. Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba, ed. 2. La Habana.
- Sagra, R. de la 1845. Historia física, política y natural de la Isla de Cuba, 10. Paris.
- Samek, V., 1973. Regiones fitogeográficas de Cuba. Acad. Ci. Cuba, Ser. Forest. 15.
- Samuel, R., Ehrendorfer, F., Chase, M. W. & Greger, H. 2001. Phylogenetic analyses of *Aurantioideae (Rutaceae)* based on non-coding plastid DNA sequences and phytochemical features. Pl. Biol. 3: 77-87.
- Sánchez, V., Fernández, H., Díaz, M., Sandoval, D., Ripperger, H. & Herrera, P. 1985. Detección de alcaloides en 243 especies de plantas que crecen en Cuba I. – Revista Cub. Farm. 19: 342-351.
- Sandoval, D. & Oquendo, M. 1990. Estudio fitoquímico preliminar de detección de alcaloides y saponinas en plantas que crecen en Cuba. Revista Cub. Farm. 24: 288-296.
- Saunders, E. R. 1934. On carpel polymorphism. VI. Ann. Bot. 48: 643-692.
- Sauvalle, F. A. 1873. Flora cubana. La Habana.
- Scora, R. W. 1989. Biochemistry, taxonomy and evolution of modern cultivated *Citrus*.
   Pp. 277-289 en: Anónimo (ed.), Proceedings of the Sixth International *Citrus* Congress. London, New York, etc.
- & Kumamoto, J. 1983. Chemotaxonomy of the genus *Citrus*. Pp. 343-351. In: Waterman, P. G. & Grundon, M. F. (eds.), Chemistry and chemical taxonomy of the Rutales. Academic Press London.
- & Nicolson, D. H. 1986. The correct name for the shaddock, *Citrus maxima*, not C. grandis (Rutaceae). - Taxon 35: 592-594.
- Scott, K. D., McIntyre, C. I. & Playford, J. 2000. Molecular analyses suggest a need for a significant rearrangement of *Rutaceae* subfamilies and a minor reassessment of species relationships within *Flindersia*. Pl. Syst. Evol. 223: 15-27.
- Selling, O. 1947. Studies in Hawaiian pollen statistics, Part II. The pollen of the Hawaiian phanerogams. Special Publ. Bernice Pauahi Bishop Mus. 38.
- Silva, M. F. das G. F. da, Gottlieb, O. R. & Ehrendorfer, F. 1988. Chemosystematics of the *Rutaceae*: suggestions for a more natural taxonomy and evolutionary interpretation of the family. Pl. Syst. Evol. 161: 97-134.
- Skorupa, L. A. 1998. Three new species of *Pilocarpus* Vahl (*Rutaceae*) from Brazil. Novon 8: 447-454.
- 1999. A new species of Pilocarpus Vahl (Rutaceae) from Peru. Novon 9: 257-259.
- 2003. Novos táxons infraespecíficos e combinações em *Pilocarpus* Vahl (*Rutaceae*). Revista Brasil. Bot. 26: 263-270.
- Stace, H. M., Armstrong, J. A. & James, S. H. 1993. Cytoevolutionary patterns in *Rutaceae*. Pl. Syst. Evol. 187: 1-28.
- Stafleu, F. A. (ed.) 1956. Index nominum genericorum cards, set 2. Utrecht.
- Stern, W. L. & Brizicky, G. K, 1960. The morphology and relationships of *Diomma*, gen. inc. sed. Mem. New York Bot. Gard. 10(2): 38-57.
- Stone, B. C. 1985a. A conspectus of the genus *Glycosmis* Correa. Studies in Malesian *Rutaceae*, 3. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 137(2): 1-27.
- 1985b. Rutaceae. Pp. 406-476 en: Dassanayake, M. D. & Forsberg, F. R. (ed.).
   Flora of Ceylon 5. New Delhi.
- 1994. Additional notes on the genus *Glycosmis* Correa (*Rutaceae*). Gard. Bull. Singapore 46. 113-119.

- Swingle, W. T. 1943. The botany of *Citrus* and its relatives, of the orange subfamily. Pp. 129-474 en: Webber, H. J. & Batchelor, L. D. (ed.). The *Citrus* industry 1. Berkelev.
- & Reece, P. C. 1967. The botany of *Citrus* and its wild relatives. Pp. 190-430 en: Reuther, W., Batchelor, L. D. & Webber, J. J. (ed.), The *Citrus* industry, ed. 2, 1. Berkeley.
- Tanaka, T. 1954. Species problem in Citrus (Revisio aurantiacearum IX). Tokyo.
- Tomko, J., Awad, A. T., Beal, J. L. & Doskotch, R. W. 1967. Constituents of *Zantho-xylum martinicense*. Lloydia 30: 231-235.
- Urban, I. 1883. Zur Biologie und Morphologie der Rutaceen. Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 366-404.
- 1896. Additamenta ad cognitionem florae Indiae occidentalis III. *Rutaceae*. Bot. Jahrb. Syst. 21: 551-614.
- 1924. Plantae cubenses novae vel rariores a clo. Er. L. Ekman lectae II. Pp. 177-272 en: Urban, I. (ed.), Symbolae antillanae, 9. Leipzig..
- Waterman, P. G. 1975. Alkaloids of the *Rutaceae*: their distribution and systematic significance. Biochem. Syst. Ecol. 3: 149-180.
- 1977. A review of the chemosystematics of the genus Zanthoxylum L. (Rutaceae).
   Pp. 109-129 en: Stone, B. C. (ed.), The role and goals of tropical botanic gardens. Kuala Lumpur.
- 1983. Phylogenetic implications of the distribution of secondary metabolites within the *Rutales*. Pp. 377-400 en: Waterman, P. G & Grundon, M. R. (ed.), Chemistry and chemical taxonomy of the *Rutales*. London.
- 1990. Chemosystematics of the *Rutaceae*: comments on interpretation of Da Silva & al. Pl. Syst. Evol. 173: 39-48.
- Willaman, J. J. & Li, H-L. 1970. Alkaloid bearing plants and their contained alkaloids. 1957-1968. Lloydia 33, Suppl. 3A.
- Wilson, P. 1911. *Rutaceae*. Pp. 173-224 en: Britton, N. L. & Underwood, L. M. (ed.), North American flora 25. New York.
- Wijnands, D. O. 1984. Nomenclatural note on the calamondin (*Rutaceae*). Baileya 22: 134-136.
- Yamazaki, T., 1988. Floral anatomy of the genus *Zanthoxylum* L. J. Jap. Bot. 63: 399-408.
- Ybert, J.-P. 1979. Atlas de pollens de Côte d'Ivoire. Paris.
- Zakaria, M. B. 2001. The phytochemistry of *Rutaceae* species with special reference to *Melicope*. Malayan Nat. J. 55: 241-250.

## Índice de nombres científicos

Para los nombres aceptados de plantas se utilizan redondas, los sinónimos aparecen en *cursivas*, los nombres nuevos en **negritas**. Para los números de páginas con las descripciones completas se emplean **negritas** y para los de las figuras *negritas cursivas*. Un asterisco (\*) después del número de página indica un mapa.

Aegle 5, 8	(Bonplandia)
marmelos 5	trifoliata 75
Aeglopsis 6	<i>Camunium</i> 103
chevalieri 6	<i>exoticum</i> 105
Afraegle 6	Capparaceae
paniculata 6	Casimiroa
Allophylus cubensis 73	edulis 6
Amyris . 4, 5, 7, 8, 53, <b>54</b> , 55, 56, 67	tetrameria 6
axilliflora 102	<i>Chalcas</i> 103
balsamifera 54, 57, 58*, 60, 63, 125	paniculata 103, 105
cubensis 54, 56, <b>66</b> , 67*	Citreae 121, 124
diatrypa 58	×Citrofortunella microcarpa 111
elemifera 54, 56, 57, <b>58</b> , 60*, 125	×Citroncirus webberi 112
floridana 58	Citrus 4, 5,
granulata 59	8, <b>109</b> , 110, 111, 121, 124, 126
lineata 56, <b>63, 64,</b> 65*	subg. Citrus 111
maestrensis64	subg. Eremocitrus 109
<i>maritima</i> 58	subg. Fortunella 109
plumieri 59	subg. Microcitrus 110
polymorpha 56, <b>60</b> , 61*	subg. Papeda 109, 111
polyneura 56, <b>65</b> , 66*	amblycarpa 112
stromatophylla 56, <b>61</b> , 62*	×aurantiifolia 111,
subsp. moaënsis 61	113, 115, <b>119</b> , 120*
subsp. yumuriensis 61	var. latifolia 111
sylvatica 57, 58	×aurantium 112,
verrucosa64	113, 114, <b>115</b> , <i>116</i> , 118*
Angostura 75, 124	subsp. <i>junos</i> 112
cuspare 75	var. aurantium 117, 118
ossana 77, 122	var. bigaradia 117
trifoliata 75	var. decumana 114
Annonales 11	var. grandis 114
Atalantia 6	var. myrtifolia 115
ceylanica 6	var. <i>reshmi</i> 119
citroides 6	var. sinensis 115, 118
Aurantioideae 4, 121, 123, 124, 125, 126	var. tachibana 119
Aurantium maximum 113	australasica 110, 112
Balfourodendron 125	×bergamia 114, 115
Bergera 103, 104	bigaradia 117
koenigii103	decumana 113
Bonplandia 75	deliciosa 119

(Citrus)	Clausena 5, 8, 100
depressa 112	Clymenia 110
glauca 109	polyandra 110
grandis 114, 126	Cneoraceae 4
hystrix 112	Conchocarpus 124
ichangensis 112, 120	Crateva marmelos 5
×insitorum 112	Cusparia
×jambhiri112	. 5, 7, 8, 9, 71, <b>75</b> , 77, 78, 79, 123
japonica 111, 112	febrifuga75
junos 112	ossana 76, 77
×latifolia 111, 113	trifoliata 75, 78
limetta 112	Cusparieae 71, 77
var. bergamia 114	Cuspariinae 71, 77, 125
limettioides 112	Dictyoloma 121
×limon 112, 113, <b>114</b> , 115	Dictyolomoideae 4
var. amblycarpa 112	Diomma 89, 90, 122, 126
×limonia 114, 115	ulei 89
limonum 114	Elemi 54
×lumia 112	Elemifera 54
×macrophylla112	balsamifera 57
macroptera 112	floridana 58
madurensis 111	<i>lineata</i> 64
margarita 109	<i>maritima</i> 58
maxima 111,	Eremocitrus 109, 110
113, 117, 118, 120, 126	glauca 109
medica 109, 111, 112, 114	Euodiinae 53
var. <i>limon</i> 114	Fagara 9, 10, 121, 123, 124
Citrus ×microcarpa 111, 113	acuminata 32
mitis 111	bombacifolia 6
myrtifolia 115, 117	caribaea41
×nobilis 115, 118	coriacea29
×paradisi 117, 118	cubensis 33
polyandra110	culantrillo var. insularis 17
reshmi 119	curbeloi29
reticulata 111,	dictyophylla49
112, 113, 117, 118, <b>119</b>	dumosa 25, 26, 28
subsp. deliciosa 119	var. platyphylla 21
subsp. tachibana 119	var. stenophylla 25
×sinensis 115	duplicipunctata44
tachibana 119	ekmanii 45
taiwanica 112	elephantiasis41
×tangelo 117, 118	flava 46
tangerina 119	granulata51
trifoliata 109, 112	juglandifolia
volkameriana 112	leonardii
vulgaris 115, 117	leonis 18
webberi 112	lomincola 33

(Fagara)	(Lemonia)
martinicensis 39	spectabilis 78, 80
nannophylla 43	Limon vulgare 114
nigrescens17	Limonia 6
organosia 50	acidissima 6
phylloptera 21	<i>arborea</i> 100
pimpinelloides 31	aurantiifolia 119
pistaciifolia 48	citrifolia 102
pterota 9, 15	parviflora 102
shaferi 37	trifolia 106, 107
spinifex 18	trifoliata 107
stenoptera 36, 37	winterlia 100
taediosa 36	Melicope 127
tragodes 18	Microcitrus 110
Fagaras 9	australasica 110, 112
fagara 15	Murraya 4, 5, 7, 100, <b>103</b>
Feronia 6	exotica 103, 105, 106, 125
limonia 6	paniculata 104, 105, 106*
Feroniella 6	Pamburus 6
oblata 6	missionis 6
Flindersia 126	Panel 100
Forchhammeria	Papaverales 11
Fortunella 109, 110	Papeda 109
crassifolia 111	rumphii 109
japonica 111	Phanerogamae 124
margarita 109, 111	Pilocarpinae 71, 124
Galipea jasminiflora 77, 125	Pilocarpus 5,
ossana 77	
Galipeeae71	cubensis 73
Galipeinae77	heterophyllus 73
Glycosmis 4, 5, 7, <b>100</b> , 122, 126	insularis 73
<i>americana</i> 102	jaborandi71
arborea 100	<i>longipes</i> 73
citrifolia 102	microphyllus 71
heterophylla 102	racemosus 70, 72, <b>73</b> , 74
parviflora 101, 102	subsp. racemosus 72, 74, 74*
parviflora 103*	subsp. viridulus 74
pentaphylla 102, 103	var. yucatanus 74
var. citrifolia 102	Plethadenia 4, 5, 7, 8, 9, <b>51</b> , 53, 55, 71
Helietta 4, 5, 7, 8, 53, 55, <b>67</b> , 68, 125	cubensis 52, 53, 54*
cubensis 68, 122	granulata 51, 53
glaucescens 68, 69, 70*	Poncirus 109, 110
plaeana 67	trifoliata 109, 112
Hortia 121	Pteleinae 68, 125
Kodalyodendron 54, 67	Pterota9
cubense 54, 66	fagara 15
Lemonia 78	tragodes 18

Quinaria lansium 6	(Spathelia)
Raputia ossana 77	lobulata 92, 93
Ravenia 5, 7, 8, 9, 71, 77, <b>78</b>	pinetorum 97, 98, 100
baracoensis 80, <b>86</b> , 87*	subsp. megaphylla 97
carabiae 85, 86	var. megaphylla 97
clementiana 83	simplex 88
ekmanii 87	sorbifolia 88, 121
infelix 78	splendens 90, <b>93</b> , <b>94</b> , 96*
leonis 83	stipitata 92, 93
subsp. clementiana 83	subintegra 97, 98
shaferi 80, <b>87,</b> 88*	ulei 89
var. <i>ekmanii</i> 87	vernicosa 91, <b>94</b> , <b>95</b> , <b>96</b> , 98*, 99
simplicifolia 80, 81, 85, 86*	wrightii 91, 95, 98, 99*, 100
spectabilis 79, <b>80</b> , 81, 82, 83, <b>84</b>	yumuriensis 98
subsp. leonis 82, <b>83*</b> , <b>84</b>	Spathelioideae
subsp. spectabilis 81, 82*, 84	Stauranthus 55
var. simplicifolia 85	Swinglea
urbanii 87	glutinosa 6
Ruta 3, 5, 6	Teclea 55
angustifolia 6	Terebinthaceae89
bracteosa 6	Tobinia9
chalepensis 6	acuminata 32
graveolens 6	emarginata 29
Rutaceae 3, 4, 11, 73, 89, 90, 121,	spinosa 31
122, 123, 124, 125, 126, 127	ternata var. taediosa 36
Rutales 127	Toddalioideae 53, 55, 68
Rutoideae 10, 53	Triphasia 4, 5, 7, 106
Sapindaceae 4	aurantiola 106
Schimmelia 54	glauca 109
Schimmelia oleifera 54, 57	trifolia 106, 107, 108, 109*, 124, 125
Schinus fagara 15	trifoliata 107
tragodes 18	Zanthoxylum
Severinia 6	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, <i>12</i> , <i>22</i> , 53, 55,
buxifolia 6, 125	71, 75, 121, 122, 123, 124, 125, 127
Simaroubaceae 4, 89, 90	acuminatum 14, 32, 33*
Sohnreyia 88, 90	subsp. acuminatum 33
excelsa 89	acunae 25
<i>Spathe</i> 88	album 39
Spathe vernicosa 96	americanum 40
Spathelia 4, 5, 6, 8, 9, <b>88</b> , 89, <b>94</b> , <b>95</b>	arnoldii 13, 22, 24, 25*, 122
subg. Diomma 89	aromaticum 41
subg. Sohnreyia 88	atratum 17
subg. Spathelia 89	belizense 46
brittonii 90, <b>91,</b> 92*	bissei 13, <b>20</b> , 21*, <b>22</b> , 122
cubensis 91, 92, 93*, 95	bombacifolium 6
excelsa 89	caribaeum 14, <b>41,</b> 42*
leonis 98	subsp. caribaeum 42

(Zanthoxylum caribaeum)	(Zanthoxylum)
var. floridanum 46	lomincola 33
clava-herculis 9, 39, 41	martinicense 14, 39, 40*, 127
coriaceum 14, <b>29</b> , 30*, 32	subsp. martinicense 40
cubense 11, 14, 33, 34*	nannophyllum 14, 43*, 44
curbeloi 29	nashii44
dictyophyllum 15, 47, 48, 49, 50*	nelsonii 41
domingense 30	nigrescens17
dumosum 13,	organosium 15, 47, 48, <b>50,</b> 51*
<b>22, 25,</b> 26*, 27, 28, 122	phyllopterum 3, <b>21</b> , <b>22</b> , 23*, 122
duplicipunctatum 15,	pimpinelloides 14, 30, <b>31,</b> 32*
	pistaciifolium 15, 47, 48, 49*
ekmanii 14, <b>45,</b> 46*	pseudodumosum 13, 22, 26, 27*, 122
elephantiasis 41	pterota 15
<i>emarginatum</i> 29	rhodoxylon 34
fagara 13, <b>15</b> , 16*, 18, 19, 125	rolandii 13, <b>22, 23,</b> 24*, 122
subsp. lentiscifolium 18	shaferi 14, 37, 38*
flavum 11,	sobrevielae 46
15, 44, <b>46,</b> 47*, 48, 49, 50, 51	spinifex 18, 19
floridanum46	spinosum 30, 31
gentlei 41	stelligerum
haitiense	stenopterum 36
ignoratum 13, 22, 28*, 122	taediosum 11, 14, 35, 36, 37*, 39
insulare 13, 14, <b>17,</b> 18*	ternatum 36
juglandifolium 33, 39	tragodes 11, 18, 19*, 20, 21
var. berteroanum 39	trichilioides
<i>lanceolatum</i> 39	venosum 30
leonardii 36	wemdingense 123
leonis 18 20	Zieria 21

## Índice de nombres comunes

Aceitillo 48, 75	(Cuaba)
Amoroso	blanca 58, 60
Anón canadiense de Güell 6	caracolillo 58
Árbol de lanza 6	de cosechas 58
Arraiján 82, 85	de costa 60
Aruña gato 17	de la Maestra 65
Ayúa 41, 43	de monte 58, 60
amarilla 41, 43	de olor 58
baría 33, 43	de sabana 60
blanca 36, 43	ruda 60
brava 36	Cuabilla 58, 60
de corazón 43	Flor de peladero 100
dumosa 27	Fragante 70
hembra 36	Graciosa
macho 41	Grapefruit 114, 118
sierra 36	Incienso 60
varía 43, 48	de costa 60
Ayuda 41	Jazmín de Persia 106
amarilla 41	francés 106
blanca 36	Kumquat 111
brava 31	Lansio
hembra 36	Lemonia 82
macho 37, 41	Lima 121
sin espinas 6	de Rangpur 121
varía 45	dulce 121
Bael fruit de la India 5	persa 111
Bálsamo 49	rangpur 115
Bayúa 31, 41, 43	Limón 115, 121
de costa 31	agrio 115, 121
lisa 31	café
Bayuda 31	chino 115
Bergamota 115	criollo 121
Boj de Persia 106	dulce 115
Bonita de Sierra 92	francés 115
Cajela 117	francés dulce 115
Calamondín 111	persa 115
Chironja 118	rugoso 112, 115
Chivo	Limoncillo 17, 37, 103, 109
Cidra 111	colorado 109
Cidrón 111	dulce 109
Citrange 112	Limoncito 109
Citrumelo 112	de China 103
Cuaba 56, 58	Macrofila 112
amarilla 58, 60	Manca montero
amarilla de costa 60	Mandarina 119

Mandarina deliciosa 119	(Naranjita)
Mango tarango	de San José 11
Mate árbol 37	
Melocotón 6	japonesa 11
Membrillo 5	Palo de incienso 60
de Australia5	de resina 60
de Bengala5	de roble 58
Mirto 106	vencedor 49
criollo 106	Pomelo 114
Murallera 106	Protocán92
Muraya 106	Quina del país 78
Naranja 118	Rosita 82, 88
agria 117	Ruda 6, 54
blanca 118	Sapote blanco
cajel 117	blanco de Mejico
china 118	Tangelo 118
de ombligo 118	Tangor 118
de Sevilla 117	Tarro de chivo 17, 60
de Valencia 118	Tomeguín 37
dulce 118	Toronja 114, 118
lima 121	criolla 114
moreira 114, 118	Uña 17
varía 117	de gato 17
Naranjilla 103	Volkameriana 112
Naranjita de cristal 103	Wampi 6
de la Vírgen 103	Zarza de tomeguín 17
	-